

S1G1 Diskrete Mathematik: Kostenminimale Flüsse

Andreas Gwilt

29. Juni 2017

1 Wichtige Definitionen, Sätze

1.1 Problemstellung

Def (*b*-Fluss). $f : E(G) \rightarrow \mathbb{R}_+$ mit $f(e) \leq u(e) \forall e \in E(G)$ und $\sum_{e \in \delta^+(v)} f(e) - \sum_{e \in \delta^-(v)} f(e) = b(v)$ für alle $v \in V(G)$.

Minimum-Cost-Flow-Problem

Instanz: Ein Digraph G , Kapazitäten $u : E(G) \rightarrow \mathbb{R}_+$, Zahlen $b : V(G) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\sum_{v \in V(G)} b(v) = 0$ und Gewichte $c : E(G) \rightarrow \mathbb{R}$.

Aufgabe: Bestimme eine b -Fluss f mit minimalen Kosten $c(f) := \sum_{e \in E(G)} f(e)c(e)$ (oder entscheide, dass es keinen solchen gibt).

1.2 Ein Optimalitätskriterium

Def. Sei G ein gerichteter Graph, $u : E(G) \rightarrow \mathbb{R}_+$ und f ein b -Fluss.

Residualkapazitäten $u_f : E(\overset{\leftrightarrow}{G}) \rightarrow \mathbb{R}_+$, $u_f(e) := u(e) - f(e)$ und $u_f(\overleftarrow{e}) = f(e)$ für alle $e \in E(G)$,

Residualkosten $c_f : E(\overset{\leftrightarrow}{G}) \rightarrow \mathbb{R}$, $c_f(e) := c(e)$ und $c_f(\overleftarrow{e}) := -c(e)$ für alle $e \in E(G)$.

Residualgraph G_f definiert durch $V(G_f) := V(G)$ und $E(G_f) := \{e \in E(\overset{\leftrightarrow}{G}) \mid u_f(e) > 0\} = \{e \in E(G) \mid f(e) < u(e)\} \cup \{\overleftarrow{e} \mid e \in E(G), f(e) > 0\}$.

Satz (Klein, 1967). Sei (G, u, b, c) eine Instanz der MINIMUM-COST-FLOW-PROBLEMS. Ein b -Fluss f hat genau dann minimale Kosten, wenn es keinen f -augmentierenden Kreis mit negativem Gesamtgewicht gibt (i.e. G_f ist konservativ).

1.3 Zwei Algorithmen

Satz. Sei (G, u, b, c) eine Instanz des MINIMUM-COST-FLOW-PROBLEMS und f ein b -Fluss mit minimalen Kosten. Sei P ein kürzester (bzgl. c_f) s - t -Weg in G_f (für irgendwelche $s, t \in V(G)$). Sei f' der durch Augmentierung von f entlang P um den Wert $\gamma \leq \min_{e \in P} u_f(e)$ entstehender Fluss. Dann ist f' ein kostenminimaler Fluss zu den Balancen b' mit

$$b'(v) = \begin{cases} b(v) + \gamma & : v = s \\ b(v) - \gamma & : v = t \\ b(v) & : \text{sonst.} \end{cases}$$

Sukzessive-Kürzeste-Wege-Algorithmus

① Setze $b' \leftarrow b$ und $f(e) \leftarrow 0$ für alle $e \in E(G)$.

② **If** $b' = 0$ **then stop, else:**

Wähle einen Knoten s mit $b'(s) > 0$.


Wähle einen Knoten t mit $b'(t) < 0$, so dass t von s aus in G_f erreichbar ist.

If es gibt kein solches t **then stop.** (Es gibt keinen b -Fluss)

- ③ Bestimme einen s - t -Weg P in G_f mit minimalen Kosten bzgl. c_f .
- ④ Berechne $\gamma \leftarrow \min\{\min_{e \in E(P)} u_f(e), b'(s), -b'(t)\}$.
 Setze $b'(s) \leftarrow b'(s) - \gamma$ und $b'(t) \leftarrow b'(t) + \gamma$. Augmentiere f entlang P um γ .
Go to ②

2 Aufgaben

Aufgabe 1: Finde einen b -Fluss in dem beigelegten Graphen (Legende: $u(e), c(e)$):




Aufgabe 2: Was sind die Kosten von f_1 und f_2 (auf der Tafel)? Wo unterscheiden sie sich?

Aufgabe 3: Macht euch klar, dass Augmentierung entlang eines solchen Kreises C um $\gamma \leq \min\{u_f(e) | e \in C\}$ wieder einen b -Fluss f' ergibt mit

$$f'(e) = \begin{cases} f(e) + \gamma & : e \in C \\ f(e) - \gamma & : \overleftarrow{e} \in C \\ f(e) & : \text{sonst} \end{cases}$$

Aufgabe 4: Ist der folgende b -Fluss minimal? Wenn nicht, welcher Kreis in G_f hat negative Kosten? (Legende: $f(e), u(e), c(e)$)



Aufgabe 5: Findet mithilfe des SUKZESSIVE-KÜRZESTE-WEGE-ALGORITHMUS einen minimalen Fluss in dem Graphen an der Tafel.

3 Quellen

Sätze, Beweise, Definitionen: Kombinatorische Optimierung (Korte, Vygen) Aufgaben und Beispiele: Graphen- und Netzwerkoptimierung (Christina Büsing)