

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০২ : গতি

এমসিকিউ সেট ০২

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। আদি বেগ 10 m/s, ত্বরণ 5 m/s², সময় 3 s হলে সরণ কত?

- (ক) 52.5 m
(খ) 25 m
(গ) 30 m
(ঘ) 45 m

২। আদি বেগ 0 m/s, ত্বরণ 9.8 m/s², সময় 2 s হলে শেষ বেগ কত?

- (ক) 19.6 m/s
(খ) 0 m/s
(গ) 19.6 m/s
(ঘ) 19.6 m/s

৩। আদি বেগ 0 m/s, ত্বরণ 9.8 m/s², সময় 2 s হলে সরণ কত?

- (ক) 19.6 m
(খ) 19.6 m
(গ) 0 m
(ঘ) 39.2 m

৪। আদি বেগ 20 m/s, ত্বরণ -4 m/s², সময় 3 s হলে শেষ বেগ কত?

- (ক) 8 m/s
(খ) 60 m/s
(গ) -12 m/s
(ঘ) 42.0 m/s

৫। আদি বেগ 20 m/s, ত্বরণ -4 m/s², সময় 3 s হলে সরণ কত?

- (ক) 42.0 m
(খ) 8 m
(গ) 60 m
(ঘ) -36 m

৬। আদি বেগ 8 m/s, ত্বরণ 3 m/s², সময় 5 s হলে শেষ বেগ কত?

- (ক) 23 m/s
(খ) 40 m/s
(গ) 15 m/s
(ঘ) 77.5 m/s

৭। আদি বেগ 8 m/s, ত্বরণ 3 m/s², সময় 5 s হলে সরণ কত?

- (ক) 77.5 m
(খ) 23 m
(গ) 40 m
(ঘ) 75 m

৮। আদি বেগ 15 m/s, ত্বরণ -5 m/s², সময় 2 s হলে শেষ বেগ কত?

- (ক) 5 m/s
(খ) 30 m/s
(গ) -10 m/s
(ঘ) 20.0 m/s

৯। আদি বেগ 15 m/s, ত্বরণ -5 m/s², সময় 2 s হলে সরণ কত?

- (ক) 20.0 m
(খ) 5 m
(গ) 30 m
(ঘ) -20 m

১০। আদি বেগ 0 m/s, ত্বরণ 4 m/s², সময় 6 s হলে শেষ বেগ কত?

- (ক) 24 m/s
(খ) 0 m/s
(গ) 24 m/s
(ঘ) 72.0 m/s

১১। আদি বেগ 0 m/s, ত্বরণ 4 m/s², সময় 6 s হলে সরণ কত?

- (ক) 72.0 m
(খ) 24 m
(গ) 0 m
(ঘ) 144 m

১২। বেগ 0 থেকে 20 m/s হয় 4 s-এ; ত্বরণ কত?

- (ক) 5.0 m/s²
(খ) 20 m/s²
(গ) 4 m/s²
(ঘ) 5.0 m/s²

১৩। বেগ 10 থেকে 30 m/s হয় 5 s-এ; ত্বরণ কত?

- (ক) 4.0 m/s²
(খ) 20 m/s²
(গ) 5 m/s²
(ঘ) 8.0 m/s²

১৪। বেগ 15 থেকে 5 m/s হয় 2 s-এ; ত্বরণ কত?

- (ক) -5.0 m/s²
(খ) -10 m/s²
(গ) 2 m/s²
(ঘ) 10.0 m/s²

১৫। স্থির অবস্থা থেকে 5 m পড়লে g = 10 m/s²-এ শেষ বেগ প্রায় কত?

- (ক) 10 m/s
(খ) 5 m/s
(গ) 10 m/s
(ঘ) 2 m/s

১৬। স্থির অবস্থা থেকে 10 m পড়লে g = 10 m/s²-এ শেষ বেগ প্রায় কত?

- (ক) 14 m/s
(খ) 10 m/s
(গ) 20 m/s
(ঘ) 5 m/s

১৭। স্থির অবস্থা থেকে 20 m পড়লে g = 10 m/s²-এ শেষ বেগ প্রায় কত?

- (ক) 20 m/s
(খ) 20 m/s
(গ) 40 m/s
(ঘ) 10 m/s

১৮। স্থির অবস্থা থেকে 45 m পড়লে g = 10 m/s²-এ শেষ বেগ প্রায় কত?

- (ক) 30 m/s
(খ) 45 m/s
(গ) 90 m/s
(ঘ) 22 m/s

১৯। স্থির অবস্থা থেকে 80 m পড়লে g = 10 m/s²-এ শেষ বেগ প্রায় কত?

- (ক) 40 m/s
(খ) 80 m/s
(গ) 160 m/s
(ঘ) 40 m/s

২০। 100 m সরণ 10 s-এ হলে গড় বেগ কত?

- (ক) 10.0 m/s
- (খ) 1000 m/s
- (গ) 90 m/s
- (ঘ) 10 m/s

২১। 50 m সরণ 5 s-এ হলে গড় বেগ কত?

- (ক) 10.0 m/s
- (খ) 250 m/s
- (গ) 45 m/s
- (ঘ) 5 m/s

২২। 200 m সরণ 20 s-এ হলে গড় বেগ কত?

- (ক) 10.0 m/s
- (খ) 4000 m/s
- (গ) 180 m/s
- (ঘ) 20 m/s

২৩। 80 m সরণ 8 s-এ হলে গড় বেগ কত?

- (ক) 10.0 m/s
- (খ) 640 m/s
- (গ) 72 m/s
- (ঘ) 8 m/s

২৪। $u=0$ m/s, $a=1$ m/s², $t=4$ s। v কত?

- (ক) 4 m/s
- (খ) 0 m/s
- (গ) 1 m/s
- (ঘ) 8.0 m/s

২৫। $u=0$ m/s, $a=1$ m/s², $t=4$ s। s কত?

- (ক) 8.0 m
- (খ) 4 m
- (গ) 0 m
- (ঘ) 4 m

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ২ | সেট ০২ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।