

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১০ : স্থির তড়িৎ

এমসিকিউ সেট ০২

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=2\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- (ক) $4\text{e-}06\ \text{J}$
 (খ) $4\text{e-}06\ \text{J}$
 (গ) $2\ \text{J}$
 (ঘ) $2\ \text{J}$

২। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=3\ \text{V}$ হলে C কত?

- (ক) $6.666666666666666\text{e-}07\ \text{F}$
 (খ) $6\text{e-}06\ \text{F}$
 (গ) $3\ \text{F}$
 (ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

৩। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=3\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- (ক) $9\text{e-}06\ \text{J}$
 (খ) $6\text{e-}06\ \text{J}$
 (গ) $3\ \text{J}$
 (ঘ) $2\ \text{J}$

৪। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=4\ \text{V}$ হলে C কত?

- (ক) $5\text{e-}07\ \text{F}$
 (খ) $8\text{e-}06\ \text{F}$
 (গ) $4\ \text{F}$
 (ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

৫। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=4\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- (ক) $1.6\text{e-}05\ \text{J}$
 (খ) $8\text{e-}06\ \text{J}$
 (গ) $4\ \text{J}$
 (ঘ) $2\ \text{J}$

৬। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=5\ \text{V}$ হলে C কত?

- (ক) $4\text{e-}07\ \text{F}$
 (খ) $9.999999999999999\text{e-}06\ \text{F}$
 (গ) $5\ \text{F}$
 (ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

৭। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=5\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- (ক) $2.4999999999999998\text{e-}05\ \text{J}$
 (খ) $9.999999999999999\text{e-}06\ \text{J}$
 (গ) $5\ \text{J}$
 (ঘ) $2\ \text{J}$

৮। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=6\ \text{V}$ হলে C কত?

- (ক) $3.333333333333333\text{e-}07\ \text{F}$
 (খ) $1.2\text{e-}05\ \text{F}$
 (গ) $6\ \text{F}$
 (ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

৯। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=6\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- (ক) $3.6\text{e-}05\ \text{J}$
 (খ) $1.2\text{e-}05\ \text{J}$
 (গ) $6\ \text{J}$
 (ঘ) $2\ \text{J}$

১০। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=7\ \text{V}$ হলে C কত?

- (ক) $2.857142857142857\text{e-}07\ \text{F}$
 (খ) $1.4\text{e-}05\ \text{F}$
 (গ) $7\ \text{F}$
 (ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

১১। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=7\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- (ক) $4.9\text{e-}05\ \text{J}$
 (খ) $1.4\text{e-}05\ \text{J}$
 (গ) $7\ \text{J}$
 (ঘ) $2\ \text{J}$

১২। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=8\ \text{V}$ হলে C কত?

- (ক) $2.5\text{e-}07\ \text{F}$
 (খ) $1.6\text{e-}05\ \text{F}$
 (গ) $8\ \text{F}$
 (ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

১৩। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=8\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- (ক) $6.4\text{e-}05\ \text{J}$
 (খ) $1.6\text{e-}05\ \text{J}$
 (গ) $8\ \text{J}$
 (ঘ) $2\ \text{J}$

১৪। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=9\ \text{V}$ হলে C কত?

- (ক) $2.222222222222222\text{e-}07\ \text{F}$
 (খ) $1.8\text{e-}05\ \text{F}$
 (গ) $9\ \text{F}$
 (ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

১৫। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=9\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- (ক) $8.1\text{e-}05\ \text{J}$
 (খ) $1.8\text{e-}05\ \text{J}$
 (গ) $9\ \text{J}$
 (ঘ) $2\ \text{J}$

১৬। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=10\ \text{V}$ হলে C কত?

- (ক) $2\text{e-}07\ \text{F}$
 (খ) $1.9999999999999998\text{e-}05\ \text{F}$
 (গ) $10\ \text{F}$
 (ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

১৭। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=10\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- (ক) $9.999999999999999\text{e-}05\ \text{J}$
 (খ) $1.9999999999999998\text{e-}05\ \text{J}$
 (গ) $10\ \text{J}$
 (ঘ) $2\ \text{J}$

১৮। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=11\ \text{V}$ হলে C কত?

- (ক) $1.818181818181818\text{e-}07\ \text{F}$
 (খ) $2.2\text{e-}05\ \text{F}$
 (গ) $11\ \text{F}$
 (ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

১৯। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=11\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- (ক) $0.000121\ \text{J}$
 (খ) $2.2\text{e-}05\ \text{J}$
 (গ) $11\ \text{J}$
 (ঘ) $2\ \text{J}$

২০। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=12\ \text{V}$ হলে C কত?

- (ক) $1.6666666666666665\text{e-}07\ \text{F}$
 (খ) $2.4\text{e-}05\ \text{F}$
 (গ) $12\ \text{F}$
 (ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

২১। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=12\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?
 (ক) 0.000144 J
 (খ) $2.4\text{e-}05\ \text{J}$
 (গ) 12 J
 (ঘ) 2 J

২২। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=13\ \text{V}$ হলে C কত?
 (ক) 1.5384615384615385e-07 F
 (খ) $2.6\text{e-}05\ \text{F}$
 (গ) 13 F
 (ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

২৩। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=13\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?
 (ক) 0.000169 J
 (খ) $2.6\text{e-}05\ \text{J}$
 (গ) 13 J
 (ঘ) 2 J

২৪। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=14\ \text{V}$ হলে C কত?
 (ক) 1.4285714285714285e-07 F
 (খ) $2.8\text{e-}05\ \text{F}$
 (গ) 14 F
 (ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

২৫। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=14\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?
 (ক) 0.000196 J
 (খ) $2.8\text{e-}05\ \text{J}$
 (গ) 14 J
 (ঘ) 2 J

উত্তরমালা (১-২৫)				
১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১০ | সেট ০২ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।