

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০২ : গতি

এমসিকিউ সেট ০১

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। সরণ কী জাতীয় রাশি?

- (ক) স্কেলার
(খ) ভেক্টর
(গ) মাত্রাহীন
(ঘ) লব্ধ নয়

১০। $u=2 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 32.0 m
(খ) 14 m
(গ) 8 m
(ঘ) 12 m

২। স্থির বস্তুর বেগ কত?

- (ক) g
(খ) শূন্য
(গ) অসীম
(ঘ) 1 m/s

১১। $u=4 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 12 m/s
(খ) 4 m/s
(গ) 2 m/s
(ঘ) 32.0 m/s

৩। ভেক্টর রাশির উদাহরণ কোনটি?

- (ক) দ্রুতি
(খ) সরণ
(গ) কাজ
(ঘ) তাপ

১২। $u=4 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 56.0 m
(খ) 24 m
(গ) 16 m
(ঘ) 20 m

৪। আদি বেগ 0 m/s , ত্বরণ 10 m/s^2 , সময় 2 s হলে সরণ কত?

- (ক) 20.0 m
(খ) 20 m
(গ) 0 m
(ঘ) 40 m

১৩। $u=6 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 22 m/s
(খ) 6 m/s
(গ) 4 m/s
(ঘ) 56.0 m/s

৫। আদি বেগ 20 m/s , ত্বরণ -4 m/s^2 , সময় 3 s হলে শেষ বেগ কত?

- (ক) 8 m/s
(খ) 60 m/s
(গ) -12 m/s
(ঘ) 42.0 m/s

১৪। $u=8 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 48.0 m
(খ) 16 m
(গ) 32 m
(ঘ) 8 m

৬। আদি বেগ 0 m/s , ত্বরণ 4 m/s^2 , সময় 6 s হলে সরণ কত?

- (ক) 72.0 m
(খ) 24 m
(গ) 0 m
(ঘ) 144 m

১৫। $u=10 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 14 m/s
(খ) 10 m/s
(গ) 1 m/s
(ঘ) 48.0 m/s

৭। স্থির অবস্থা থেকে 45 m পড়লে $g = 10 \text{ m/s}^2$ -এ শেষ বেগ প্রায় কত?

- (ক) 30 m/s
(খ) 45 m/s
(গ) 90 m/s
(ঘ) 22 m/s

১৬। $u=10 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 72.0 m
(খ) 26 m
(গ) 40 m
(ঘ) 16 m

৮। $u=0 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 8.0 m
(খ) 4 m
(গ) 0 m
(ঘ) 4 m

১৭। $u=12 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 24 m/s
(খ) 12 m/s
(গ) 3 m/s
(ঘ) 72.0 m/s

৯। $u=0 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 20 m/s
(খ) 0 m/s
(গ) 5 m/s
(ঘ) 40.0 m/s

১৮। $u=14 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 64.0 m
(খ) 18 m
(গ) 56 m
(ঘ) 4 m

১৯। $u=14 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 34 m/s
(খ) 14 m/s
(গ) 5 m/s
(ঘ) 96.0 m/s

২০। $u=16 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?
 (ক) 88.0 m
 (খ) 28 m
 (গ) 64 m
 (ঘ) 12 m

২১। $u=18 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?
 (ক) 26 m/s
 (খ) 18 m/s
 (গ) 2 m/s
 (ঘ) 88.0 m/s

২২। $u=18 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?
 (ক) 112.0 m
 (খ) 38 m
 (গ) 72 m
 (ঘ) 20 m

২৩। $u=20 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?
 (ক) 36 m/s
 (খ) 20 m/s
 (গ) 4 m/s
 (ঘ) 112.0 m/s

২৪। $u=22 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?
 (ক) 104.0 m
 (খ) 30 m
 (গ) 88 m
 (ঘ) 8 m

২৫। $u=24 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?
 (ক) 28 m/s
 (খ) 24 m/s
 (গ) 1 m/s
 (ঘ) 104.0 m/s

উত্তরমালা (১-২৫)				
১→খ	২→খ	৩→খ	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ২ | সেট ০১ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।