

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০২ : গতি

এমসিকিউ সেট ০২

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। দ্রুতি কী জাতীয় রাশি?

- (ক) ভেক্টর
(খ) স্কেলার
(গ) মাত্রাহীন
(ঘ) শুধু ঋণাত্মক

১১। $u=4 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 40.0 m
(খ) 16 m
(গ) 16 m
(ঘ) 12 m

২। বেগ-সময় লেখের ক্ষেত্রফল কী নির্দেশ করে?

- (ক) ত্বরণ
(খ) সরণ
(গ) ভর
(ঘ) বল

১২। $u=6 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 14 m/s
(খ) 6 m/s
(গ) 2 m/s
(ঘ) 40.0 m/s

৩। $v = ?$

- (ক) $u - at$
(খ) $u + at$
(গ) $at - u$
(ঘ) s/t^2

১৩। $u=6 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 64.0 m
(খ) 26 m
(গ) 24 m
(ঘ) 20 m

৪। আদি বেগ 10 m/s , ত্বরণ 5 m/s^2 , সময় 3 s হলে শেষ বেগ কত?

- (ক) 25 m/s
(খ) 30 m/s
(গ) 15 m/s
(ঘ) 52.5 m/s

১৪। $u=8 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 24 m/s
(খ) 8 m/s
(গ) 4 m/s
(ঘ) 64.0 m/s

৫। আদি বেগ 8 m/s , ত্বরণ 3 m/s^2 , সময় 5 s হলে সরণ কত?

- (ক) 77.5 m
(খ) 23 m
(গ) 40 m
(ঘ) 75 m

১৫। $u=10 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 56.0 m
(খ) 18 m
(গ) 40 m
(ঘ) 8 m

৬। বেগ 15 থেকে 5 m/s হয় 2 s -এ; ত্বরণ কত?

- (ক) -5.0 m/s^2
(খ) -10 m/s^2
(গ) 2 m/s^2
(ঘ) 10.0 m/s^2

১৬। $u=12 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 16 m/s
(খ) 12 m/s
(গ) 1 m/s
(ঘ) 56.0 m/s

৭। 50 m সরণ 5 s -এ হলে গড় বেগ কত?

- (ক) 10.0 m/s
(খ) 250 m/s
(গ) 45 m/s
(ঘ) 5 m/s

১৭। $u=12 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 80.0 m
(খ) 28 m
(গ) 48 m
(ঘ) 16 m

৮। $u=0 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 12 m/s
(খ) 0 m/s
(গ) 3 m/s
(ঘ) 24.0 m/s

১৮। $u=14 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 26 m/s
(খ) 14 m/s
(গ) 3 m/s
(ঘ) 80.0 m/s

৯। $u=2 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 16.0 m
(খ) 6 m
(গ) 8 m
(ঘ) 4 m

১৯। $u=16 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 72.0 m
(খ) 20 m
(গ) 64 m
(ঘ) 4 m

১০। $u=2 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 22 m/s
(খ) 2 m/s
(গ) 5 m/s
(ঘ) 48.0 m/s

২০। $u=16 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ কত?

- (ক) 36 m/s
(খ) 16 m/s
(গ) 5 m/s
(ঘ) 104.0 m/s

২১। $u=18\text{ m/s}$, $a=3\text{ m/s}^2$, $t=4\text{ s}$ কত?
 (ক) 96.0 m
 (খ) 30 m
 (গ) 72 m
 (ঘ) 12 m

২২। $u=20\text{ m/s}$, $a=2\text{ m/s}^2$, $t=4\text{ s}$ কত?
 (ক) 28 m/s
 (খ) 20 m/s
 (গ) 2 m/s
 (ঘ) 96.0 m/s

২৩। $u=20\text{ m/s}$, $a=5\text{ m/s}^2$, $t=4\text{ s}$ কত?
 (ক) 120.0 m
 (খ) 40 m
 (গ) 80 m
 (ঘ) 20 m

২৪। $u=22\text{ m/s}$, $a=4\text{ m/s}^2$, $t=4\text{ s}$ কত?
 (ক) 38 m/s
 (খ) 22 m/s
 (গ) 4 m/s
 (ঘ) 120.0 m/s

২৫। $u=24\text{ m/s}$, $a=2\text{ m/s}^2$, $t=4\text{ s}$ কত?
 (ক) 112.0 m
 (খ) 32 m
 (গ) 96 m
 (ঘ) 8 m

উত্তরমালা (১-২৫)				
১→খ	২→খ	৩→খ	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ২ | সেট ০২ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।