

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০২ : গতি

এমসিকিউ সেট ১২

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। আদি বেগ 15 m/s, ত্বরণ -5 m/s², সময় 2 s হলে সরণ কত?

- (ক) 20.0 m
(খ) 5 m
(গ) 30 m
(ঘ) -20 m

২। স্থির অবস্থা থেকে 10 m পড়লে $g = 10 \text{ m/s}^2$ -এ শেষ বেগ প্রায় কত?

- (ক) 14 m/s
(খ) 10 m/s
(গ) 20 m/s
(ঘ) 5 m/s

৩। 80 m সরণ 8 s-এ হলে গড় বেগ কত?

- (ক) 10.0 m/s
(খ) 640 m/s
(গ) 72 m/s
(ঘ) 8 m/s

৪। $u=0 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । v কত?

- (ক) 16 m/s
(খ) 0 m/s
(গ) 4 m/s
(ঘ) 32.0 m/s

৫। $u=2 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । s কত?

- (ক) 24.0 m
(খ) 10 m
(গ) 8 m
(ঘ) 8 m

৬। $u=4 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । v কত?

- (ক) 8 m/s
(খ) 4 m/s
(গ) 1 m/s
(ঘ) 24.0 m/s

৭। $u=4 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । s কত?

- (ক) 48.0 m
(খ) 20 m
(গ) 16 m
(ঘ) 16 m

৮। $u=6 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । v কত?

- (ক) 18 m/s
(খ) 6 m/s
(গ) 3 m/s
(ঘ) 48.0 m/s

৯। $u=8 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । s কত?

- (ক) 40.0 m
(খ) 12 m
(গ) 32 m
(ঘ) 4 m

১০। $u=8 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । v কত?

- (ক) 28 m/s
(খ) 8 m/s
(গ) 5 m/s
(ঘ) 72.0 m/s

১১। $u=10 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । s কত?

- (ক) 64.0 m
(খ) 22 m
(গ) 40 m
(ঘ) 12 m

১২। $u=12 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । v কত?

- (ক) 20 m/s
(খ) 12 m/s
(গ) 2 m/s
(ঘ) 64.0 m/s

১৩। $u=12 \text{ m/s}$, $a=5 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । s কত?

- (ক) 88.0 m
(খ) 32 m
(গ) 48 m
(ঘ) 20 m

১৪। $u=14 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । v কত?

- (ক) 30 m/s
(খ) 14 m/s
(গ) 4 m/s
(ঘ) 88.0 m/s

১৫। $u=16 \text{ m/s}$, $a=2 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । s কত?

- (ক) 80.0 m
(খ) 24 m
(গ) 64 m
(ঘ) 8 m

১৬। $u=18 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । v কত?

- (ক) 22 m/s
(খ) 18 m/s
(গ) 1 m/s
(ঘ) 80.0 m/s

১৭। $u=18 \text{ m/s}$, $a=4 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । s কত?

- (ক) 104.0 m
(খ) 34 m
(গ) 72 m
(ঘ) 16 m

১৮। $u=20 \text{ m/s}$, $a=3 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । v কত?

- (ক) 32 m/s
(খ) 20 m/s
(গ) 3 m/s
(ঘ) 104.0 m/s

১৯। $u=22 \text{ m/s}$, $a=1 \text{ m/s}^2$, $t=4 \text{ s}$ । s কত?

- (ক) 96.0 m
(খ) 26 m
(গ) 88 m
(ঘ) 4 m

২০। $u=22\text{ m/s}$, $a=5\text{ m/s}^2$, $t=4\text{ s}$ । v কত?

- (ক) 42 m/s
- (খ) 22 m/s
- (গ) 5 m/s
- (ঘ) 128.0 m/s

২১। $u=24\text{ m/s}$, $a=3\text{ m/s}^2$, $t=4\text{ s}$ । s কত?

- (ক) 120.0 m
- (খ) 36 m
- (গ) 96 m
- (ঘ) 12 m

২২। 40 m সরণ 5 s -এ গড় বেগ কত?

- (ক) 8.0 m/s
- (খ) 40 m/s
- (গ) 5 m/s
- (ঘ) 200 m/s

২৩। 110 m সরণ 5 s -এ গড় বেগ কত?

- (ক) 22.0 m/s
- (খ) 110 m/s
- (গ) 5 m/s
- (ঘ) 550 m/s

২৪। 180 m সরণ 5 s -এ গড় বেগ কত?

- (ক) 36.0 m/s
- (খ) 180 m/s
- (গ) 5 m/s
- (ঘ) 900 m/s

২৫। মন্দন কী?

- (ক) ধনাত্মক ত্বরণ
- (খ) ঋণাত্মক ত্বরণ
- (গ) শূন্য বেগ
- (ঘ) ধ্রুব বেগ

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→খ

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ২ | সেট ১২ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।