

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০৩ : বল
এমসিকিউ সেট ১৩

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। $m=1\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 2 N
(খ) 1 N
(গ) 2 N
(ঘ) 3 N

২। $m=4\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 16 kg m/s
(খ) 4 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 8 kg m/s

৩। $m=8\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 16 N
(খ) 8 N
(গ) 2 N
(ঘ) 10 N

৪। $m=11\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 44 kg m/s
(খ) 11 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 15 kg m/s

৫। $m=15\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 30 N
(খ) 15 N
(গ) 2 N
(ঘ) 17 N

৬। $m=18\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 72 kg m/s
(খ) 18 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 22 kg m/s

৭। $m=22\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 44 N
(খ) 22 N
(গ) 2 N
(ঘ) 24 N

৮। $m=25\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 100 kg m/s
(খ) 25 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 29 kg m/s

৯। $m=29\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 58 N
(খ) 29 N
(গ) 2 N
(ঘ) 31 N

১০। 8 N বল 3 s ক্রিয়ায় আবেগ কত?

- (ক) 24 N s
(খ) 8 N s
(গ) 3 N s
(ঘ) 2.6666666666666665 N s

১১। 22 N বল 3 s ক্রিয়ায় আবেগ কত?

- (ক) 66 N s
(খ) 22 N s
(গ) 3 N s
(ঘ) 7.333333333333333 N s

১২। 36 N বল 3 s ক্রিয়ায় আবেগ কত?

- (ক) 108 N s
(খ) 36 N s
(গ) 3 N s
(ঘ) 12.0 N s

১৩। ভরবেগ $p = ?$

- (ক) m/v
(খ) mv
(গ) $m+v$
(ঘ) v/m

১৪। লিফট ঊর্ধ্বমুখী দ্বরণে আপাত ওজন কেমন?

- (ক) কমে
(খ) বাড়ে
(গ) শূন্য
(ঘ) অপরিবর্তিত

১৫। 4 kg ভরের বস্তুতে দ্বরণ 4 m/s^2 হলে বল কত?

- (ক) 16 N
(খ) 8 N
(গ) 1.0 N
(ঘ) 4 N

১৬। 8 kg ভর, বেগ 5 m/s হলে ভরবেগ কত?

- (ক) 40 kg m/s
(খ) 13 kg m/s
(গ) 0.625 kg m/s
(ঘ) 8 kg m/s

১৭। 60 kg ভরের ওজন $g=10\text{ m/s}^2$ -এ কত?

- (ক) 60 N
(খ) 600 N
(গ) 6.0 N
(ঘ) 70 N

১৮। $m=3\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 6 N
(খ) 3 N
(গ) 2 N
(ঘ) 5 N

১৯। $m=6\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 24 kg m/s
(খ) 6 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 10 kg m/s

২০। $m=10\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 20 N
(খ) 10 N
(গ) 2 N
(ঘ) 12 N

২১। $m=13\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 52 kg m/s
- (খ) 13 kg m/s
- (গ) 4 kg m/s
- (ঘ) 17 kg m/s

২২। $m=17\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 34 N
- (খ) 17 N
- (গ) 2 N
- (ঘ) 19 N

২৩। $m=20\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 80 kg m/s
- (খ) 20 kg m/s
- (গ) 4 kg m/s
- (ঘ) 24 kg m/s

২৪। $m=24\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 48 N
- (খ) 24 N
- (গ) 2 N
- (ঘ) 26 N

২৫। $m=27\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 108 kg m/s
- (খ) 27 kg m/s
- (গ) 4 kg m/s
- (ঘ) 31 kg m/s

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→খ	১৪→খ	১৫→ক
১৬→ক	১৭→খ	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৩ | সেট ১৩ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।