

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০৩ : বল
এমসিকিউ সেট ১৯

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। $m=10\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 20 N
(খ) 10 N
(গ) 2 N
(ঘ) 12 N

১১। ওজন $W = ?$

- (ক) m/g
(খ) mg
(গ) $m+g$
(ঘ) g/m

২। $m=13\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 52 kg m/s
(খ) 13 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 17 kg m/s

১২। 2 kg ভরের বস্তুতে ত্বরণ 5 m/s^2 হলে বল কত?

- (ক) 10 N
(খ) 7 N
(গ) 0.4 N
(ঘ) 5 N

৩। $m=17\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 34 N
(খ) 17 N
(গ) 2 N
(ঘ) 19 N

১৩। 2 kg ভর, বেগ 10 m/s হলে ভরবেগ কত?

- (ক) 20 kg m/s
(খ) 12 kg m/s
(গ) 5.0 kg m/s
(ঘ) 2 kg m/s

৪। $m=20\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 80 kg m/s
(খ) 20 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 24 kg m/s

১৪। 20 N বল 0.5 s ক্রিয়া করলে আবেগ কত?

- (ক) 10.0 N s
(খ) 40.0 N s
(গ) 20.5 N s
(ঘ) 0.5 N s

৫। $m=24\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 48 N
(খ) 24 N
(গ) 2 N
(ঘ) 26 N

১৫। $m=1\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 4 kg m/s
(খ) 1 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 5 kg m/s

৬। $m=27\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 108 kg m/s
(খ) 27 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 31 kg m/s

১৬। $m=5\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 10 N
(খ) 5 N
(গ) 2 N
(ঘ) 7 N

৭। 2 N বল 3 s ক্রিয়ায় আবেগ কত?

- (ক) 6 N s
(খ) 2 N s
(গ) 3 N s
(ঘ) 0.6666666666666666 N s

১৭। $m=8\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 32 kg m/s
(খ) 8 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 12 kg m/s

৮। 16 N বল 3 s ক্রিয়ায় আবেগ কত?

- (ক) 48 N s
(খ) 16 N s
(গ) 3 N s
(ঘ) 5.333333333333333 N s

১৮। $m=12\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 24 N
(খ) 12 N
(গ) 2 N
(ঘ) 14 N

৯। 30 N বল 3 s ক্রিয়ায় আবেগ কত?

- (ক) 90 N s
(খ) 30 N s
(গ) 3 N s
(ঘ) 10.0 N s

১৯। $m=15\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 60 kg m/s
(খ) 15 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 19 kg m/s

১০। নিউটনের প্রথম সূত্র কোনটির সাথে সম্পর্কিত?

- (ক) জড়তা
(খ) ক্ষমতা
(গ) চাপ
(ঘ) তাপ

২০। $m=19\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 38 N
(খ) 19 N
(গ) 2 N
(ঘ) 21 N

২১। $m=22\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 88 kg m/s
- (খ) 22 kg m/s
- (গ) 4 kg m/s
- (ঘ) 26 kg m/s

২২। $m=26\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 52 N
- (খ) 26 N
- (গ) 2 N
- (ঘ) 28 N

২৩। $m=29\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 116 kg m/s
- (খ) 29 kg m/s
- (গ) 4 kg m/s
- (ঘ) 33 kg m/s

২৪। 10 N বল 3 s ক্রিয়ায় আবেগ কত?

- (ক) 30 N s
- (খ) 10 N s
- (গ) 3 N s
- (ঘ) $3.3333333333333335\text{ N s}$

২৫। 24 N বল 3 s ক্রিয়ায় আবেগ কত?

- (ক) 72 N s
- (খ) 24 N s
- (গ) 3 N s
- (ঘ) 8.0 N s

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→খ	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৩ | সেট ১৯ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।