

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০৩ : বল
এমসিকিউ সেট ০২

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। 10 kg ভর, বেগ 3 m/s হলে ভরবেগ কত?

- (ক) 30 kg m/s
(খ) 13 kg m/s
(গ) 0.3 kg m/s
(ঘ) 10 kg m/s

২। 8 kg ভর, বেগ 5 m/s হলে ভরবেগ কত?

- (ক) 40 kg m/s
(খ) 13 kg m/s
(গ) 0.625 kg m/s
(ঘ) 8 kg m/s

৩। 0.5 kg ভর, বেগ 20 m/s হলে ভরবেগ কত?

- (ক) 10.0 kg m/s
(খ) 20.5 kg m/s
(গ) 40.0 kg m/s
(ঘ) 0.5 kg m/s

৪। 10 N বল 2 s ক্রিয়া করলে আবেগ কত?

- (ক) 20 N s
(খ) 5.0 N s
(গ) 12 N s
(ঘ) 2 N s

৫। 5 N বল 4 s ক্রিয়া করলে আবেগ কত?

- (ক) 20 N s
(খ) 1.25 N s
(গ) 9 N s
(ঘ) 4 N s

৬। 20 N বল 0.5 s ক্রিয়া করলে আবেগ কত?

- (ক) 10.0 N s
(খ) 40.0 N s
(গ) 20.5 N s
(ঘ) 0.5 N s

৭। 8 N বল 3 s ক্রিয়া করলে আবেগ কত?

- (ক) 24 N s
(খ) 2.6666666666666665 N s
(গ) 11 N s
(ঘ) 3 N s

৮। 50 kg ভরের ওজন $g=10 \text{ m/s}^2$ -এ কত?

- (ক) 50 N
(খ) 500 N
(গ) 5.0 N
(ঘ) 60 N

৯। 60 kg ভরের ওজন $g=10 \text{ m/s}^2$ -এ কত?

- (ক) 60 N
(খ) 600 N
(গ) 6.0 N
(ঘ) 70 N

১০। 70 kg ভরের ওজন $g=10 \text{ m/s}^2$ -এ কত?

- (ক) 70 N
(খ) 700 N
(গ) 7.0 N
(ঘ) 80 N

১১। 80 kg ভরের ওজন $g=10 \text{ m/s}^2$ -এ কত?

- (ক) 80 N
(খ) 800 N
(গ) 8.0 N
(ঘ) 90 N

১২। $m=1 \text{ kg}$, $a=2 \text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 2 N
(খ) 1 N
(গ) 2 N
(ঘ) 3 N

১৩। $m=1 \text{ kg}$, $v=4 \text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 4 kg m/s
(খ) 1 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 5 kg m/s

১৪। $m=2 \text{ kg}$, $a=2 \text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 4 N
(খ) 2 N
(গ) 2 N
(ঘ) 4 N

১৫। $m=2 \text{ kg}$, $v=4 \text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 8 kg m/s
(খ) 2 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 6 kg m/s

১৬। $m=3 \text{ kg}$, $a=2 \text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 6 N
(খ) 3 N
(গ) 2 N
(ঘ) 5 N

১৭। $m=3 \text{ kg}$, $v=4 \text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 12 kg m/s
(খ) 3 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 7 kg m/s

১৮। $m=4 \text{ kg}$, $a=2 \text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 8 N
(খ) 4 N
(গ) 2 N
(ঘ) 6 N

১৯। $m=4 \text{ kg}$, $v=4 \text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 16 kg m/s
(খ) 4 kg m/s
(গ) 4 kg m/s
(ঘ) 8 kg m/s

২০। $m=5 \text{ kg}$, $a=2 \text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 10 N
(খ) 5 N
(গ) 2 N
(ঘ) 7 N

২১। $m=5\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 20 kg m/s
- (খ) 5 kg m/s
- (গ) 4 kg m/s
- (ঘ) 9 kg m/s

২২। $m=6\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 12 N
- (খ) 6 N
- (গ) 2 N
- (ঘ) 8 N

২৩। $m=6\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 24 kg m/s
- (খ) 6 kg m/s
- (গ) 4 kg m/s
- (ঘ) 10 kg m/s

২৪। $m=7\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- (ক) 14 N
- (খ) 7 N
- (গ) 2 N
- (ঘ) 9 N

২৫। $m=7\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- (ক) 28 kg m/s
- (খ) 7 kg m/s
- (গ) 4 kg m/s
- (ঘ) 11 kg m/s

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→খ	৯→খ	১০→খ
১১→খ	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৩ | সেট ০২ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অব্যক্তিগত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অব্যক্তিগত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।