

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০৪ : কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি

এমসিকিউ সেট ০৪

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। ৫ kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- (ক) ৯০.০ J
(খ) ৩০ J
(গ) ৬ J
(ঘ) ৫ J

২। ৫ kg কে ৫ m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- (ক) ২৫০ J
(খ) ২৫ J
(গ) ৫ J
(ঘ) ৫ J

৩। ৬ kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- (ক) ১০৮.০ J
(খ) ৩৬ J
(গ) ৬ J
(ঘ) ৬ J

৪। ৬ kg কে ৫ m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- (ক) ৩০০ J
(খ) ৩০ J
(গ) ৫ J
(ঘ) ৬ J

৫। ৭ kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- (ক) ১২৬.০ J
(খ) ৪২ J
(গ) ৬ J
(ঘ) ৭ J

৬। ৭ kg কে ৫ m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- (ক) ৩৫০ J
(খ) ৩৫ J
(গ) ৫ J
(ঘ) ৭ J

৭। ৮ kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- (ক) ১৪৪.০ J
(খ) ৪৮ J
(গ) ৬ J
(ঘ) ৮ J

৮। ৮ kg কে ৫ m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- (ক) ৪০০ J
(খ) ৪০ J
(গ) ৫ J
(ঘ) ৮ J

৯। ৯ kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- (ক) ১৬২.০ J
(খ) ৫৪ J
(গ) ৬ J
(ঘ) ৯ J

১০। ৯ kg কে ৫ m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- (ক) ৪৫০ J
(খ) ৪৫ J
(গ) ৫ J
(ঘ) ৯ J

১১। ১০ kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- (ক) ১৮০.০ J
(খ) ৬০ J
(গ) ৬ J
(ঘ) ১০ J

১২। ১০ kg কে ৫ m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- (ক) ৫০০ J
(খ) ৫০ J
(গ) ৫ J
(ঘ) ১০ J

১৩। ১১ kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- (ক) ১৯৮.০ J
(খ) ৬৬ J
(গ) ৬ J
(ঘ) ১১ J

১৪। ১১ kg কে ৫ m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- (ক) ৫৫০ J
(খ) ৫৫ J
(গ) ৫ J
(ঘ) ১১ J

১৫। ১২ kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- (ক) ২১৬.০ J
(খ) ৭২ J
(গ) ৬ J
(ঘ) ১২ J

১৬। ১২ kg কে ৫ m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- (ক) ৬০০ J
(খ) ৬০ J
(গ) ৫ J
(ঘ) ১২ J

১৭। ১৩ kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- (ক) ২৩৪.০ J
(খ) ৭৮ J
(গ) ৬ J
(ঘ) ১৩ J

১৮। ১৩ kg কে ৫ m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- (ক) ৬৫০ J
(খ) ৬৫ J
(গ) ৫ J
(ঘ) ১৩ J

১৯। ১৪ kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- (ক) ২৫২.০ J
(খ) ৮৪ J
(গ) ৬ J
(ঘ) ১৪ J

২০। ১৪ kg কে ৫ m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- (ক) ৭০০ J
(খ) ৭০ J
(গ) ৫ J
(ঘ) ১৪ J

২১। 15 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- (ক) 270.0 J
- (খ) 90 J
- (গ) 6 J
- (ঘ) 15 J

২৪। 16 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- (ক) 800 J
- (খ) 80 J
- (গ) 5 J
- (ঘ) 16 J

২২। 15 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- (ক) 750 J
- (খ) 75 J
- (গ) 5 J
- (ঘ) 15 J

২৫। 17 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- (ক) 306.0 J
- (খ) 102 J
- (গ) 6 J
- (ঘ) 17 J

২৩। 16 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- (ক) 288.0 J
- (খ) 96 J
- (গ) 6 J
- (ঘ) 16 J

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৪ | সেট ০৪ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।