

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১ : ভৌত রাশি ও পরিমাপ

এমসিকিউ সেট ০২

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০২

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। স্ক্রু গেজের পিচ কাকে বলে?

- ক) এক পূর্ণ আবর্তনে স্ক্রুর অগ্রগতি
খ) বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ
গ) শূন্য ত্রুটি
ঘ) লঘিষ্ঠ গণনা

২। আপেক্ষিক ত্রুটি কাকে বলে?

- ক) পরম ত্রুটি
খ) পরম ত্রুটি ÷ প্রকৃত মান
গ) LC
ঘ) গড় মান

৩। শতকরা ত্রুটি কত?

- ক) আপেক্ষিক ত্রুটি × 100%
খ) পরম ত্রুটি × 100
গ) LC × 100
ঘ) গড় × 100

৪। কাজ ও শক্তির মাত্রা সম্পর্কে কোনটি সত্য?

- ক) ভিন্ন
খ) একই
গ) কাজ ভেক্টর
ঘ) শক্তি মাত্রাহীন

৫। SI উপসর্গ কিলোর মান কোনটি?

- ক) 10^3
খ) 10^6
গ) 10^{-3}
ঘ) 10^2

৬। SI উপসর্গ মেগার মান কোনটি?

- ক) 10^3
খ) 10^6
গ) 10^9
ঘ) 10^{-6}

৭। SI উপসর্গ ন্যানোর মান কোনটি?

- ক) 10^{-6}
খ) 10^{-9}
গ) 10^{-12}
ঘ) 10^{-3}

৮। $1 \mu\text{m}$ সমান কত?

- ক) 10^{-3} m
খ) 10^{-6} m
গ) 10^{-9} m
ঘ) 10^{-2} m

৯। 1 nm সমান কত?

- ক) 10^{-6} m
খ) 10^{-9} m
গ) 10^{-12} m
ঘ) 10^{-3} m

১০। $1 \text{ \AA}$ সমান কত?

- ক) 10^{-8} m
খ) 10^{-10} m
গ) 10^{-9} m
ঘ) 10^{-12} m

১১। 0°C সমান কত কেলভিন?

- ক) 0 K
খ) 100 K
গ) 273 K
ঘ) 373 K

১২। 1 লিটার সমান কত m^3 ?

- ক) 10^{-2} m^3
খ) 10^{-3} m^3
গ) 1 m^3
ঘ) 10^3 m^3

১৩। পূর্ণ বৃত্তে কত রেডিয়ান?

- ক) π
খ) 2π
গ) $\pi/2$
ঘ) 4π

১৪। স্লাইড ক্যালিপার্স কী মাপে?

- ক) তাপমাত্রা
খ) ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য/ব্যাস
গ) চাপ
ঘ) প্রবাহ

১৫। ব্যারোমিটার কী মাপে?

- ক) আর্দ্রতা
খ) বায়ুচাপ
গ) তাপমাত্রা
ঘ) বেগ

১৬। ভিন্ন মাত্রার দুটি রাশিকে কী করা যায় না?

- ক) গুণ
খ) ভাগ
গ) যোগ
ঘ) একটি দিয়ে অন্যটি প্রকাশ

১৭। পদার্থবিজ্ঞানীরা দৃশ্যমান মহাবিশ্বের প্রায় কত শতাংশ ব্যাখ্যা করতে পারেন?

- ক) 4%
- খ) 5%
- গ) 6%
- ঘ) 7%

১৮। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 1 mm এবং ভার্নিয়ারের 10 ভাগ = প্রধানের 9 ভাগ হলে LC কত?

- ক) 0.100 mm
- খ) 0.200 mm
- গ) 0.100 mm
- ঘ) 0.100 mm

১৯। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 1 mm এবং ভার্নিয়ারের 20 ভাগ = প্রধানের 19 ভাগ হলে LC কত?

- ক) 0.050 mm
- খ) 0.100 mm
- গ) 0.100 mm
- ঘ) 0.200 mm

২০। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 1 mm এবং ভার্নিয়ারের 25 ভাগ = প্রধানের 24 ভাগ হলে LC কত?

- ক) 0.040 mm
- খ) 0.080 mm
- গ) 0.100 mm
- ঘ) 0.250 mm

২১। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 1 mm এবং ভার্নিয়ারের 40 ভাগ = প্রধানের 39 ভাগ হলে LC কত?

- ক) 0.025 mm
- খ) 0.050 mm
- গ) 0.100 mm
- ঘ) 0.400 mm

২২। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 1 mm এবং ভার্নিয়ারের 50 ভাগ = প্রধানের 49 ভাগ হলে LC কত?

- ক) 0.020 mm
- খ) 0.040 mm
- গ) 0.100 mm
- ঘ) 0.500 mm

২৩। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 0.5 mm এবং ভার্নিয়ারের 50 ভাগ = প্রধানের 49 ভাগ হলে LC কত?

- ক) 0.010 mm
- খ) 0.020 mm
- গ) 0.050 mm
- ঘ) 0.500 mm

২৪। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 1 mm এবং ভার্নিয়ারের 8 ভাগ = প্রধানের 7 ভাগ হলে LC কত?

- ক) 0.125 mm
- খ) 0.250 mm
- গ) 0.100 mm
- ঘ) 0.080 mm

২৫। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 2 mm এবং ভার্নিয়ারের 20 ভাগ = প্রধানের 19 ভাগ হলে LC কত?

- ক) 0.100 mm
- খ) 0.200 mm
- গ) 0.200 mm
- ঘ) 0.200 mm

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→খ	৩→ক	৪→খ	৫→ক
৬→খ	৭→খ	৮→খ	৯→খ	১০→খ
১১→গ	১২→খ	১৩→খ	১৪→খ	১৫→খ
১৬→গ	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১ : ভৌত রাশি ও পরিমাপ | সেট ০২ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।