

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ৩ : বল
এমসিকিউ সেট ০২

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০২

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। 10 kg ভর, বেগ 3 m/s হলে ভরবেগ কত?

- ক) 30 kg m/s
খ) 13 kg m/s
গ) 0.3 kg m/s
ঘ) 10 kg m/s

২। 8 kg ভর, বেগ 5 m/s হলে ভরবেগ কত?

- ক) 40 kg m/s
খ) 13 kg m/s
গ) 0.625 kg m/s
ঘ) 8 kg m/s

৩। 0.5 kg ভর, বেগ 20 m/s হলে ভরবেগ কত?

- ক) 10.0 kg m/s
খ) 20.5 kg m/s
গ) 40.0 kg m/s
ঘ) 0.5 kg m/s

৪। 10 N বল 2 s ক্রিয়া করলে আবেগ কত?

- ক) 20 N s
খ) 5.0 N s
গ) 12 N s
ঘ) 2 N s

৫। 5 N বল 4 s ক্রিয়া করলে আবেগ কত?

- ক) 20 N s
খ) 1.25 N s
গ) 9 N s
ঘ) 4 N s

৬। 20 N বল 0.5 s ক্রিয়া করলে আবেগ কত?

- ক) 10.0 N s
খ) 40.0 N s
গ) 20.5 N s
ঘ) 0.5 N s

৭। 8 N বল 3 s ক্রিয়া করলে আবেগ কত?

- ক) 24 N s
খ) 2.6666666666666665 N s
গ) 11 N s
ঘ) 3 N s

৮। 50 kg ভরের ওজন $g=10 \text{ m/s}^2$ -এ কত?

- ক) 50 N
খ) 500 N
গ) 5.0 N
ঘ) 60 N

৯। 60 kg ভরের ওজন $g=10 \text{ m/s}^2$ -এ কত?

- ক) 60 N
খ) 600 N
গ) 6.0 N
ঘ) 70 N

১০। 70 kg ভরের ওজন $g=10 \text{ m/s}^2$ -এ কত?

- ক) 70 N
খ) 700 N
গ) 7.0 N
ঘ) 80 N

১১। 80 kg ভরের ওজন $g=10 \text{ m/s}^2$ -এ কত?

- ক) 80 N
খ) 800 N
গ) 8.0 N
ঘ) 90 N

১২। $m=1 \text{ kg}$, $a=2 \text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- ক) 2 N
খ) 1 N
গ) 2 N
ঘ) 3 N

১৩। $m=1 \text{ kg}$, $v=4 \text{ m/s}$ হলে p কত?

- ক) 4 kg m/s
খ) 1 kg m/s
গ) 4 kg m/s
ঘ) 5 kg m/s

১৪। $m=2 \text{ kg}$, $a=2 \text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- ক) 4 N
খ) 2 N
গ) 2 N
ঘ) 4 N

১৫। $m=2 \text{ kg}$, $v=4 \text{ m/s}$ হলে p কত?

- ক) 8 kg m/s
খ) 2 kg m/s
গ) 4 kg m/s
ঘ) 6 kg m/s

১৬। $m=3 \text{ kg}$, $a=2 \text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- ক) 6 N
খ) 3 N
গ) 2 N
ঘ) 5 N

১৭। $m=3\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- ক) 12 kg m/s
- খ) 3 kg m/s
- গ) 4 kg m/s
- ঘ) 7 kg m/s

১৮। $m=4\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- ক) 8 N
- খ) 4 N
- গ) 2 N
- ঘ) 6 N

১৯। $m=4\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- ক) 16 kg m/s
- খ) 4 kg m/s
- গ) 4 kg m/s
- ঘ) 8 kg m/s

২০। $m=5\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- ক) 10 N
- খ) 5 N
- গ) 2 N
- ঘ) 7 N

২১। $m=5\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- ক) 20 kg m/s
- খ) 5 kg m/s
- গ) 4 kg m/s
- ঘ) 9 kg m/s

২২। $m=6\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- ক) 12 N
- খ) 6 N
- গ) 2 N
- ঘ) 8 N

২৩। $m=6\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- ক) 24 kg m/s
- খ) 6 kg m/s
- গ) 4 kg m/s
- ঘ) 10 kg m/s

২৪। $m=7\text{ kg}$, $a=2\text{ m/s}^2$ হলে F কত?

- ক) 14 N
- খ) 7 N
- গ) 2 N
- ঘ) 9 N

২৫। $m=7\text{ kg}$, $v=4\text{ m/s}$ হলে p কত?

- ক) 28 kg m/s
- খ) 7 kg m/s
- গ) 4 kg m/s
- ঘ) 11 kg m/s

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→খ	৯→খ	১০→খ
১১→খ	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৩: বল | সেট ০২ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।