

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ৪ : কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি
এমসিকিউ সেট ০৪

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০৪

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। 5 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- ক) 90.0 J
খ) 30 J
গ) 6 J
ঘ) 5 J

২। 5 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- ক) 250 J
খ) 25 J
গ) 5 J
ঘ) 5 J

৩। 6 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- ক) 108.0 J
খ) 36 J
গ) 6 J
ঘ) 6 J

৪। 6 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- ক) 300 J
খ) 30 J
গ) 5 J
ঘ) 6 J

৫। 7 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- ক) 126.0 J
খ) 42 J
গ) 6 J
ঘ) 7 J

৬। 7 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- ক) 350 J
খ) 35 J
গ) 5 J
ঘ) 7 J

৭। 8 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- ক) 144.0 J
খ) 48 J
গ) 6 J
ঘ) 8 J

৮। 8 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- ক) 400 J
খ) 40 J
গ) 5 J
ঘ) 8 J

৯। 9 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- ক) 162.0 J
খ) 54 J
গ) 6 J
ঘ) 9 J

১০। 9 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- ক) 450 J
খ) 45 J
গ) 5 J
ঘ) 9 J

১১। 10 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- ক) 180.0 J
খ) 60 J
গ) 6 J
ঘ) 10 J

১২। 10 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- ক) 500 J
খ) 50 J
গ) 5 J
ঘ) 10 J

১৩। 11 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- ক) 198.0 J
খ) 66 J
গ) 6 J
ঘ) 11 J

১৪। 11 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- ক) 550 J
খ) 55 J
গ) 5 J
ঘ) 11 J

১৫। 12 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- ক) 216.0 J
খ) 72 J
গ) 6 J
ঘ) 12 J

১৬। 12 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- ক) 600 J
খ) 60 J
গ) 5 J
ঘ) 12 J

১৭। 13 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- ক) 234.0 J
- খ) 78 J
- গ) 6 J
- ঘ) 13 J

১৮। 13 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- ক) 650 J
- খ) 65 J
- গ) 5 J
- ঘ) 13 J

১৯। 14 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- ক) 252.0 J
- খ) 84 J
- গ) 6 J
- ঘ) 14 J

২০। 14 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- ক) 700 J
- খ) 70 J
- গ) 5 J
- ঘ) 14 J

২১। 15 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- ক) 270.0 J
- খ) 90 J
- গ) 6 J
- ঘ) 15 J

২২। 15 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- ক) 750 J
- খ) 75 J
- গ) 5 J
- ঘ) 15 J

২৩। 16 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- ক) 288.0 J
- খ) 96 J
- গ) 6 J
- ঘ) 16 J

২৪। 16 kg কে 5 m উচ্চতায় ($g=10$) PE কত?

- ক) 800 J
- খ) 80 J
- গ) 5 J
- ঘ) 16 J

২৫। 17 kg, $v=6$ m/s হলে KE কত?

- ক) 306.0 J
- খ) 102 J
- গ) 6 J
- ঘ) 17 J

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৪ : কাজ, ক্ষমতা ও শক্তি | সেট ০৪ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।