

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১০ : স্থির তড়িৎ
এমসিকিউ সেট ০৩

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০৩

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=15\ \text{V}$ হলে C কত?

- ক) $1.3333333333333334\text{e-}07\ \text{F}$
খ) $2.9999999999999997\text{e-}05\ \text{F}$
গ) $15\ \text{F}$
ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

২। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=15\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) $0.000225\ \text{J}$
খ) $2.9999999999999997\text{e-}05\ \text{J}$
গ) $15\ \text{J}$
ঘ) $2\ \text{J}$

৩। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=16\ \text{V}$ হলে C কত?

- ক) $1.25\text{e-}07\ \text{F}$
খ) $3.2\text{e-}05\ \text{F}$
গ) $16\ \text{F}$
ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

৪। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=16\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) $0.000256\ \text{J}$
খ) $3.2\text{e-}05\ \text{J}$
গ) $16\ \text{J}$
ঘ) $2\ \text{J}$

৫। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=17\ \text{V}$ হলে C কত?

- ক) $1.176470588235294\text{e-}07\ \text{F}$
খ) $3.4\text{e-}05\ \text{F}$
গ) $17\ \text{F}$
ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

৬। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=17\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) $0.000289\ \text{J}$
খ) $3.4\text{e-}05\ \text{J}$
গ) $17\ \text{J}$
ঘ) $2\ \text{J}$

৭। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=18\ \text{V}$ হলে C কত?

- ক) $1.1111111111111111\text{e-}07\ \text{F}$
খ) $3.6\text{e-}05\ \text{F}$
গ) $18\ \text{F}$
ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

৮। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=18\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) $0.000324\ \text{J}$
খ) $3.6\text{e-}05\ \text{J}$
গ) $18\ \text{J}$
ঘ) $2\ \text{J}$

৯। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=19\ \text{V}$ হলে C কত?

- ক) $1.0526315789473683\text{e-}07\ \text{F}$
খ) $3.7999999999999995\text{e-}05\ \text{F}$
গ) $19\ \text{F}$
ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

১০। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=19\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) $0.00036099999999999994\ \text{J}$
খ) $3.7999999999999995\text{e-}05\ \text{J}$
গ) $19\ \text{J}$
ঘ) $2\ \text{J}$

১১। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=20\ \text{V}$ হলে C কত?

- ক) $1\text{e-}07\ \text{F}$
খ) $3.9999999999999996\text{e-}05\ \text{F}$
গ) $20\ \text{F}$
ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

১২। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=20\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) $0.00039999999999999996\ \text{J}$
খ) $3.9999999999999996\text{e-}05\ \text{J}$
গ) $20\ \text{J}$
ঘ) $2\ \text{J}$

১৩। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=21\ \text{V}$ হলে C কত?

- ক) $9.523809523809524\text{e-}08\ \text{F}$
খ) $4.2\text{e-}05\ \text{F}$
গ) $21\ \text{F}$
ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

১৪। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=21\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) $0.000441\ \text{J}$
খ) $4.2\text{e-}05\ \text{J}$
গ) $21\ \text{J}$
ঘ) $2\ \text{J}$

১৫। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=22\ \text{V}$ হলে C কত?

- ক) $9.09090909090909\text{e-}08\ \text{F}$
খ) $4.4\text{e-}05\ \text{F}$
গ) $22\ \text{F}$
ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

১৬। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=22\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) $0.000484\ \text{J}$
খ) $4.4\text{e-}05\ \text{J}$
গ) $22\ \text{J}$
ঘ) $2\ \text{J}$

১৭। $Q=2\text{ }\mu\text{C}$, $V=23\text{ V}$ হলে C কত?

- ক) $8.695652173913042\text{e-}08\text{ F}$
খ) $4.6\text{e-}05\text{ F}$
গ) 23 F
ঘ) $2\text{e-}06\text{ F}$

১৮। $C=2\text{ }\mu\text{F}$, $V=23\text{ V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) 0.000529 J
খ) $4.6\text{e-}05\text{ J}$
গ) 23 J
ঘ) 2 J

১৯। $Q=2\text{ }\mu\text{C}$, $V=24\text{ V}$ হলে C কত?

- ক) $8.33333333333333\text{e-}08\text{ F}$
খ) $4.8\text{e-}05\text{ F}$
গ) 24 F
ঘ) $2\text{e-}06\text{ F}$

২০। $C=2\text{ }\mu\text{F}$, $V=24\text{ V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) 0.000576 J
খ) $4.8\text{e-}05\text{ J}$
গ) 24 J
ঘ) 2 J

২১। $Q=2\text{ }\mu\text{C}$, $V=25\text{ V}$ হলে C কত?

- ক) $8\text{e-}08\text{ F}$
খ) $4.999999999999996\text{e-}05\text{ F}$
গ) 25 F
ঘ) $2\text{e-}06\text{ F}$

২২। $C=2\text{ }\mu\text{F}$, $V=25\text{ V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) $0.0006249999999999999\text{ J}$
খ) $4.999999999999996\text{e-}05\text{ J}$
গ) 25 J
ঘ) 2 J

২৩। $Q=2\text{ }\mu\text{C}$, $V=26\text{ V}$ হলে C কত?

- ক) $7.692307692307692\text{e-}08\text{ F}$
খ) $5.2\text{e-}05\text{ F}$
গ) 26 F
ঘ) $2\text{e-}06\text{ F}$

২৪। $C=2\text{ }\mu\text{F}$, $V=26\text{ V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) 0.000676 J
খ) $5.2\text{e-}05\text{ J}$
গ) 26 J
ঘ) 2 J

২৫। $Q=2\text{ }\mu\text{C}$, $V=27\text{ V}$ হলে C কত?

- ক) $7.407407407407407\text{e-}08\text{ F}$
খ) $5.4\text{e-}05\text{ F}$
গ) 27 F
ঘ) $2\text{e-}06\text{ F}$

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১০ : স্থির তড়িৎ | সেট ০৩ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।