

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১০ : স্থির তড়িৎ
এমসিকিউ সেট ০৪

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০৪

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=27\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) 0.0007289999999999999 J
খ) $5.4\text{e-}05\ \text{J}$
গ) 27 J
ঘ) 2 J

২। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=28\ \text{V}$ হলে C কত?

- ক) 7.142857142857142e-08 F
খ) $5.6\text{e-}05\ \text{F}$
গ) 28 F
ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

৩। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=28\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) 0.000784 J
খ) $5.6\text{e-}05\ \text{J}$
গ) 28 J
ঘ) 2 J

৪। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=29\ \text{V}$ হলে C কত?

- ক) 6.89655172413793e-08 F
খ) $5.8\text{e-}05\ \text{F}$
গ) 29 F
ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

৫। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=29\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) 0.000841 J
খ) $5.8\text{e-}05\ \text{J}$
গ) 29 J
ঘ) 2 J

৬। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=30\ \text{V}$ হলে C কত?

- ক) 6.666666666666667e-08 F
খ) $5.9999999999999995\text{e-}05\ \text{F}$
গ) 30 F
ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

৭। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=30\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) 0.0009 J
খ) $5.9999999999999995\text{e-}05\ \text{J}$
গ) 30 J
ঘ) 2 J

৮। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=31\ \text{V}$ হলে C কত?

- ক) 6.451612903225806e-08 F
খ) $6.2\text{e-}05\ \text{F}$
গ) 31 F
ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

৯। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=31\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) 0.000961 J
খ) $6.2\text{e-}05\ \text{J}$
গ) 31 J
ঘ) 2 J

১০। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=32\ \text{V}$ হলে C কত?

- ক) $6.25\text{e-}08\ \text{F}$
খ) $6.4\text{e-}05\ \text{F}$
গ) 32 F
ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

১১। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=32\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) 0.001024 J
খ) $6.4\text{e-}05\ \text{J}$
গ) 32 J
ঘ) 2 J

১২। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=33\ \text{V}$ হলে C কত?

- ক) 6.060606060606061e-08 F
খ) $6.599999999999999\text{e-}05\ \text{F}$
গ) 33 F
ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

১৩। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=33\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) 0.001089 J
খ) $6.599999999999999\text{e-}05\ \text{J}$
গ) 33 J
ঘ) 2 J

১৪। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=34\ \text{V}$ হলে C কত?

- ক) 5.88235294117647e-08 F
খ) $6.8\text{e-}05\ \text{F}$
গ) 34 F
ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

১৫। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=34\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) 0.001156 J
খ) $6.8\text{e-}05\ \text{J}$
গ) 34 J
ঘ) 2 J

১৬। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=35\ \text{V}$ হলে C কত?

- ক) 5.714285714285714e-08 F
খ) $7\text{e-}05\ \text{F}$
গ) 35 F
ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

১৭। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=35\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) 0.001225 J
- খ) $7\text{e-}05\ \text{J}$
- গ) 35 J
- ঘ) 2 J

১৮। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=36\ \text{V}$ হলে C কত?

- ক) 5.555555555555555e-08 F
- খ) $7.2\text{e-}05\ \text{F}$
- গ) 36 F
- ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

১৯। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=36\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) 0.001296 J
- খ) $7.2\text{e-}05\ \text{J}$
- গ) 36 J
- ঘ) 2 J

২০। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=37\ \text{V}$ হলে C কত?

- ক) 5.405405405405405e-08 F
- খ) $7.4\text{e-}05\ \text{F}$
- গ) 37 F
- ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

২১। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=37\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) 0.001369 J
- খ) $7.4\text{e-}05\ \text{J}$
- গ) 37 J
- ঘ) 2 J

২২। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=38\ \text{V}$ হলে C কত?

- ক) 5.2631578947368416e-08 F
- খ) 7.599999999999999e-05 F
- গ) 38 F
- ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

২৩। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=38\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) 0.0014439999999999998 J
- খ) 7.599999999999999e-05 J
- গ) 38 J
- ঘ) 2 J

২৪। $Q=2\ \mu\text{C}$, $V=39\ \text{V}$ হলে C কত?

- ক) 5.128205128205128e-08 F
- খ) $7.8\text{e-}05\ \text{F}$
- গ) 39 F
- ঘ) $2\text{e-}06\ \text{F}$

২৫। $C=2\ \mu\text{F}$, $V=39\ \text{V}$ হলে $U=\frac{1}{2}CV^2$ কত?

- ক) 0.001521 J
- খ) $7.8\text{e-}05\ \text{J}$
- গ) 39 J
- ঘ) 2 J

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১০ : স্থির তড়িৎ | সেট ০৪ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।