

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ১২ : চুম্বকত্ব
এমসিকিউ সেট ০৪

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০৪

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। $n=22$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- ক) $5.529e-05$ T
খ) 22 T
গ) 2 T
ঘ) 0

২। $n=24$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- ক) $6.032e-05$ T
খ) 24 T
গ) 2 T
ঘ) 0

৩। $n=26$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- ক) $6.535e-05$ T
খ) 26 T
গ) 2 T
ঘ) 0

৪। $n=28$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- ক) $7.037e-05$ T
খ) 28 T
গ) 2 T
ঘ) 0

৫। $n=30$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- ক) $7.540e-05$ T
খ) 30 T
গ) 2 T
ঘ) 0

৬। $n=32$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- ক) $8.042e-05$ T
খ) 32 T
গ) 2 T
ঘ) 0

৭। $n=34$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- ক) $8.545e-05$ T
খ) 34 T
গ) 2 T
ঘ) 0

৮। $n=36$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- ক) $9.048e-05$ T
খ) 36 T
গ) 2 T
ঘ) 0

৯। $n=38$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- ক) $9.550e-05$ T
খ) 38 T
গ) 2 T
ঘ) 0

১০। $n=40$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- ক) $1.005e-04$ T
খ) 40 T
গ) 2 T
ঘ) 0

১১। $n=42$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- ক) $1.056e-04$ T
খ) 42 T
গ) 2 T
ঘ) 0

১২। $n=44$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- ক) $1.106e-04$ T
খ) 44 T
গ) 2 T
ঘ) 0

১৩। $n=46$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- ক) $1.156e-04$ T
খ) 46 T
গ) 2 T
ঘ) 0

১৪। $n=48$ পাক/মিটার, $I=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n I$ প্রায় কত?

- ক) $1.206e-04$ T
খ) 48 T
গ) 2 T
ঘ) 0

- ১৫। $n=50$ পাক/মিটার, $l=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n l$ প্রায় কত?
 ক) $1.257e-04$ T
 খ) 50 T
 গ) 2 T
 ঘ) 0
- ১৬। $n=52$ পাক/মিটার, $l=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n l$ প্রায় কত?
 ক) $1.307e-04$ T
 খ) 52 T
 গ) 2 T
 ঘ) 0
- ১৭। $n=54$ পাক/মিটার, $l=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n l$ প্রায় কত?
 ক) $1.357e-04$ T
 খ) 54 T
 গ) 2 T
 ঘ) 0
- ১৮। $n=56$ পাক/মিটার, $l=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n l$ প্রায় কত?
 ক) $1.407e-04$ T
 খ) 56 T
 গ) 2 T
 ঘ) 0
- ১৯। $n=58$ পাক/মিটার, $l=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n l$ প্রায় কত?
 ক) $1.458e-04$ T
 খ) 58 T
 গ) 2 T
 ঘ) 0
- ২০। $n=60$ পাক/মিটার, $l=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n l$ প্রায় কত?
 ক) $1.508e-04$ T
 খ) 60 T
 গ) 2 T
 ঘ) 0

- ২১। $n=62$ পাক/মিটার, $l=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n l$ প্রায় কত?
 ক) $1.558e-04$ T
 খ) 62 T
 গ) 2 T
 ঘ) 0
- ২২। $n=64$ পাক/মিটার, $l=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n l$ প্রায় কত?
 ক) $1.608e-04$ T
 খ) 64 T
 গ) 2 T
 ঘ) 0
- ২৩। $n=66$ পাক/মিটার, $l=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n l$ প্রায় কত?
 ক) $1.659e-04$ T
 খ) 66 T
 গ) 2 T
 ঘ) 0
- ২৪। $n=68$ পাক/মিটার, $l=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n l$ প্রায় কত?
 ক) $1.709e-04$ T
 খ) 68 T
 গ) 2 T
 ঘ) 0
- ২৫। $n=70$ পাক/মিটার, $l=2$ A, $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}$ হলে $B=\mu_0 n l$ প্রায় কত?
 ক) $1.759e-04$ T
 খ) 70 T
 গ) 2 T
 ঘ) 0

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১২: চুম্বকত্ব | সেট ০৪ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।