Parois de l'abdomen



Dr. A. ABDALLAH

Laboratoire d'Anatomie Médico-Chirurgicale
Faculté de Médecine – Annaba
Email: abourahaf_dz@yahoo.fr


L'« *abdomen palpatoire* » ..



...une « touch tablet »

sensible à 9 icônes






Plan du cours

- Introduction à l'abdomen
- Paroi antéro-latérale
- Paroi postérieure




Introduction à l'abdomen



© TemplatesWise.com

Définition


- = **région moyenne du tronc**
- Situé entre: **thorax** en haut et **pelvis** en bas




Limites

En haut:
Diaphragme

En bas:
se continue par
cavité pelvienne



Constitution


Paroi
Cavité

Paroi abdominale:
Constituée de…

- **Squelette ostéo-musculaire**

  (**muscles** insérés sur : **rachis**, **gril costal** et **os coxaux**)



Paroi abdominale:

Se distingue en…






(1) Paroi antéro-latérale
= **région du ventre**


(2) Paroi postérieure
= **partie inférieure du dos**

Cavité abdominale:
Contient…

- **Appareils digestif** et **urinaire**
- **Rate** et **surrénales**
- **Gros vaisseaux**
- **Nerfs** (sympathique, vague)




Reconstitution…




Cadre osseux de l'abdomen

Plan musculo-aponévrotique antérieur







Plan musculo-aponévrotique postérieur






Plans cutané et sous-cutané de l'abdomen





Paroi antéro-latérale




Constitution musculaire

Points faibles


Anatomie de surface



5 muscles pairs




(1) Muscle droit de l'abdomen



- Ou: **grand droit, droit antérieur**
- **Vertical**
- Tendu entre: **thorax** et **pubis**
- Entrecoupé par: **3** à **4** **intersections tendineuses**
- Relié à son homologue par: **ligne blanche**
- **Action :** fléchisseur du tronc


(2) Muscle pyramidal



- **Annexé** au **muscle droit**
- **Action:**
  tenseur de la ligne blanche

(3) Muscles larges de l'abdomen

De la superficie à la profondeur:



(1) Oblique externe
(grand oblique)

(2) Oblique interne
(petit oblique)

(3) Transverse de l'abdomen




Oblique externe

Oblique interne

Transverse de l'abdomen


Oblique externe

- **Oblique:**
  en bas et dedans
- Du: **thorax**
  Vers: **os coxal** et **ligne blanche**
- **Action :**
  rotateur et **fléchisseur**
  du tronc




Oblique interne

- **Oblique:**
  en haut et dedans
- De: **l'os coxal**
  Vers: **thorax**, **ligne blanche** et **pubis**
- **Action :**
  idem



Transverse de l'abdomen

- **En ceinture**
- Du: **thorax**, **rachis lombaire** et **os coxal**
  Vers: **ligne blanche**
- **Action :**
  expirateur



2 rôles d'ensemble (muscles droit et larges)

1. **Rôle statique:**
   Maintenir le contenu abdominal

2. **Rôle dynamique:**
   Augmenter la pression intra-abdominale
   ➔ comprimer les viscères

Interviennent dans:

- **Miction**
- **Défécation**
- **Expiration forcée**
- **Toux**
- **Vomissement**
- **Accouchement**

Constitution musculaire

Points faibles


Anatomie de surface



Au nombre de **4**…


(1) Anneau fémoral

- Situé au-dessous de: **ligament inguinal** (arcade crurale)
- Occupé par: **vaisseaux fémoraux**




- Siège des:

  hernies crurales



(2) Canal inguinal





S’ouvre par:
2 orifices:
- Profond
- superficiel

Situé au-dessus de:
ligament inguinal

Orifice superficiel du canal inguinal






- Canal inguinal traversé par: **ligament rond** (femme) ou **cordon spermatique** (homme)


- Siège des:


hernies inguinales








Hernies: inguinale / crurale




h. inguin.
h. crurale







Ht
AR

(3) Ombilic

- = **anneau fibreux rétracté**
- Vestige du:
  cordon ombilical
- Situé sur:
  trajet de la ligne blanche
- Siège des:
  hernies et **fistules ombilicales**





Hernie ombilicale






Fistule ombilicale ???





(4) Ligne blanche



- = **entrecroisement** des fascias des **muscles larges** des 2 côtés
- Tendue entre: **appendice xiphoïde** et **pubis**
- **Interrompue** par: **ombilic**
- Siège des **hernies**

Hernie de la ligne blanche (épigastrique)





Constitution musculaire

Points faibles

Anatomie de surface



Permet:

palpation

« méthodique » et « ciblée »

de l'abdomen





Permet:

Localiser

un organe, une douleur, une masse


abdominaux








- **4 lignes** délimitant **9 quadrants**



4 lignes

2 lignes verticales, **D** et **G** :
mi-distance entre **ligne médiane** et **épine iliaque antéro-supérieure**




2 lignes horizontales :


- **Sup** = **rebords costaux**
- **Inf** = **épines iliaques antéro-supérieures**

9 quadrants


- **Hypochondre droit:**
  foie, vésicule biliaire, angle colique droit
- **Épigastre:**
  estomac, foie
- **Hypochondre gauche:**
  angle colique gauche, estomac, rate




- **Flanc droit :**
  rein droit, côlon ascendant
- **Région ombilicale :**
  pancréas, intestin grêle, côlon transverse
- **Flanc gauche :**
  rein gauche, côlon descendant



- **Fosse iliaque droite:**
  cæco-appendice,
  ovaire droit
- **Hypogastre:**
  vessie, utérus
- **Fosse iliaque gauche:**
  colon sigmoïde,
  ovaire gauche



Paroi postérieure



Constitution musculaire

Points faibles


Anatomie de surface



4 groupes musculaires

de derrière vers l'avant:

Groupe musculaire superficiel




Grand dorsal


Dentelé postéro-inférieur

Groupe musculaire moyen

Muscles spinaux



Groupe musculaire profond




Inter-transversaires des lombes

Carré des lombes

Groupe musculaire antérieur

Ilio-psoas



Constitution musculaire

Points faibles


Anatomie de surface



À l’origine des **hernies lombaires**


Au nombre de **2**…

(1) Quadrilatère lombaire
(de Grynfeltt)




Situé entre:

- Dentelé postéro-inférieur
- 12ème côte
- Oblique interne
- Masse sacro-lombaire




Hernie de Grynfeltt






(2) Triangle lombaire
(de Jean-Louis Petit)



Situé entre:




Constitution musculaire

Points faibles

Anatomie de surface




Limites
de la paroi postérieure



En haut:

12ème côte et **T12**



En bas:

crêtes iliaques


3 régions

Latéralement:

2 régions lombaires:

Répondent aux:


- **Plèvres**
- **Rate**
- **Reins**
- **Uretères**



Au milieu:


région vertébrale médiane

Bonne révision



GRYNFELTT Joseph Casimir (1840-1913)

- Chirurgien français
- Professeur d'obstétrique et de gynécologie



PETIT Jean-Louis (1674-1750)

- Chirurgien et anatomiste parisien
- Directeur de l'Académie de chirurgie à Paris

