

Péritoine

Dr. A. ABDALLAH
Pr. S. BOUKOFFA
Laboratoire d'Anatomie
Médico-Chirurgicale
Faculté de Médecine – Annaba
Email: abourahaf_dz@yahoo.fr

Leçon d'anatomie de Willem van der Meer


Par: **Jansz van Mierevelt (1617)**



Définition

= membrane séreuse, tapissant:

Viscères abdomino-pelviens



Face profonde de la cavité abdomino-pelvienne

4 rôles

Le péritoine..

(1) Espace de glissement entre viscères

Assuré par: **cavité péritonéale**

(2) Moyen de fixité et de distribution vasculaire pour viscères

Assurée par: **replis péritonéaux**


(3) Organe de défense contre microbes

Assurée par: **histiocytes** et **lymphocytes**


(4) Membrane d'absorption/résorption

Intérêt dans: **dialyse péritonéale+++**

Principe de la dialyse péritonéale



Constitution



Repli péritonéal

Cavité péritonéale

Feuillet pariétal

Feuillet viscéral

Organe intra-péritonéal

Feuillet viscéral


Feuillet pariétal

Replis péritonéaux

Cavité péritonéale

Tapisse:

Face externe des **viscères abdomino-pelviens**




Feuillet viscéral

Feuillet pariétal

Replis péritonéaux

Cavité péritonéale



- Tapisse:

face profonde

de **la cavité**

abdomino-pelvienne

Topographiquement


On lui distingue:

4 parties

Péritoine pariétal diaphragmatique

Péritoine pariétal antérieur

Péritoine pariétal pelvien



Péritoine pariétal postérieur

Remarque: culs-de-sac pelviens


Se forme par: **P. P. Pelvien**


entre: **organes pelviens**

Le plus important:

cul-de-sac de Douglas


(en avant du rectum)





Feuillet pariétal ménage

2 espaces:



Espace rétro-péritonéal

Occupé par :
reins + uretères + gros vaisseaux

Espace sous-péritonéal


Occupé par:
organes génitaux internes + rectum + vessie

Feuillet viscéral


Feuillet pariétal

Replis péritonéaux

Cavité péritonéale




- **Réunissent:**
  2 feuillets
  du péritoine
- **Cloisonnent:**
  cavité
  péritonéale




On compte **4 types**:

(1) Méso


- Relie:
  viscère et **paroi**
- Contient:
  pédicule vasculaire
- **Exemples:**





Méso-colon transverse
Mésentère
Méso-sigmoïde

(2) Fascia

- Formé par:
  accolement du **méso**
  à **la paroi postérieure**
- **Exemples:**








Fascia de Toldt droit


Fascia de Toldt gauche

Fascia de Treitz









Remarque:


Organes **fixés** par **le fascia**

sont considérés des


organes rétro-péritonéaux secondairement

(3) Ligament


- Relie:
  viscère et **viscère**
  ou **viscère** et **paroi**
- **Pas** de **pédicule vasculaire**
- **Exemples:**




Ligament large de l'utérus




Ligament falciforme du foie






(4) Omentum


- Ou: **épiploon**
- Relie: **2 organes**
- Contient: **pédicule vasculaire**
- **Exemples:**




Épiploon gastro-hépatique
(petit épiploon)



Épiploon gastro-colique
(grand épiploon)







Épiploon pancréatico-splénique


Épiploon gastro-splénique

Remarque: recessus omental

- Ou: **arrière cavité des épiploons**
- = **diverticule** de **la cavité péritonéale**
- Situé: **derrière l'estomac**
- Délimité par: **4 épiploons**








Feuillet viscéral

Feuillet pariétal


Replis péritonéaux


Cavité péritonéale



- **Virtuelle**
- Située entre:
  2 feuillets du péritoine
- Cloisonnée par:
  replis péritonéaux

- Divisée par:
  méso-colon transverse,
  en **2 étages** :
  - **Étage sus-mésocolique**
  - **Étage sous-mésocolique**




Etage
sus-mésocolique
Colon
transverse
Etage
sous-mésocolique

Ascite = épanchement liquidien de la cavité péritonéale



Parois de l'abdomen



Dr. A. ABDALLAH

Laboratoire d'Anatomie Médico-Chirurgicale
Faculté de Médecine – Annaba
mail: abourahaf_dz@yahoo.fr