

Jéjuno-iléon



Dr. A. ABDALLAH

Laboratoire d'Anatomie Médico-Chirurgicale
Faculté de Médecine – Annaba
Email: abourahaf_dz@yahoo.fr



Le jéjuno-iléon...

« grande muraille » du corps






Plan du cours

- Introduction
- Morphologie
- Moyen de fixité: mésentère
- Rapports
- Vaisseaux et Nerfs


Introduction



Définition

- Segment **mobile**

  de l'intestin grêle




- Fait suite au:
  duodénum

  au niveau de:
  angle duodéno-jéjunal (de **Treitz**)

- Se termine dans:
  cæcum

  au niveau de:
  angle iléo-cæcal




Rôle

- Assure


  l'absorption

  des aliments



Remarque: maladie cœliaque (1)

- = **intolérance permanente au gluten**
  (= **protéine** des **céréales**: blé et orge..)
- **Provoque**: **atrophie des villosités** de l'intestin grêle
- **Conséquence**: **malabsorption des nutriments** (fer, calcium, acide folique, vitamines..)
  = **carence alimentaire**



Remarque: maladie cœliaque (2)


- **Signes:**
  - Fatigue
  - Douleurs abdominales
  - Diarrhée
  - Amaigrissement
  - Retard croissance
- **Traitement:**
  régime sans gluten strict et à vie






Situation

- Occupe un large espace dans: **cavité abdomino-pelvienne**




- **Plus étendu**
  à gauche
  qu'à droite
- Bordé par:
  cadre colique



- Entièrement


sous-mésocolique



Morphologie




Division




Partie proximale (= **jéjunum**): 2/5èmes du jéjuno-iléon

Partie distale (= **iléum**): 3/5èmes du jéjuno-iléon


Jéjunum
Iléum


Forme

- = **grandes flexuosités** en « **U** » : **anses intestinales**
- **Nombre** = **15** à **16**
- **Longueur de chacune** = **20** à **40 cm**





2 groupes d’anses…





Groupe supérieur gauche:
anses horizontales

Groupe inférieur droit:
anses verticales

Remarque: Diverticule de Meckel


- = diverticule **inconstant**
- Vestige du:
  canal vitellin
- Situé au niveau de: **l'iléon**
  à **40 cm de l'angle iléo-cæcal**
- Peut contenir:
  tissu pancréatique
  ou **muqueuse gastrique**




Iléon
Mésentère
Iléon
Diverticule
de Meckel


Dimensions


- **Longueur** = **6,50 m** (augmente avec taille)
- **Diamètre** = **2** à **3 cm**



Configuration interne


- **(1) Muqueuse rose** présentant:
  - **Valvules conniventes**
  - **Villosités**





- **(2) Follicules clos**
  = petits amas lymphoïdes saillants à la surface


- **(3) Plaques de Peyer**
  = amas de follicules clos en plaques blanchâtres




Constitution

4 tuniques,

de la **superficie** à la **profondeur:**



Séreuse
Musculeuse
Sous-muqueuse
Muqueuse



Moyen de fixité:
mésentère




- = **méso péritonéal** long
- En forme d'**éventail**
- Présente: **15** à **16** **larges replis**

- Attache le jéjuno-iléon **appendu** à **la paroi abdominale postérieure**






Dissection de l'intestin (1)



Dissection de l'intestin (2)




Dissection de l'intestin

(3)

Description


Présente à décrire:

2 faces et **2 bords:**




Face antérieure
(ou: **droite**)

Face postérieure
(ou: **gauche**)




- **Bord libre,** intestinal

- **Bord adhérent,** pariétal
  = **racine du mésentère**
  - **Trajet oblique**
    en bas et à droite
  - Depuis:
    angle de Treitz
    au: **cæcum**




Hauteur

- **Augmente**:
  - depuis **sa racine**: **15** à **18 cm**
  - jusqu'**aux anses intestinales**: **650 cm**



Hauteur du mésentère



Racine du mésentère

15-18 cm

2,5 %


Bord intestinal

650 cm

100 %

Contenu


- Graisse
- Vaisseaux mésentériques supérieurs
- Vaisseaux intestinaux
- Lymphatiques
- Nerfs







Rapports
WWW.NEWS.CN

En arrière


Duodéno-pancréas
Reins et uretères
Gros vaisseaux
Colon descendant

En avant


- **Grand omentum**
- **Paroi abdominale antérieure**




En haut

- **Colon transverse**

  et son **méso**



En bas




Organes pelviens:

- **vessie**
- **utérus**
  (chez la femme)
- **rectum**


Colon ilio-pelvien

À droite

- **Colon ascendant**
- **Cæcum**



À gauche




Paroi latérale de l'abdomen



Vaisseaux & Nerfs

Artères intestinales


- **Origine:**
  artère mésentérique supérieure
- **Nombre:**
  12 à **15**
- **Trajet:**
  dans **mésentère**




- Se **bifurquent** et s'**anastomosent**
- Forment des séries d'**arcades vasculaires** (**2** à **3 ordres**)



- Du **dernier ordre d'arcades** partent: **artères droites**
- Se rendent aux: **anses grêles**




[4] Vue théorique: Vascu° artel du Jejunum-Iléon



veines intestinales

- **Satellites**
  des artères
- Tributaires de:
  veine mésentérique supérieure



Lymphatiques


(chylifères)

Remarques


- **Chyle:** lymphe chargée d'extraits alimentaires (**graisse émulsionnée**)
- Transporté, **au niveau intestinal**, par capillaires lymphatiques qui forment **vaisseaux chylifères**

Remarques

- Au niveau intestinal, les capillaires lymphatiques transportent **le chyle**, et forment **les vaisseaux chylifères**.
- Les vaisseaux lymphatiques présentent des étranglements en rapport avec **les valvules**.




- **Se drainent** dans:
  nœuds du groupe juxta-intestinal
- **Puis** dans:
  nœuds du groupe central
- **Enfin** vers:
  conduit thoracique



Nerfs

- Proviennent de:

  plexus mésentérique supérieur




Bonne révision

TREITZ Wenzel (ou Vàclav) (1819 - 1872)

- Médecin autrichien
- Professeur de pathologie et d'anatomie pathologique

