
Uretères




Plan du cours

- Introduction
- Morphologie
- Rapports
- Vaisseaux & Nerfs

- = **2 conduits musculo-membraneux, excréteurs de l'urine**
- Reliant, chacun: **pyélon** à **la vessie**
- Sont: **blanchâtres**, **fermes** et **contractiles**



Font partie des voies excrétrices du rein:




Petits calices:
9 à 10 petits canaux, long de 1 cm

Grands calices:
3 à 4 regroupements de petits calices

Pyélon (bassinet ou pelvis rénal)**:**
Segment **dilaté**, situé à la jonction des grands calices


Uretère




Calices

Pyélon

Uretère




Origine



- Fait suite au:
  pyélon

- Au niveau de:
  jonction pyélo-urétérale


- En regard du: **processus transverse de L2**
- À **4 cm** de **la ligne médiane**




Trajet

- **Long = 25** à **30 cm**
- Entièrement **rétro-péritonéal**

(?? Ou Extrapéritonéal)






- **Vertical**

puis


recourbé

- Traverse **3 régions**:
  - **Lombaire**
  - **Iliaque**
  - **Pelvienne**




Terminaison

- Dans: **vessie**
- **Distance inter-urétérale = 4 cm**




- S’ouvre au niveau du **trigone vésical (de Lieutaud)**
- Par: **méat urétéral**



Remarque

- **Uretère** traverse **la vessie obliquement**
- Ce trajet:
  - **s'oppose au reflux des urines** vers le rein
  - **le fixe** lors de **la réplétion vésicale**



Rétrécissements

Diamètre normal = 3 à 5 mm


Uretère présente:

3 points rétrécis:

Rétrécissement pyélo-urétéral:
à son origine

Rétrécissement iliaque:
au détroit supérieur

Rétrécissement intra-mural:
à sa terminaison






UIV

(Urographie intraveineuse)

Intérêt pratique




- Ces rétrécissements expliquent: **localisation des lithiases urétérales**
- **2 conséquences:**
  - **obstruction de l'uretère**
  - **hydronéphrose** (menace la fonction rénale)


5
6
ST


1
2
3
4
5

Colique néphrétique






Échographie



Hydronéphrose



Calcul urétéral




A S P

(**A**bdomen

Sans


Préparation)



Rein bloqué et dilaté

Calcul dans l'uretère lombaire

Calcul dans l'uretère pelvien





Uroscanner


Reconstruction 3D

Fragmentation par laser

Lithotripsie
chirurgie








Extraction d'un

calcul urétéral

lors d'une

urétéroscopie


Urétéroscope



Structure

3 tuniques…

de la superficie à la profondeur :



Adventice

Musculeuse
où siègent:
mouvements
péristaltiques

Muqueuse




Remarque: ondes péristaltiques

- Commencent **dans le pyélon**
- Chassent les urines **dans les uretères** toutes les **20** à **30 sec**
- S'étalent **tout au long de l'uretère**
- Commandent: **ouverture** et **fermeture du méat urétéral** de la vessie


Anomalies

1 Anomalies de nombre: **bifidité** et **duplicité** pyélo-urétérale




2

Anomalies d‘abouchement (ectopique):
vagin, **urètre**,
vésicules séminales



3 Anomalies de trajet:
trajet **rétro-cave**






Rapports

Uretère lombaire


À droite :

- 2ème duodénum
- Rein droit
- Colon ascendant
- V C I
- Muscle psoas
- Vaisseaux gonadiques (spermatiques / ovariens)



Anses intestinales

À gauche :



Rein gauche

Colon descendant

Aorte

Vaisseaux gonadiques
(spermatiques / ovariens)


Muscle psoas

Anses intestinales

Uretère iliaque

À droite:

À gauche:



Vaisseaux iliaques externes droits


Cæco-appendice

Vaisseaux iliaques communs gauches

colon sigmoïde


Uretère pelvien

Présente 2 segments:




Segment pariétal,


répond aux:



Segment viscéral | chez l'homme



Segment viscéral | chez la femme




Base du ligament large de l'utérus

Artère utérine
(le croise à **15 mm** du col de l'utérus)

Vagin

Vessie

Intérêt pratique



- **Chez la femme,**
  le segment viscéral de l'uretère pelvien
  est menacé au cours des **hystérectomies**
- Ils disent: « *on évalue une hystérectomie au bocal d'urine* »

Vascularisation artérielle

Étagée…

Assurée par **les artères :**

Pour:
uretère lombaire

R é n a l e

Pour:
uretère iliaque

Iliaque commune

Pour:


uretère

pelvien

Iliaque interne

Utérine / vésiculo-déférentielle

Vésicales




Vascularisation veineuse

- **Calquée** sur


  la vascularisation

  artérielle




Lymphatiques

- Se drainent dans **les nœuds** :
  - **Latéro-caves**
  - **Latéro-aortiques**
  - **Iliaques communs**
  - **Iliaques externes**
  - **Iliaques internes**



Nerfs


- Proviennent des **plexus**:
  - **Rénaux**
  - **Testiculaires / ovariques**
  - **Hypogastriques inférieurs**






LIEUTAUD Joseph (1703-1780)

- Médecin et anatomiste français


ELEMENTA
PHYSIOLOGIÆ,
JUXTA SOLERTIORA, noviſſimaque Phyſicorum Experimenta, & accuratiores Anatomicorum Obſervationes concinnata.
AUCTORE
JOSEPHO LIEUTAUD
Regis Conſiliario, Anatomes Profeſſore Regio in Univerſitate AQUISEXTIENSI, & Societatis Regiæ LONDINENSIS.
AMSTELODAMI,
Sumptibus FRATRUM DETOURNES.
MDCCXLIX.
en 1749


PRÉCIS
DE
LA MÉDECINE
PRATIQUE,
CONTENANT
L'hiſtoire des Maladies, & la Maniere de les traiter, avec des Obſervations & Remarques critiques ſur les points les plus intéreſſans.
Par M. LIEUTAUD, Médecin de Mgr le DAUPHIN, & des Enfans de France; de l'Académie Royale des Sciences, & de la Société Royale de Londres.
TROISIEME EDITION
Revue & augmentée par l'Auteur.
TOME PREMIER.
A PARIS,
Chez VINCENT, Imprimeur-Libraire de Mgr le Comte de PROVENCE, rue S. Severin.
M DCC LXIX.
AVEC APPROBATION, ET PRIVILEGE DU ROI.
en 1769