
Annexes
de l’utérus

Sont représentés par:


- **La trompe utérine**
- **L'ovaire**
- **Leurs moyens de fixité**

Trompe utérine


Définition

- Ou la trompe de Fallope, le salpinx, l'oviducte.
- C'est un **conduit musculo-membraneux**, **pair** et **symétrique**
- Se détache des **angles droit** et **gauche de l'utérus**
- Puis se dirige **transversalement en dehors**






- **Sa lumière** fait communiquer **la cavité utérine** avec **la cavité péritonéale**
- Ceci explique **les grossesses péritonéales** (grossesses extra-utérines)




Rôles

- Les trompes utérines **captent l'ovule**.
- Le milieu de la **fécondation** de l'ovule par le spermatozoïde (nutrition des gamètes et capacitation des spermatozoïdes),
- conduire le **zygote** vers la cavité utérine pour la nidation et la nutrition.



Anatomie descriptive

- **Longueur = 10 à 12 cm**
- **Calibre = 2 à 3 mm**




- Selon le segment considéré, on lui distingue au cours d'une **hystéro-salpingographie**, **4 segments:**



Segment ampullaire ou **l'ampoule:**
longueur 7 à 8 cm, calibre 7 à 8 mm

Segment isthmique:
longueur 3 à 4 cm, calibre 2 à 4 mm

Segment utérin (interstitiel)**:**
S'ouvre dans la cavité utérine par **l'ostium utérinum**
(1 cm de longueur , 2 mm de calibre)



L'infundibulum
(Pavillon tubaire)


Segment le plus externe

Sa forme évasée en entonnoir à contours festonnés formants **les franges tubaires**

La frange la plus longue est **la frange ovarique (frange de Richard)** qui adhère au pôle supérieur de l'ovaire


Au fond du pavillon la lumière tubaire s'ouvre par **l'ostium abdominal**

Moyens de fixité


Son insertion sur la corne utérine
Méso-salpinx
Utérus
Ovaire
Lig Large
Ligament tubo-ovarien
(rattache la frange ovarique à l'ovaire)

Intérêt pratique: ostium abdominal


- Il fait communiquer la lumière tubaire avec la cavité utérine
- Explique **les grossesses extra-utérines abdominales :** l'œuf fécondé tombe dans la cavité abdominale au lieu d'emprunter le chemin normal, de la lumière tubaire vers la cavité utérine où il va normalement se développer



Ovaire

Définition


- **Glande génitale**
- **Organe péritonisé de situation pelvienne**
- Le lieu de **formation de l'ovule**



Rôles


Production des ovules

- La maturation de l'ovocyte, gouvernée par FSH, a lieu chaque 28jours à partir de la puberté et se déroule tout au long d'un cycle au sein du follicule ovarien pour aboutir à l'ovulation, déclenchée par LH.
- À ce moment, l'ovocyte quittera l'ovaire pour rejoindre l'ampoule, et y être éventuellement fécondé.



Fonction hormonale


- Les ovaires font partie du système endocrinien par la synthèse des hormones sexuelles : en particulier les **œstrogènes** et **progestérone** mais aussi de petites quantités de testostérone.
- Cette production hormonale est contrôlée par **LH et FSH** d'origine hypophysaire



Anatomie descriptive

Forme

- **Organe pair** qui présente la forme d'une **amande** de couleur blanc rosée.
- **Surface** chez l'adulte est irrégulière et mamelonnée
- **Poids** = est variable selon l'âge :
  - chez l'enfant l'ovaire pèse de **2 à 3 g** ;
  - chez la femme adulte **6** à **8 g**
- **Longueur** = **4cm**
- **Largeur** = **2cm**
- **Épaisseur chez la femme adulte** = **1cm**



Situation


Organe **très mobile** à **situation variable**

Chez la nullipare


l'ovaire est situé en arrière du ligament large dans **la fosse ovarique** (la fossette de Krause)


Chez la multipare

Il est plus bas situé, dans **la fosse infra-ovarique** (la fossette sous ovarienne de Claudius)



Péritoine
&
Moyens de fixité


Utérus
Ovaire
Lig Large
Ligament utéro-ovarien
Ligament tubo-ovarien
Méso-varium



Ligament lombo-ovarien

(cordon fibro-musculaire qui accompagne les vaisseaux ovariens depuis la région lombaire jusqu'au hile de l'ovaire)

Intérêts pratiques

1. **La mobilité de l'ovaire** explique la possibilité de **torsion**
2. Par ailleurs, l'ovaire peut **se prolaber jusqu'au fond du cul de sac de Douglas**, chez **les grandes multipares**
3. En cas de **développement d'un kyste** important, l'ovaire **se déplace en direction de la cavité abdominale**

Vascularisation & innervation de l'utérus et ses annexes


Artères


Utérus

Irrigué **principalement** par:

l'artère utérine

- **Origine:**
  tronc antérieur
  de **l'artère hypogastrique**
- **Trajet:**
  - **Sinueux** et **long** (15 cm)
  - **Triple sa longueur** au cours de **la grossesse**





- **Rapport important:**
  uretère pelvien +++


  [il ne faut pas le négliger au cours de **l'hystérectomie**]

  « on évalue une hystérectomie au bocal d'urine »

- **Terminaison:** corne utérine; par **2 branches terminales:**

Artère rétrograde du fond

Artère annexielle: se divise en **artère tubaire médiale** et **artère ovarienne médiale**



• Branches collatérales:

Rameau du ligament rond

Rameaux transversaux (corps utérin)


Artère cervico-vaginale et **artères cervicales** (col utérin et vagin)

Plusieurs rameaux pour **uretère**, **vessie** et **vagin**




Remarque

- **Accessoirement**, l'utérus est irrigué par:
  - **Artère du ligament rond**
  - **Artère ovarique** (branche collatérale de l'aorte abdominale)



Ovaire

Irrigué par: **2 artères**




Artère ovarienne interne:
branche de **l'artère utérine**

Artère ovarique: donne
- **artère tubaire externe** (pour trompe)
- **artère ovarienne externe** (pénètre dans le hile de l'ovaire)

Trompe utérine

Irrigué par: **plusieurs artères**

Plusieurs rameaux tubaires médiaux et **moyens** de l'artère utérine



Artère tubaire latérale de **l'artère ovarique**


Arcade tubaire

Veines


Calquées sur les artères

- **Veines de l’utérus:**

  Forment à sa surface un réseau **veineux plexiforme**, qui se draine vers **les veines iliaques interne** et **externe**




- **Veines de l'ovaire et de la trompe:**
  - Se disposent en **plexus veineux**
  - Se jettent dans **les veines ovarienne** et **utérine**



Lymphatiques

Intérêt: dans **le traitement chirurgical** avec **curage ganglionnaire** lors des **cancers**

- **Lymphatiques de l'utérus:**
  - Drainent **les lymphatiques du corps** et du **col**, et également ceux de **la trompe**
  - Ils sont **largement anastomosés**




- **Lymphatiques du corps:**

  se jettent dans **les nœuds latéro-aortiques** et **iliaques externes**, parfois dans **les nœuds inguinaux superficiels** (groupe supéro-médial)


- **Lymphatiques du col:**

  se jettent dans **les nœuds iliaques externes** et **les nœuds du promontoire**




- **Lymphatiques de l'ovaire:**

  se jettent dans **les nœuds latéro-aortiques**




Nerfs

- Assurée par **le plexus nerveux hypogastrique**
- Complétée par **les fibres sympathiques** qui accompagnent **les artères utérines**




Vagin



Définition


- **Le vagin est l'organe féminin de la copulation**
- **Conduit** qui s'étend du **col utérin** à **la vulve**



Rôle


- **Rôle capital** dans **la fixité de l'utérus**
- **Meilleure voie d'exploration** et **d'examen gynécologiques**
- **Voie d'abord chirurgicale**





Situation


Dans la **cavité pelvienne** **e n t r e :**




Vessie, en avant | **Utérus**, au-dessus | **Rectum**, en arrière

Direction et longueur


- **Direction oblique**
  en bas et **en avant**
- **Longueur : 8 cm**



Configuration externe et rapports


2 extrémités
2 bords
2 faces


Face antérieure



- En rapport avec:
  - **La partie terminale des uretères**
  - **La vessie**


Face postérieure

- En rapport avec:
  - **Le cul-de-sac recto-vaginal**
  - **Le rectum**
  - **Le centre tendineux du périnée**



Bords latéraux

- **Droit** et **gauche**
- Avec **2 segments**:
  pelvien
  et **périnéal**




Extrémité supérieure

- Ou: **fornix vaginal**
- **Insérée** autour du **col utérin**

➔Résultat:


cul-de-sac vaginal

(circulaire)




Extrémité inférieure

- **S'ouvre** au niveau du **vestibule**






Position gynécologique




Cet orifice est **fermé chez la femme vierge**

par un **repli muqueux incomplet** : **Hymen**


(formation anatomique spécifiquement humaine)




Hymen annulaire



Hymen cloisonné



Hymen cribriforme




Hymen défloré (multipare)


Configuration interne

La muqueuse vaginale est

de **coloration rosée**

Avec: **3 reliefs muqueux**…






Trigone vaginal
(triangle de Pawlick)

Colonne des rides
(= saillie longitudinale médiane)

Rides vaginales
(= plis transversaux)

Vaisseaux et nerfs

Artères




Artère vaginale
(br. artère hypogastrique)

Branches vaginales
de l'artère utérine

Branches vaginales
de l'artère hémorroïdale moyenne


Veines



Se jettent dans:

veine iliaque interne

Lymphatiques




Se rendent aux **nœuds:**

iliaques internes

et **externes**

Nerfs




Proviennent du:

plexus hypogastrique


Vulve

Définition


- La vulve représente l'ensemble des **organes génitaux externes** de **la femme**



Mont de pubis

Saillie médiane


Situé: en avant de la vulve



Lévres

Grandes lèvres:


2 grands replies cutanés



Petites lèvres (nymphes):

2 replis cutanés

En dedans des grandes lèvres



Organes érectiles

Le clitoris:

Formé par **2 corps caverneux**


(analogues à ceux de la verge)

Les bulbes vestibulaires:

2 organes érectiles


Placés de part et d'autre du vagin

(analogues au corps spongieux de la verge)



Vestibule


- **Une dépression vulvaire**
- Limitée par: **petites lèvres**
- Où **s'ouvrent:**
  - **Orifice urétral**
  - **Orifice vaginal**



Glandes vestibulaires



BARTHOLIN Caspar le jeune
(Bartholin Gaspar, Secundus)
(1655-1738)



Glandes vestibulaires majeures:

(G. de **Bartholin**)

2 petites glandes


Situées: de chaque et d'autre de **l'orifice vaginale**

Vaisseaux et nerfs

Artères

Proviennent des:

artères pudendales interne et **externe**




Veines


Se jettent dans:

veines fémorale

et **pudendale interne**



Lymphatiques




Se rendent aux **nœuds:**

iliaques externes


et **inguinaux externes**

Nerfs



Proviennent des **nerfs pudendal interne** et **génito-fémoral**

En aucun cas ces diapos ne peuvent remplacer la présence en cours




Bon apprentissage

Une tanche



FALLOPE Gabriele (1523-1562)

- Anatomiste et chirurgien italien
- Professeur d'anatomie



RICHARD Felix Adolphe (1822-1872)

- Chirurgien français

KRAUSE Karl Friedrich Theodor (1797-1868)



- Anatomiste allemand
- Professeur d'anatomie

CLAUDIUS Friedrich Mathias (1822-1869)

- Anatomiste autrichien
- Professeur d'anatomie

PAWLICK Karl
(1849-1914)

- Obstétricien tchécoslovaque

BARTHOLIN Caspar le jeune
(Bartholin Gaspar, Secundus)
(1655-1738)



- Anatomiste danois
- Professeur d'anatomie