LES OS DU CRANE

Situés à la partie postérieure de la tête

Formant une enveloppe osseuse qui contient le cerveau et les méninges

On lui distingue une voûte (clavaria) et une base

La voûte du crâne


La voûte crânienne est constituée par un

ensemble d’os convexes plats réunis entre eux par des sutures:

Partie verticale de l’os frontal en avant,

Os pariétal et os temporal latéralement,

Os occipital en arrière



l'os frontal :


os impair


plat, galbé, partiellement pneumatisé

participant à la formation du **crâne et de la face.**

Présentant :

une portion verticale (qui appartient à la voûte) et une portion horizontale






L’os pariétal :


Os pair

Participant uniquement à la formation de la **voûte du crâne.**

Uni a celui du coté opposé sur la ligne médiane

De forme quadrilatère et aplati







L’os temporal :

Os pair du crâne localisé dans la région de la tempe, sur la partie latérale de la tête.

Il participe autant à la formation de la **voûte** que la **base du crâne.**







L’os occipital :

Os impair

Occupe la partie postéro-inférieure du **crâne**




Configuration extérieure de la voute crânienne :



Vue externe de la voute

Configuration interne de la voute :



Vue interne de la voute

Crâne du nouveau-né


A la naissance ,les pièces osseuses du crâne sont séparées les unes des autres par des fissures de tissu conjonctif :


les sutures

et

les fontanelles

Les sutures :


Suture sagittale
=
Inter-pariétale
Suture
métopique
=
Frontale
Suture coronale
=
Fronto-pariétale


Suture coronale
Suture pariéto-temporale
=
Pariéto-squameuse
Suture lambdoïde
=
Suture pariéto-occipitale

Les fontanelles:


Situées au point de jonction des sutures et représentent des espaces plus large comblés à la naissance par une membrane fibreuse

Il existe deux fontanelles médianes et quatre fontanelles latérales

Fontanelles médianes :

La fontanelle médiane antérieure=bregmatique:
(la grande fontanelle)

La plus importante, losangique
4,5 cm de long-**3 cm** de large
Sa fermeture se fait vers l'âge de
36 mois




La fontanelle médiane postérieure= Lambdoïde:
(la petite fontanelle)

Triangulaire
Sa fermeture se fait vers l'âge de
3 mois

Fontanelles latérales:

Les fontanelles latérales antérieures
= ptérique :
(fontanelles sphénoïdales)

Triangulaire
Sa fermeture se fait vers l'âge de
6 mois



Les fontanelles latérales postérieures
= astérique :
(fontanelles mastoïdiennes)

De forme irrégulière
Sa fermeture se fait vers l'âge de
18 mois

Base du crâne


L’endobase:

Présente 03 partie ou étages encore appelées fosse cérébrales:

Etage antérieure (A)

Etage moyen (B)

Etage postérieure (C)



Etage antérieur

Etage antérieure :

L'os frontal :


portion horizontale
participe au toit des orbites


L'ethmoïde :


participe au toit des fosses nasales
lame criblée seule apparente
traversée par les filets du **nerf olfactif (I)**

Le sphénoïde :

sur les étages antérieur et moyen
os biplan
- petites ailes dans l'étage antérieur
- grandes ailes et corps dans étage moyen







Les trous de l'étage antérieur :


Trous de la lame criblée de l'ethmoïde:

contient le **nerf olfactif (I)**

Le canal optique:

en dedans des apophyses clinoïdes antérieures

contient le **nerf optique (II)**



Etage moyen


Etage moyen:



Le sphénoïde :

les grandes ailes

le corps (creusé d'une loge appelée **selle turcique** qui contient l'hypophyse)



L'os temporal :

la face antéro -supérieure du **rocher**

face endocrânienne de **l'écaille du temporal**

Les trous de l'étage moyen

La fente sphénoïdale :


Entre grande aile et petite aile du sphénoïde
Contient: tous les **nerfs oculomoteur**

- **nerf oculomoteur commun (III)**
- **nerf pathétique (IV)**
- **nerf oculomoteur externe (VI)**

- **nerf trijumeau (V1)**

Le trou grand rond :

dans la grande aile
nerf trijumeau (V2)



Les trous de l'étage moyen

Le trou ovale :


dans la grande aile
nerf trijumeau (V3)

Le trou petit rond :

dans la grande aile
artère méningée moyenne

Le trou déchiré antérieur :

entre rocher et sphénoïde
artère carotide interne



Etage postérieur

Etage postérieur:


L'os temporal :


la face postérieure du **rocher**


Le sphénoïde:

(seulement le **dos de la selle turcique**)

L'os occipital







Les trous de l'étage postérieur:


Le trou occipital ou Foramen magnum:

lieu de transition entre le bulbe rachidien et la corde spinale

Le conduit auditif interne :

situé à la face postérieure du rocher ou pyramide pétreuse contient le **paquet stato – acoustico -facial** composé du :

- **nerf facial** (VII)
- **nerf intermédiaire de Wrisberg** (VII bis)
- **nerf auditif** (VIII)



Les trous de l'étage postérieur :

Le trou déchiré postérieur = foramen jugulaire


entre le rocher et l'os occipital (suture pétro-occipitale)
contient le **paquet des nerfs mixtes** :

- **nerf glossopharyngien (IX)**
- **nerf vague ou pneumogastrique (X)**
- **nerf spinal (XI)**

Ainsi que **la veine jugulaire**

Le canal condylien antérieur :

de part et d'autre du trou occipital : passage du
- nerf hypoglosse (XII)




L’exobase :

Elle englobe **trois parties** :

La partie faciale : en avant comprend
- les **maxillaires** , l
- les **malaires(os zygomatique)**
- os palatin

La partie sphénoïdale , au milieu

La partie temporo- occipitale, en arrière .



Les os de la face

Les os de la face

Ils sont au nombre de 14 :


La mâchoire supérieure est constituée de **13 os** :




06 os pairs :
- **Le maxillaire**
- **Le palatin**
- **L'unguis (os lacrymal)**
- **Le palatin**
- **Le cornet inférieur**
- **L'os nasal ou propre du nez**
- **Le malaire (zygomatique)**

01 os impairs :
- **Le vomer**


La mâchoire inférieure est constituée d'un seul os : **la mandibule**



Vue antérieure



Vue latérale




L’exobase

Orbites

Cavités paires qui contiennent l'organe de la vision
Située à la jonction des os du crâne et de la face
De forme pyramidale ,avec :

Une base antérieure :
l'entrée orbitaire

Un apex postéro-médial :
défini par le canal optique de 4 mm de diamètre




Quatre parois (toit ou voute orbitaire :

Paroi supérieure=toit de l'orbite:

mince

Constituée de la partie orbitaire du **frontal** et de la **petite aile du sphénoïde**



Paroi inférieure =plancher de l'orbite

Formée par la face orbitaire de **l'os zygomatique** et du **maxillaire**

Paroi médiale:

Très fragile ,formée par la face orbitaire du **maxillaire** de l'os **lacryma**l, de la lame orbitaire de **l'ethmoïde** et une partie du corps du **sphénoïde**

Paroi latérale :

Epaisse ,formée de la face orbitaire de **l'os zygomatique** et de **la grande aile du sphénoïde**

