Université de Bejaia

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

Faculté de Médecine
Département de Médecine


Niveau : 2ème année **Module: Histologie**

OVAIRES
(Ovaries)

Dr KACEL A.

Introduction


- Organes : Pairs ; petits ; applatis ; ovoïdes.
- Deux fonctions majeures :
  - → Production d'ovocytes;
  - → Organe endocrine.



Histologie

L’ovaire est habituellement recouvert d’un épithélium cuboïde ou cylindrique bas, mais avec l’âge et quand l’ovaire s’élargit → applati.

Cet épithélium est en continuité avec le péritoine au niveau du hile de l’ovaire.



La surface des cellules épithéliales contient

- des microvillosités à la base desquelles il y a souvent des vésicules de pinocytose.
- et occasionnellement des cils.

Les cellules épithéliales présentent

→ Peu de changement pendant le cycle.

→ S'allongent pendant la grossesse.

Une membrane basale substantielle (*Tunica albuginea*)


sépare l'épithélium du tissu ovarien sous-jacent.

L’ovaire peut-être divisé en trois parties :

1. Le hile

- Entrée et sortie des vaisseaux sanguins et lymphatiques et des nerfs.
- Continu avec la médulla.
- Contient les restes du canal de Wolff = canaux irréguliers limités par un épithélium aplati ou cuboïde (*rete ovarii*).
- Contient des cellules histologiquement identiques aux cellules de Leydig.

CELLULES DU HILE



2. La médulla : contient parfois des amas de cellules conjonctives identiques à celles du cortex.

3. Le cortex contient deux parties : le stroma de soutien et les structures germinatives. Les proportions et l’apparence de ces deux parties dépendent de l’âge et de stimulation hormonale.

3.1. le stroma cortical contient des cellules fibroblastes-like et des fibres de réticuline et de collagène sont dispersées entre les cellules, mais surtout dans la périphérie du cortex. Le collagène domine progressivement pendant la période de reproduction, puis totalement après la ménopause. La proportion des cellules et l’augmentation de leur contenu en lipides augmentent surtout pendant la grossesse.

Les rôles de ces cellules sont :


- Support de l'ovocyte en développement;
- Donner naissance aux thèques interne et externe;
- Synthèse des stéroïdes.


→ 3 types de Cs produisant des stéroïdes sont distingués:


a. Cs thécales entourant les follicules.


b. Cs stromales (riches en lipides) dispesrsées.


c. Une population de Cs appelées Enzymically Active Stromal Cells (EASC) → nbreuses après la ménopause → testostérone et androgènes.















Corpus luteum.

The main changes occur in the granulosa and theca interna cells. In these cells, LH induces changes (luteinization) that convert the follicle remnants into an endocrine structure known as the corpus luteum.


Thus, the granulosa cells enlarge, acquire a substantial network of smooth endoplasmic reticulum, become distended with lipid (granulosa lutein cells) and secrete progesterone.

At its maximum size (usually on about day 20 of the menstrual cycle), a corpus luteum is commonly an ovoid structure up to 2 cm long and 1.5 cm wide; it then begins to involute, unless the cycle has been interrupted by fertilization of the oocyte in the uterine tube.



Corpus albicans

The end-result of corpus luteum involution is a small ovoid mass of relatively acellular (hyaline) collagenous tissue with the general physical configuration of the corpus luteum. This structure is a corpus albicans and remains in the ovary, decreasing in size with the passing years but never disappearing.


CA