

التقرير الطبي - MediScan AI

تاريخ التقرير: 2026/05/10 - 03:17

بيانات المريض

الاسم:

مريض

الأمراض المزمنة

وبرلا، تاناويحلا ربو، تيساسد، حاقلا بوبد تيساسد، رابغلا تيساسد

الأدوية الحالية

تساكوليتنوم، (خاخذ) دينوزيدوب، (لوماتوبلاس خاخذ) نيلوتنيفة، (لوماتوبلاس خاخذ) نيلوتنيفة

الحساسية المعروفة

تفورعم تيساسد دجوة لا

تقرير صحي بالمصري البسيط

* (موجه ليك انت اللي هتقراه، مش للدكتور)

1. ملخص حالتك الصحية

- عندك حساسية للغبار، وحبوب اللقاح، وبر الحيوانات، وكمان ربو.
- يعني لما تتعرض للغبار أو ريحة العشب أو شعر الحيوانات، ممكن يجي لك سعال، ضيق في النفس، أو حكة في الأنف والعينين.
- الربو بيخلي الشعب الهوائية ضيقة، فلو حصل لك نوبة ربو (صعوبة في التنفس) لازم تتصرف بسرعة.

2. الأكل الممنوع والمسموح (مهم جداً!)

أكل لازم تبعد عنه خالص

* (كل مجموعة أدوية وحساسية ليها أكل بيزود الالتهاب أو يخلي الأعراض أسوأ)

المرض / الحساسية	5-7 أكالات تبعد عنها	ليه؟
------------------	----------------------	------

حساسية الغبار	1. الفستق واللوز المملح 2. الأطعمة المقلية بالزيت القديم 3. المعلبات اللي فيها مواد حافظة 4. الخبز الأبيض (بيحتوي على غلوتين ممكن يزود الحساسية) 5. الشوكولاتة اللي فيها مكسرات	الدهون والملح بيزودوا الالتهاب وتراكم الغبار في الجو
حساسية حبوب اللقاح	1. الفواكه الحمضية (برتقال، ليمون) 2. العسل غير المعالج (ممكن فيه حبوب لقاح) 3. الخضار النيئة اللي فيها بكتيريا (الرجير، السبانخ) 4. المشروبات الغازية (محتوى سكر عالي يزود الالتهاب) 5. الأطعمة المخمرة (مخلل، كيمتشي)	الحموضة والمواد المسببة للالتهاب بتقوي رد الفعل
حساسية وبر الحيوانات	1. اللحوم المدخنة (ممكن فيها بروتينات بتزود الحساسية) 2. الجبن القريش (محتوى بروتين عالي) 3. الكريمة والحليب كامل الدسم 4. الأطعمة اللي فيها صويا (ممكن تكون مسبب حساسية) 5. الفواكه المجففة (ممكن تكون مغطاة بمواد حافظة)	البروتينات الدهنية بتقوي رد الفعل التحسسي
الربو	1. الأطعمة الدهنية جدا (بطاطس مقلية، شاورما، بيتزا) 2. المشروبات الغازية والعصائر المحلاة 3. الشوكولاتة (الكاكاو ممكن يسبب تشنج في الشعب) 4. الأطعمة الحارة (فلفل حار، صلصات حارة) 5. منتجات الألبان الكاملة (حليب كامل، جبن صلب)	الدهون والسكر بيزودوا الالتهاب وتضيق الشعب الهوائية

< نصيحة: لو مش متأكد أكل معين يضر ولا لأ، جرب تستبعده أسبوعين وشوف إذا الأعراض بتتحسن ولا لأ.

أكل مفيد ومسموح

- خضار ورقية: سبانخ، جرجير، خس، كرفس.
- فواكه قليلة حموضة: تفاح، كمثرى، موز.
- بروتين خفيف: سمك مشوي أو مسلوق، صدور فراخ مشوية، بيض مسلوق.
- حبوب كاملة: شوفان، أرز بني، مكرونة قمح كامل.
- مكسرات غير مملحة: لوز غير مملح (كمية صغيرة).
- زيوت صحية: زيت زيتون أو زيت كانولا.
- مياه: اشرب مياه كثير، حاول تبعد عن المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

3. دواك اليومى

تحذيرات مهمة	إمتى تاخده	إزاي تاخده	الدوا
ما تستنشقش على معدة فاضية، خليك واقف أو قاعد. لو احتجت أكثر من 4 رشة في اليوم، كلم الدكتور.	لما تحس بضيق أو سعال مفاجئ – يعني “بخاخ الطوارئ”. ممكن تستخدمه كمان قبل الرياضة لو الجو فيه غبار.	بخاخ للريات (استنشق 1-2 رشة)	فينتولين (بخاخ سالبوتامول)
خليك ثابت على الجرعة، ما توقفش فجأة. استنشق ببطء وخلي رنتك تستقبل الدوا كويس.	صباحا (قبل الفطار) أو حسب تعليمات الدكتور – عادة مرة أو مرتين في اليوم.	بخاخ للريات (1-2 رشة)	بوديزونيد (بخاخ)
خده مع شوية أكل خفيف لو معدتك حساسة. ما تاخدش جرعة زيادة، ولو نسيت جرعة، ما تعوضش بجرعة تانية، خليك على الجرعة الجاية في ميعادها.	قبل النوم – يفضل تاخده كل يوم في نفس الوقت.	حبة واحدة	مونتيلاكاست (حبة)

< نصيحة: خليك دايما معاك البخاخين (الفينتولين والبوديزونيد) في الشنطة أو العربية، عشان لو حصل لك نوبة فجأة تكون جاهز.

4. علامات خطر (روح للدكتور فوراً لو حصلت)

- صعوبة شديدة في التنفس أو صوت صفير عالي (صفير “صفير الصراخ”).
- ضيق شديد في الصدر، تحس إنك مش قادر تاخد نفس عميق.
- لون الشفاه أو الأصابع بقى أزرق أو شاحب.
- سعال مستمر مع بلغم أخضر أو أصفر.
- دوخة قوية أو إغماء.
- ارتفاع مفاجئ في حرارة الجسم (أكثر من 38°C) مع أعراض ربو.

لو حسيت بأي واحدة من العلامات دي، استعمل الفينتولين فوراً واتصل بالإسعاف أو روح أقرب مستشفى.

5. نصايح لحياة صحية

1. نظافة البيت

- نظف الأرضيات بانتظام (امسح بالمسحة المبلولة) لتقليل الغبار.
- استعمل مكنسة كهربائية بفلتر HEPA لو تقدر.
- غير أغطية المخدات والبطانيات كل 2-3 أسابيع.

2. الهواء

- افتح الشباك في الصباح قبل ما يبجي الغبار أو حبوب اللقاح.
- استخدم جهاز تنقية هواء (Air purifier) في غرفة النوم.

3. الرياضة

- امشي أو اعمل تمارين خفيفة (يوغا، تمارين تنفس) 3-4 مرات في الأسبوع.
- تجنب الرياضة في الأيام اللي فيها نسبة حبوب اللقاح عالية (ممكن تتابع موقع الطقس أو تطبيقات الحساسية).

4. النوم

- حاول تنام 7-8 ساعات كل ليلة.
- خلي الغرفة باردة ومظلمة، واستخدم وسادة نظيفة.

5. تجنب التدخين

- حتى الدخان الثانوي (من غير ما تكون بتدخن) يزود أعراض الربو.

6. الملابس

- لو عندك حساسية للبر الحيوانات، حاول ما تخلّش الحيوانات تدخل السرير أو الأريكة.

7. الضغط النفسي

- حاول تسترخي، مارس تمارين تنفس عميق أو تأمل 5-10 دقائق كل يوم. الضغط النفسي ممكن يخلي الأعراض تزيد.

6. متابعتك الدورية

- زيارة الدكتور: كل 3-6 شهور (حسب ما الدكتور يحدد).
- تحاليل:
- اختبار وظائف الرئة (Spirometry) كل 6 شهور.
- فحص دم للـ IgE (مستوى الحساسية) لو الدكتور طلب.
- تحليل دم كامل كل سنة لتأكد من عدم وجود مشاكل ثانية.

النصائح دي عشان تقلل الأعراض وتعيش حياة أريح. لو عندك أي سؤال أو مش واضح حاجة، ابعت رسالة أو كلم الدكتور بتاعك. خلي بالك من نفسك، واتبع

بالتوفيق!

□□ تنبيه هام: هذا التقرير تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وهو للاستئناس فقط. يرجى مراجعة طبيب متخصص للتشخيص والعلاج النهائي.

□ MediScan Medical Center | □ 16888 | □ www.mediscan-eg.com