

MediScan AI - التقرير الطبي

تاريخ التقرير: 2026/05/10 - 03:43

بيانات المريض

الاسم:

مريض

الأمراض المزمنة

حساسية الغبار, حساسية حبوب اللقاح, حساسية وبر الحيوانات, الربو

الأدوية الحالية

فينتولين (بخاخ سالبوتامول), بوديزونيد (بخاخ), مونتيلوكاست (بخاخ), مونتيلوكاست, فينتولين (بخاخ سالبوتامول)

الحساسية المعروفة

لا توجد حساسية معروفة

1. ملخص حالتك الصحية

يمكن يجي لك سعال، ضيق في النفس، أو صفير في الصدر. علشان كده لازم تتابع الدوا وتبعد عن المثيرات اللي بتزود الأعراض. لحبوب اللقاح، وحساسية لوبر الحيوانات، وكمات عندك ربو (الربو). يعني لما تتعرض للغبار أو حبوب اللقاح أو شعر الحيوانات، إنت عندك حساسية للغبار، وحساسية

2. الأكل الممنوع والمسموح (مهم جداً!)

أكل لازم تبعد عنه خالص

المريض / الحساسية	أكلات تبعد عنها (5-7)	ليه تبعد عنها
حساسية الغبار	1. الأكل المعلب (الطماطم المعلبة، الفاصوليا المعلبة) 2. الخبز الأبيض المكرر 3. الفشار المملح 4. المكسرات غير محمصة (ممكن يكون فيها غبار) 5. الأكلات السريعة (البرجر، البطاطس المقلية)	الأكل اللي فيه مواد حافظة أو غبار ممكن يزود الحساسية

حساسية حبوب اللقاح	1. الفواكه المجففة (التمر، الزبيب) 2. العسل غير المعالج (ممكن فيه حبوب لقاح) 3. الخضار النيئة اللي فيها غبار (الرجير، السبانخ) 4. العصائر المعلبة 5. المشروبات الغازية	بعض المكونات فيها مواد بتزيد إفراز الهيستامين
حساسية وبر الحيوانات	1. اللحوم المدخنة (السك المدخن، السجق) 2. الجبن المعتق (البارميزان، الفيتا) 3. الأطعمة المقلية بالزيت القديم 4. المايونيز والصلصات الجاهزة 5. الشوكولاتة الداكنة (ممكن فيها مكونات تحفز الحساسية)	أكلات فيها بروتينات أو مواد ممكن تثير رد فعل تحسسي
الربو	1. الأطعمة المقلية والدهون المشبعة (بطاطس مقلية، دجاج مقلي) 2. المشروبات الغازية والعصائر المحلاة 3. الأطعمة اللي فيها كميات كبيرة من الملح (المخللات، الشيبس) 4. منتجات الألبان الكاملة (حليب كامل الدسم، جبن قريش) إذا حسيت بزيادة البلغم 5. الأطعمة الحارة (فلفل حار، صلصات حارة) 6. الكافيين الزايد (قهوة سريعة، مشروبات الطاقة)	الدهون والملح والسكر بيزودوا الالتهاب وتكثيف المخاط، وده بيخلي التنفس أصعب

< نصيحة: لو لقيت أي أكل بيزود أعراضك (سعال، صفير، حكة)، ابعده عنه فوراً حتى لو مش موجود في القائمة دي.

أكل مفيد ومسموح

فئة الأكل	أمثلة	ليه مفيد
خضار وفواكه طازة	سبانخ، جزر، تفاح، برتقال، بطيخ	مليانة فيتامينات ومضادات أكسدة بتقوي الجهاز المناعي
بروتين خفيف	سمك (سلمون، سردين) صدر فراخ مش مقلية بقوليات (عدس، حمص)	البروتين بيساعد على تجديد خلايا الرئة
حبوب كاملة	شوفان، أرز بني، خبز كامل	ألياف بتقلل الالتهاب وتساعد على الهضم

أوميغا 3 وده بيساعد على تهدئة الالتهاب	لوز، جوز، كاجو (قليل)	مكسرات غير مملحة
الترطيب مهم لتخفيف المخاط وتسهيل التنفس	مياه عادية، ماء جوز الهند غير محلى	مياه
فيتامين D يدعم صحة الرئتين	بيض، سمك السردين، فطر شمس	أطعمة غنية بـ فيتامين D

3. دواك اليومي

تحذيرات / ملاحظات	إمتى تاخده	إزاي تاخده	الدوا
خذه على بعد 5-10 دقائق من أي دواء ثاني. ممكن يسبب رعشة أو خفقان، لو حسيت بأعراض غريبة قلل الاستخدام.	استخدمه فور ظهور الأعراض، ا وممكن تستخدمه قبل الرياضة لو بتتوقع ضيق. ما تتعاش لو 4 رشعة في اليوم من غير استشارة دكتور.	بخاخ رذاذ للصدر، 1-2 رشعة عند الحاجة (لما تحس بضيق أو صفير)	فينتولين (بخاخ سالبوتامول)
بعد الاستخدام، اغسل فمك بالمية (مضمضة) عشان تمنع التهاب الحلق. ما تستخدمه مع الفينتولين في نفس اللحظة؛ خذه قبل أو بعد 15 دقيقة.	خذه بعد الفطور الصبح وبعد العشاء بالليل.	بخاخ للصدر، 1-2 رشعة كل مرة، مرتين في اليوم (الصبح وبالليل)	بوديزونيد (بخاخ)
لو حسيت بصداع أو اضطراب في المعدة، استشير الدكتور. ما تنساش تاخده كل يوم حتى لو ما حسيتش بأعراض.	خذه بالليل قبل النوم (ممكن مع أو من غير أكل)	حبة 10 مغ، مرة واحدة في اليوم	مونتيلاكاست (حبة)

< نصيحة: خليك دايما معاك البخاخين (الفينتولين والبوديزونيد) في الشنطة أو العربية، عشان لو حصل طارئ تقدر تستخدمهم فوراً.

4. علامات خطر (روح للدكتور فوراً لو حصلت)

ليه لازم تروح فوراً	إيه اللي يحصل؟	العلامة
ممكن تحتاج أدوية أقوى أو أكسجين	ربو نوبة حادة	صعوبة شديدة في التنفس (ما تقدرش تكمل الكلام)
خطر على الحياة لو ما اتعالجش	تضيق شديد في الشعب الهوائية	صفير عالي ومستمر في الصدر

خطر على الحياة، محتاج إبر أدريالين	رد فعل تحسسي (أنافيلاكس)	تورم أو احمرار شديد في الوجه أو الشفاه
محتاج مضاد حيوي أو فحص	احتمال التهاب رئوي	حمى فوق 38.5 °م مع سعال مستمر
لازم فحص سريع	نقص أكسجين أو ضغط دم منخفض	دوخة شديدة أو إغماء

5. نصائح لحياة صحية

النصيحة	المجال
امشي أو إجر خفيف 20-30 دقيقة يوميا (مثلا تمشي في الحديقة). لو بتحس بضيق، خفف الشدة واستخدم الفينتولين قبل ما تبدأ. تجنب الرياضة في أيام الغبار العالي أو بعد موسم حبوب اللقاح.	رياضة
حاول تنام 7-8 ساعات في الليل. خلي أوضتك نظيفة من الغبار، واستخدم مروحة أو هواء نقي. غطس المخدة بغطاء مضاد للحساسية (مقوى).	نوم
نظف البيت بانتظام (امسح الأرضيات بممسحة مبلولة). استعمل مكنسة كهربائية بفلتر لو عندك حيوانات أليفة، خليك بعيد عن شعرهم قدر الإمكان، واستخدم غسول HEPA للملابس بعد ما تلمسهم.	البيئة
ابعد عن الأماكن المغلقة اللي فيها غبار كثير (مستودعات، ورش). في موسم حبوب اللقاح (الربيع)، ابقى في البيت الصبح بدري أو بعد المغرب، واستخدم كامامة (N95) لو لازم تخرج.	تجنب المثبرات
اشرب على الأقل 8 أكواب مياه في اليوم. الترطيب بيساعد على تخفيف المخاط وتسهيل التنفس.	شرب مياه
جرب تمارين تنفس عميق (4 ثواني شهيق، 4 ثواني زفير) 3-4 مرات في اليوم. القلق بيزود أعراض الربو.	تدبير الضغط النفسي

6. متابعتك الدورية

إيه الفحوصات المطلوبة	متى تزور الدكتور؟
زيارة سريعة أو طوارئ	لو حصلت نوبة ربو شديدة أو تغير في الأعراض
فحص دم شامل (CBC) لتأكد من عدم وجود التهاب مزمن أو نقص فيتامينات	كل سنة

< ملاحظة: لو غيرت أي دواء أو جرعة، كلم الدكتور أو الصيدلي قبل ما تبدأ.

خلاصة سريعة

- ابعد عن الأكل المعب، المقلية، المشروبات الغازية، الأطعمة الحارة، والمنتجات اللي فيها ملح أو سكر كثير.
- كل خضار وفواكه طازة، سمك، بروتين خفيف، حبوب كاملة، ومكسرات غير مملحة.
- خد الفينتولين عند الحاجة، البوديرونيد مرتين في اليوم، والمونتيلوكاست كل ليلة.
- لو حسيت بصعوبة شديدة في التنفس أو أي علامة خطر، روح للطبيب فوراً.
- مارس رياضة خفيفة، نم كويس، ونظف بيتك من الغبار.
- خليك دايماً متابع مع دكتورك، وخلي بالك من نفسك. سلامتك أهم!

□ □ تنبيه هام: هذا التقرير تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وهو للاستئناس فقط. يرجى مراجعة طبيب متخصص للتشخيص والعلاج النهائي.

□ MediScan Medical Center | □ 16888 | □ www.mediscan-eg.com