

أمراض الموالح والبرتقال في مصر: الأعراض، المسببات، العلاج، والمبيدات المعتمدة

=====

التجريبي – محافظة البحيرة، مصر NILEX.AI المرجع مُعد خصيصًا لمشروع

1. مرض التصمغ (Phytophthora Gummosis)

(يُعرف أيضًا بفطر التربة) *Phytophthora spp.* المسبب: فطر

الأعراض:

.على الساق والفروع الرئيسية (Gummosis) إفرازات صمغية -

.تشققات في القشرة مع خروج إفرازات بنية اللون -

.اصفرار الأوراق وتساقطها -

.تقرحات في منطقة التاج والجذور، مما يؤدي إلى ضعف الشجرة وموتها تدريجيًا -

.تظهر بشكل أكبر في الأراضي الثقيلة سيئة الصرف -

العلاج:

.تحسين الصرف وتجنب الري المفرط -

.كشف منطقة التاج وإزالة الأنسجة المصابة وتطهيرها بمحلول بوردو -

.دهن الجروح بعجينة بوردو أو مبيدات نحاسية -

:المبيدات المعتمدة (المكافحة الكيميائية) -

.ريدوميل جولد بلس (ميثالاكسيل-م + كلوروثالونيل) - يُستخدم كعلاج تربة أو رش على الساق *

.ألييت (فوستيل الألمنيوم) - رش على الأوراق والساق *

.أكروبات النحاس (كوبر أوكسي كلورايد + سيموكسانيل) - رش على الساق والجذع *

2. مرض التقرح البكتيري (Citrus Canker)

Xanthomonas citri. المسبب: بكتيريا

الأعراض:

يقع صفراء صغيرة على الأوراق ترتفع إلى بثور فلينيه بنية اللون، محاطة بهالة صفراء -

تقرحات على الثمار والأغصان الصغيرة -

تساقط الأوراق والثمار قبل النضج -

تنتقل البكتيريا بواسطة الرياح والأمطار وأدوات التقليم الملوثة -

العلاج:

إزالة الأفرع المصابة وحرقها -

تعقيم أدوات التقليم بالكحول أو الكلور -

استخدام الأصناف المقاومة -

المبيدات المعتمدة (رش وقائي) -

كوسيد 2000 (كوبر هيدروكسيد) - رش كل 10-14 يوم أثناء النمو الخضري *

تشامبيون (كوبر أوكسي كلورايد) - فعال ضد البكتيريا ويساعد في العلاج *

بعض برامج مكافحة المتكاملة تستخدم المركبات النحاسية مع المانكوزيب *

3. مرض الاخضرار (Citrus Greening / HLB)

(Diaphorina citri) تنتقل بواسطة حشرة السيليا Candidatus Liberibacter spp. المسبب: بكتيريا

الأعراض:

اصفرار غير طبيعي في الأوراق (تبقع غير منتظم، اصفرار عروق الورقة) -

تشوه الثمار وصغر حجمها مع بقاء جزء منها أخضر -

تساقط الثمار قبل النضج -

موت الأطراف تدريجيًا -

ينتشر بكثافة في مناطق زراعة الموالح بمصر -

:العلاج

مكافحة الحشرة الناقلة (السيلا) بالمبيدات الحشرية الموصى بها -

إزالة الأشجار المصابة بشدة وحرقها -

استخدام شتلات معتمدة خالية من المرض -

:المبيدات المعتمدة لمكافحة السيلا -

أكتارا (ثياميثوكسام) - رش على المجموع الخضري *

إيميداكلوبريد (موسبيلان) - رش أو حقن التربة *

زيت صيفي خفيف مع المبيدات لتحسين التغطية *

4. أنثراكنوز الموالح (Citrus Anthracnose)

Colletotrichum gloeosporioides المسبب: فطر

:الأعراض

بقع داكنة غائرة على الثمار (تظهر بعد التخزين غالبًا) -

موت الأطراف وتساقط الأوراق الحديثة -

تبقع بني على الأوراق -

:العلاج

تقليم الأغصان المصابة وجمع الثمار المتساقطة -

رش الأشجار بعد الحصاد للوقاية -

:المبيدات المعتمدة -

كاربندازيم (بافستين) - رش بعد القطف أو مع ظهور الأعراض *

بروبيكونازول (تلت) - يعالج موت الأطراف *

أزوكسيستروبين (أمستار) - فعال ضد الأنثراكنوز وموت الأطراف *

5. مرض عفن الجذور (Dry Root Rot)

أحياناً *Phytophthora* ، وأيضاً *Fusarium solani* المسبب: فطر

الأعراض:

اصفرار وذبول الأوراق دون سبب واضح -

تقشر اللحاء عند منطقة التاج وتحتة -

جذور جافة وميتة بنية اللون -

توقف الشجرة عن النمو تدريجياً -

العلاج:

تحسين الصرف وعدم الإفراط في الري -

إزالة الأشجار الميتة ومعالجة التربة -

المبيدات المعتمدة -

توبسين-إم (ثيوفانات ميثيل) - معاملة التربة حول الجذور *

ريدوميل جولد (ميثالاكسيل-م) - كعلاج تربة *

فيتافاكس ثيرام (كابتان + ثيرام) - لتعقيم التربة قبل الزراعة *

6. أمراض نقص العناصر (خاصة نقص الزنك والحديد)

الأعراض:

نقص الزنك: أوراق صغيرة متقزمة مع اصفرار بين العروق (موزاييك) -

نقص الحديد: اصفرار الأوراق الحديثة مع بقاء العروق خضراء -

نقص المغنيسيوم: اصفرار الأوراق المسنة مع بقاء قاعدة الورقة خضراء -

العلاج:

استخدام الأسمدة الورقية المتخصصة -

بتركيز 0.5 جم/لتر (EDTA-Zn) زنك مخلبي *

بتركيز 1-0.5 جم/لتر (EDDHA-Fe) حديد مخلبي *

سلفات الماغنسيوم رشًا ورقيًا (2 جم/لتر) أو إضافة للتربة *

7. ذبابة فاكهة الموالح (Medfly – Ceratitis capitata)

(حشرة تسبب خسائر كبيرة)

الأعراض:

ثمار طرية بها ثقوب صغيرة مع خروج إفرازات صمغية -

تعفن الثمار وسقوطها قبل النضج -

المكافحة المتكاملة:

المصائد الفرمونية والغذائية (مثل مصيدة جاكسون) -

رش طعم سام (بروتين هيدروليزات + مبيد حشري) -

جمع الثمار المصابة ودفنها عميقًا -

المبيدات الحشرية المعتمدة -

دايمثويت (دايميثوات) - رش عند بداية تلون الثمار *

لامبادا سيهالوثرين (لامدا) - بتركيز مناسب حسب إرشادات لجنة المبيدات *

أكتيليك (بيريميغوس ميثيل) - رش مع بداية الإصابة *

:ملاحظات هامة

يجب الالتزام بفترة الأمان) جميع المبيدات المذكورة مرخصة من لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة المصرية -
(قبل الحصاد (PHI).

يُوصى دائماً بدمج مكافحة الكيمائية مع الممارسات الزراعية الجيدة (تقليم، صرف، تسميد متوازن) -

للمنطقة المحيطة بمحافطة البحيرة، يجب مراعاة فترات الري والميل لمقاومة أمراض التربة مثل التصمغ، لذلك يُنصح -
بزراعة أصول مقاومة (مثل فولكا ماريانا) ومراقبة رطوبة التربة

.المصدر: إرشادات مركز البحوث الزراعية – معهد بحوث البساتين، مصر -