



Toplam İlaç İçindeki Antibiyotik Oranının Önceki Döneme Göre Değişimi



Gösterge Kodu

SYPG-ADSH-6

Revizyon Tarihi: 21.05.2026

Amacı

Akılcı antibiyotik kullanımı bilincinin yerleşmesi, gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi.

Veri Kaynağı

e-NABIZ

A Parametresi

A: Hastanenin Bir Önceki Döneme Ait Antibiyotik Bulunan Reçete Yüzdesi

A Parametresi Hesaplama

Önceki aylık dönemde yalnızca **Ayaktan hastalar (Yatış kabul zamanı boş veya günübirlik yatışı olmayan)** için **(J01 ATC kodu içeren reçete sayısı / (toplam reçete sayısı) * 100** olarak hesaplanmıştır.

B Parametresi

B: Hastanenin İlgili Döneme Ait Antibiyotik Bulunan Reçete Yüzdesi

B Parametresi Hesaplama

İlgili aylık dönemde yalnızca **Ayaktan hastalar (Yatış kabul zamanı boş veya günübirlik yatışı olmayan)** için **(J01 ATC kodu içeren reçete sayısı / (toplam reçete sayısı) * 100** olarak hesap

Hesaplama Formülü

$$GD = ((A - B) / A) * 100$$

$GD \geq 5$ veya $B \leq 35$ ise $GP = 8$

$B > 35$ ve $5 > GD \geq 3$ ise $GP = 6$

$B > 35$ ve $3 > GD \geq 1$ ise $GP = 4$

$B > 35$ ve $1 > GD > 0$ ise $GP = 2$

$B > 35$ ve $GD \leq 0$ ise $GP = 0$

Ağırlıklandırma

8

Veri Analiz Periyodu

Aylık