

Biomedizinische Informatik und Data Science (M.Sc.)

Master of Science – Zertifikatskurse/-programme

Projektarbeit

Technische Abbildung des Lebenszyklus von ICD-10-GM Klassifikationen

Abel Hodelín Hernández 📵

betreut von Marcus Will

Inhaltsverzeichnis

		ıldungsverzeichnis	11
	Tab	ellenverzeichnis	ii
1	Intr	oduktion	4
	1.1	Verzeichnisse des ICD-10-GM	4
		1.1.1 Alphabetische und systematische Verzeichnisse	5
		1.1.2 Alphabetisches Verzeichnis (Alphabet)	5
		1.1.3 Systematisches Verzeichnis (Systematik)	5
	1.2	Metadaten	5
_			
2		erialien und Methode	7
	2.1	Aufbau der Datenbank	7
	2.2	Funktion der Tabellen	7
	2.3	Tabelle kodes von BfArM	7
		2.3.1 Neuen Tabellen	8
	2.4	Fluss der Information	9
	2.5	ETL-Strecke	9
		2.5.1 Extraktion	10
		2.5.2 Transformation	10
		2.5.3 Laden	11
3	Ergo	ebnisse	12
	3.1	ICD-10-GM in der CSV-Dateien und DB	12
	3.2	Neue ICD-10-GM	13
	3.3	Modifizierte ICD-10-GM	16
	3.4	Gelöschte ICD-10-GM	18
	3.5	Wiederverwendete ICD-10-GM	20
	3.6	Strukturelle Änderungen	21
	3.7	Zeitliche Entwicklung der ICD-10-GM	$\frac{21}{21}$
	9.1	Zeronene Emowickiung der ied-10-divi	<i>4</i> 1
4	Sch	lussfolgerung	23

Abbildungsverzeichnis

2.1	Datenbankstruktur	8
2.2	Datenfluss des Prozesses	0
2.3	ETL-Strecke	1
3.1	ICD-10-GM in der DB	3
	Neue ICD-10-GM pro Jahr	
3.3	Kapitel mit den meisten eingeführten ICD-10-GM (2008 - 2021) 1	5
3.4	Meldepflichtige ICD-10-GM pro Jahr	5
3.5	Gelöschte ICD-10-GM pro Jahr	9
3.6	Meist betroffene Kapitel in 2013	9
3.7	Hierarchie der gelöschte ICD-10-GM	0

Tabellenverzeichnis

1.1	Verschiedene Bezeichnungen von COVID-19
1.2	Inhalt im Ordner Klassifikationsdateien
3.1	ICD-10-GM in den CSV-Dateien
3.2	Meldepflichtige ICD-10-GM
3.3	Änderungen in den Metadaten
3.4	Diphtherie und Poliomyelitis
3.5	Wieder benutzte ICD-10-GM
3.6	Beispiel der Historisierung einer ICD-10-GM Klassifikation

Abkürzungsverzeichnis

Alpha-II	O Alpha-Identifikator	5
BASH	Bourne-again shell	. 9
BfArM	Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte	. 4
BMG	Bundesministeriums für Gesundheit	. 4
\mathbf{CDW}	Clinical Data Warehouse	. 4
COVID	Corona Virus Disease	
\mathbf{CSV}	Comma-Separated Values	. 5
DB	Datenbank	4
DIZ	Datenintegrationszentrum	4
\mathbf{EBM}	Einheitlicher Bewertungsmaßtab	17
\mathbf{ETL}	Extract, Transform, Load	. 4
G-DRG	German Diagnosis Related Groups	13
ICD-10-0	GM International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10. Revision, German Modification	
KRINKO	O Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention	13
MIRAC	UM Medical Informatics in Research and Care in University Medicine	4
MII	Medizin Informatik Initiative	4
RDBMS	Relational Database Management System	6
RKI	Robert-Koch-Institut	18
\mathbf{SGB}	Sozialgesetzbuch	. 4
SQL	Structured Query Language	. 4
WHO	Weltgesundheitsorganisation	16
ZIP	Zipper	. 5

1 Introduktion

Die International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10. Revision, German Modification (ICD-10-GM) auf Deutsch Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme [1] gilt als Standard bei der Auszeichnung von Gesundheitsdaten. Häufig bleibt die temporäre Natur dieses Schemas in Applikationen und Auswertungen unberücksichtigt.

Im Rahmen der Konzeption des Clinical Data Warehouse (CDW) für ein Datenintegrationszentrum (DIZ) des Konsortiums Medical Informatics in Research and Care in University Medicine (MIRACUM) der Medizin Informatik Initiative (MII) muss diese Situation abgebildet werden.

Das Ziel dieses Projekts ist die Darstellung der Besonderheiten eines Lebenszyklus der historischen ICD-10-GM Auffassungen von 2007 bis 2021. Um dieses Ziel zu erreichen wurde ein Datenbank (DB)-Schema für die Speicherung der Information des semantischen Verzeichnisses der ICD-10-GM entwickelt, eine Extract, Transform, Load (ETL)-Strecke konzipiert, um die Daten in die DB zu importieren; und Structured Query Language (SQL)- und Python-Skripts, um die Daten zu analysieren.

1.1 Verzeichnisse des ICD-10-GM

Die amtliche Klassifikation zur Verschlüsselung von Diagnosen in der ambulanten (§295 Sozialgesetzbuch (SGB) V) und stationären (§301 SGB V) Versorgung in Deutschland ist die ICD-10-GM. Die Versionen und Formaten davon gelten vom Anfang bis zum Ende eines Jahres und werden im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) von dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) jährlich aktualisiert und herausgegeben [1]. Diese Klassifikation ist alphanumerisch, monohierarchisch strukturiert mit bis zu 5 Ebenen und deren Aufbau besteht aus zwei Teilen, das systematische und alphabetische Verzeichnis [1].

1.1.1 Alphabetische und systematische Verzeichnisse

1.1.2 Alphabetisches Verzeichnis (Alphabet)

Die alphabetische Zuordnung des Kodes entsteht aus der gebräuchlich Diagnosentexte. Die Systematik enthält nicht alle Diagnosen des Alphabets und eine Bezeichnung dient dazu als Verzugsbezeichnung, sodass das Alphabet auch andere veraltete oder ungenaue Diagnosenbezeichnungen enthält [3]. Ein Beispiel dieser Ungenauigkeit ist Corona Virus Disease COVID-19 (sehen Sie die Tabelle 1.1). Aus diesem Grund existiert der Alpha-Identifikator (Alpha-ID). Der nutzt die Bezeichnungen als Basis für eine nicht klassifizierenden Kode [3].

Tabelle 1.1: Verschiedene Bezeichnungen von COVID-19 mit deren Alpha-ID und ICD-10-GM Identifikatoren

Alpha-ID	ICD-10-GM	Bezeichnung	
I130805	U07.1!	Coronavirus-Infektion-2019, durch Labortest nachgewiesen	
I130804	U07.1!	Coronavirus-Infektion-2019, Virus nachgewiesen	
I130797	U07.1!	Coronavirus-Krankheit-2019, Virus nachgewiesen	
I130809	U07.1!	COVID-19-Infektion, durch Labortest nachgewiesen	
I130796	U07.1!	COVID-19-Infektion, Virus nachgewiesen	

1.1.3 Systematisches Verzeichnis (Systematik)

Die Systematik ist eine hierarchisch geordnete Liste der vierstelligen Systematik des Kodes [4]. Diese Hierarchieebenen der ICD-10-GM sind Kapitel, Gruppe/Bereiche und Kode, nämlich Kategorie/Dreisteller, Subkategorien/Vier- und Fünfsteller [5]. Für die Durchführung und den Zweck dieses Projekts wird mit dem systematischen Verzeichnis der ICD-10-GM und deren vom BfArM veröffentlichen Dateien und Metadaten gearbeitet.

1.2 Metadaten

Das BfArM veröffentlicht zwischen September und Dezember eines Jahres die Metadaten der neuen Fassung der ICD-10-GM in einer Zipper (ZIP)-Datei mit Kodierungen und weiteren Informationen. Der Ordner Klassifikationsdateien enthält die aktuelle Version der Dateien für die Klassifikation der ICD-10-GM (sehen Sie die Tabelle 1.2). Diese Dateien sind in Comma-Separated Values (CSV)-Format mit ";" als Trendzeichen.

◎••◎

KAPITEL 1. INTRODUKTION

Tabelle 1.2: Liste der Dateien im Ordner Klassifikationsdateien. "JJJJ" stellt das Jahr der Fassung der ICD-10-GM dar.

Dateiname	Information
icd10gmJJJJsyst_gruppen.txt	Kapitel der ICD-10-GM-Systematik
icd10gmJJJJsyst_kapitel.txt	Kapitel der ICD-10-GM-Systematik
icd10gmJJJJsyst_kodes.txt	Kodes der ICD-10-GM-Systematik
morbl_JJJJ.txt	Morbiditätsliste
mortl1_JJJJ.txt	Mortalitätsliste 1
mortl1grp_JJJJ.txt	Gruppen der Mortalitätsliste 1
mortl2_JJJJ.txt	Mortalitätsliste 2
mortl3_JJJJ.txt	Mortalitätsliste 3
ortl3grp_JJJJ.txt	Gruppen der Mortalitätsliste 3
mortI4_JJJJ.txt	Mortalitätsliste 4

Die ZIP-Datei enthält auch eine Liesmich-Datei mit der Beschreibung aller CSV-Dateien, vorkommenden Erneuerungen in der Struktur der CSV-Dateien, und SQL-Statements für den Aufbau einer Datenbank oder eines Schemas, je nach welchem Relational Database Management System (RDBMS) benutzt wird [6]. Solche Tabellen sind mit Kopfzeilen in rot in der Abbildung 2.1 dargestellt. Diese ZIP-Dateien befinden sich auf der Seite Downloads der Klassifikationen der BfArM Webseite in der Sektion ICD-10-GM. Hier befinden sich die Version des laufenden Jahres und die Vorgängerversionen. Die Namen der Links zu den ZIP-Dateien haben die Struktur ICD-10-GM Version JJJJ. Die Struktur der Namen der ZIP-Dateien ist ICD-10-GMVersionJJJJ.zip.

2 Materialien und Methode

2.1 Aufbau der Datenbank

Für die Durchführung dieses Projekts wurde ein relationales DB Schema in PostgreSQL entwickelt. Damit wurden die SQL-Anweisungen, nach Empfehlung in der
Liesmich-Dateien der Fassungen, angepasst [6]. Außerhalb von den vorher genannten Anpassungen wurde die Tabelle kodes auch modifiziert. In dieser Tabelle wurde
die Spalte ver für die Speicherung der Auffassungen oder Versionen eingefügt und
die Spalte fünfsteller wurde zu fuenfsteller umbenannt, um Probleme mit ZeichenKodierung zu verhindern. Diese Veränderungen sind in schwatzt in der Tabelle kodes
der Abbildung 2.1 gekennzeichnet. Noch dazu wurden drei neuen Tabelle eingefügt,
um die Veröffentlichung Daten (icd10gm_release_info), Speicherung (icd10gm) und Historisierung icd10gm_history aller verfügbaren ICD-10-GM von 2007 bis 2021 zu steuern.
Solche Tabellen sind mit Kopfseile in gelb in der Abbildung 2.1 repräsentiert.

2.2 Funktion der Tabellen

2.3 Tabelle kodes von BfArM

Die Tabellen von kodes vom BfArM-Schema beinhalten die Information der CSV-Dateien von nur eine Fassung und enthält damit die Anfangsdaten für die Tabellen icd10gm und icd10gm_history.




Abbildung 2.1: Datenbankstruktur für die Steuerung der ICD-10-GM.

2.3.1 Neuen Tabellen

Für die Erfassung der Datierung der Veröffentlichungen der Versionen wurde die Tabelle icd10gm_release_info erstellt. Diese speichert den Identifikator oder das Jahr der Version in der Spalte icd10gm_version und das Datum der Veröffentlichung in der Spalte icd10gm_release. Diese hat das Format JJJJ-MM-TT. Wobei J das Jahr, M der Monat und T der Tag darstellen. Dadurch wir nur mit der neuesten Veröffentlichung einer Fassung arbeiten, wurde der Identifikator der Version als Hauptschlüssel deklariert.

Die ICD-10-GM von 2007 bis 2021, werden in der Tabelle icd10gm gespeichert. In dieser Tabelle wird die Information der noch gültigen ICD-10-GM aktualisiert. Die Spalte code dieser Tabelle ist die Hauptschlüssel, genau wie in der Tabelle kodes vom BfArM-Schema. ver speichert den Identifikator der Version der Insertion oder der letzten Änderung und ist ein Fremd Schlüssel, der zu der Spalte icd10gm_version der Tabelle icd10gm_release_info zeigt.

Die Tabelle icd10gm_history enthält die Information der ICD-10-GM, die mit der

Laufe der Zeit eingefügt, gelöscht oder geändert wurden. Die Besonderheiten diese Tabelle sind die Spalten ver, oldver, verevent und isdeleted. Die Identifikatoren vergangener Versionen einer ICD-10-GM werden in der Spalte oldver gespeichert. Die Spalte ver enthält den Identifikator der Fassungen bei deren eine ICD-10-GM eingefügt, gelöscht oder modifiziert wurde. Die Ereignisse einer Insertion, Änderung, Löschung oder Wiederverwendung werden mit den Buchstaben I "insert", U "update", D "delete" und DI "delete insert" in der Spalte verevent kodiert und gespeichert. Da manche Schlüsselnummer wieder benutzt wurden, wird die Spalte isdeleted mit dem Wert true markiert, wenn ein ICD-10-GM gelöscht wird. Diese Spalte wird auf false bei eine Wiederverwendung gesetzt.

2.4 Fluss der Information

Mit Hilfe einer ETL-Strecke werden die Daten aus der ZIP-Dateien in der DB importiert. Die Information der Veröffentlichung der ICD-10-GM wird in der Tabelle icd10gm_release _info eingefügt. Bei jeder Ladung wird die Information der Tabelle kodes vorher gelöscht und mit neuen ICD-10-GM-Datensätzen geladen. Die Codes, die vorher nicht in der Tabelle icd10gm vorhanden waren, werden in dieser und in der Tabelle icd10gm_history kopiert. Diese Datensätze werden in icd10gm_history als eingefügt markiert. Nicht in kodes existierende ICD-10-GM werden aus icd10gm in icd10gm_history kopiert. Diese Kopie enthält auch die Indikatoren der Fassung der Insertion oder der letzten Änderung, und der Fassung der Löschung, und wird als gelöscht markiert. Existierende Kodierungen mit neuer Information werden in der Tabelle icd10gm aktualisiert und nachher in icd10gm_history hinzugefügt. In diesem Fall werden auch die Indikatoren der alten und neuen Fassung registriert und der Datensatz als modifiziert markiert. Dieser Fluss der Information ist im Datenflussdiagramm der Abbildung 2.2 repräsentiert. Der automatisierte Prozessablauf in der DB ist durch Triggers in den Tabellen kodes und icd10gm gesteuert.

2.5 ETL-Strecke

Für den Import der Information der ICD-10-GM in der DB wurde eine ETL-Strecke entwickelt. Dazu wurden Bourne-again shell (BASH)-Skripts unter Ubuntu 20.04 programmiert und durchgeführt. Die Anfang Punk für die Durchführung der ETL sind die ZIP-Dateien der ICD-10-GM Metadaten von 2007 bis 2021 aus der Download Seite vom BfArM für die Klassifikationen. Diese Dateien wurden zuerst manuell heruntergeladen. Der Abruf und die Reihenfolge der Skripts für den Durchlauf der ETL werden von dem BASH-Skript icd_etl.sh definiert. Die Abbildung 2.3 stellt das Flussdiagramm der ETL-Strecke dar.






Abbildung 2.2: Datenflussdiagramm der Information von den ZIP-Dateien bis zum Import in der DB.

2.5.1 Extraktion

Zuerst werden die Ordner der ZIP-Dateien mit Hilfe des Skripts unzipper.sh entpackt. Das Skript copy_codes.sh generiert ein neuen Ordner für die Speicherung der Kode-Dateien. Diese Dateien werden ausgewählt und in diesem Ordner kopiert. Die Information des Datums der Freigabe und Fassung wird mit dem Skript extra_info.sh aus der Liesmisch-Dateien extrahiert und in einem CSV-Datei importiert.

2.5.2 Transformation

Die Kode-Dateien von 2007 bis 2009 haben den Windows-Standardzeichensatz (ISO-8859-15) als Zeichenkodierung. Das verursacht Probleme bei dem Datenaustausch zwischen Plattformen. Aus diesem Grund wandelt das Skript iso_2_utf8.sh das Format dieser Kode-Dateien von ISO-8859-15 in UTF-8 um.

Mit der Laufe der Zeit sind neue Spalten in der CSV-Dateien entstanden und andere Felder werden veraltet und entnommen [7, 8]. Deswegen das Skript select_columns.sh,

(e)

wählt die aktuell benutzte Spalten aus, fügt leere Felder an der Positionen die vorher nicht vorhanden waren ein, fügt ein neues Feld mit der Version an Anfang jede Zeile ein, und importiert der Datensatz einer neuen generierten CSV-Dateien.




Abbildung 2.3: Flussdiagramm der ETL-Strecke für den Import der Information der ICD-10-GM aus den ZIP-Dateien in der DB.

2.5.3 Laden

Am Ende das Skript insert_into_db.sh importiert die Information der CSV-Dateien in der Tabelle kodes der DB.



3 Ergebnisse

3.1 ICD-10-GM in der CSV-Dateien und DB

Die Analyse der Information der ICD-10-GM wurde mit Hilfe SQL-Befehle und Python unter dem Framework Jupyter-Notebook durchgeführt.

Wie in der Tabelle 3.1 dargestellt wird, jede Kode-Datei enthält mehr als 15450 ICD-10-GM, obwohl manche Kodierungen gelöscht werden, nimmt die Menge neuer ICD-10-GM immer zu.

Tabelle 3.1: Anzahl an ICD-10-GM per Jahr in den CSV-Dateien

Anzahl	Fassung
15455	2007
15498	2008
15523	2009
15598	2010
15633	2011
15643	2012
15668	2013
15688	2014
15761	2015
15821	2016
15930	2017
16059	2018
16126	2019
16131	2020
16203	2021
236737	Gesamt

Nach dem Durchlauf der ETL sind insgesamt 16520 ICD-10-GM von 2007 bis 2021 in der DB eingefügt. In der Abbildung 3.1 ist die das Verhältnis dieser Kodierungen dargestellt. Wobei die Spalten für den Titel der drei- vier- und fünften Stellen der Codes nicht berücksichtigt wurden, weil diese Felder erst im Jahr 2013 entstanden sind [7]. Ein weiteres Aspekt in Bezug auf die 10180 Änderung ist, dass die Werte ver-

schiedener Felder bei manchen ICD-10-GM in früheren Fassungen noch nicht definiert waren, wie in der Tabelle 3.3 bei den Fällen der Mortaliätlisten verdeutlicht wird.




Abbildung 3.1: Charakterisierung der ICD-10-GM in der DB.

3.2 Neue ICD-10-GM

Von 2008 bis 2021 sind insgesamt 966 neuen ICD-10-GM entstanden. In der Abbildung 3.2 ist ein interessantes Aspekt davon repräsentiert, nämlich die Anzahl neuer ICD-10-GM pro Jahr ist unregelmäßig. Es gib Jahre wie 2017 und 2018 mit mehr als 120 neue Einträge. Dieses Phänomen passiert am meisten beim Bedarf neuer Subklassifikationen, um die Diagnosen spezifischer zu kodieren und an diverse klinischen Systeme anzupassen. Ein Beispiel dieses Phonemen ist der Code U81! Bakterien mit Multiresistenz gegen Antibiotika, dieser wurde in 2017 entnommen und stattdessen entstand die Kodierung U81.-! Gramnegative Erreger mit bestimmten Antibiotikaresistenzen, die besondere therapeutische oder hygienische Maßnahmen erfordern zusammen mit 43 weiteren Subklassifikationen von U81.0-! bis U81.8!. Die Ursache davon war eine Umstrukturierung der Bereiche U81!, um diese Codes an die Nomenklatur der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) anzupassen [9].

Im Jahr 2018 wurden mehr als 80 neue ICD-10-GM bei M14.-* Arthropathien bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten eingefügt. Diese Zunahme ist auch in der Abbildung 3.3 widerspiegelt, denn diese Diagnosen sind im Kapitel Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes repräsentiert. Die Ursache diese Zunahme war die Insertion einer fünften Stelle, um die Abbildung im German Diagnosis Related Groups (G-DRG)-System zu ermöglichen [10].






Abbildung 3.2: Anzahl neuer ICD-10-GM zwischen den Jahren 2008 und 2021

Ein wichtiger und aktueller Punkt sind die meldepflichtigen Krankheiten in der Laufe der Jahre. Dieses Phonemen ist in der Abbildung 3.4 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass sei 2007 nur in den Jahren 2010, 2016 und 2021 wurden neue meldepflichtigen Codes definiert (Tabelle 3.2). Ursachen davon sind Pandemien und Epidemien wie die Influenza Varianten zwischen 2009 und 2010 [11, 12], die Verbreitung des Dengue Fiebers in Europa als Effekt der Globalisierung mit der steigenden Mobilität [13] und Verbreitung der asiatischen Tigermücke Aedes (Stegomyia) albopictus zwischen 2015 und 2016 in der Region als Konsequenz der milden Winter [14], und noch aktuell seit Februar 2020 die Verbreitung des Corona Virus in Europa [15] und deren gesundheitlichen Folgen [16].




Abbildung 3.3: Kapitel mit den meisten eingeführten ICD-10-GM zwischen 2008 und 2021 und die Jahren mit den meisten neue ICD-10-GM




Abbildung 3.4: Menge an neuen meldepflichtigen Diagnosen zwischen den Jahren 2008 und 2021

ICD-10-GM Fassung Titel 2010 Akute Virushepatitis, nicht näher bezeichnet B17.9 2010 U69.2-! Sekundäre Schlüsselnummern für besondere epidemiologische Zwecke 2010 U69.20! Influenza A/H1N1 Pandemie 2009 [Schweinegrippe] 2010 U69.21! Influenza A/H5N1 Epidemie [Vogelgrippe] 2016 A97.-Dengue 2016 A97.0Dengue ohne Warnzeichen 2016 A97.1 Dengue mit Warnzeichen 2016 A97.2 Schweres Dengue 2016 A97.9 Dengue, nicht näher bezeichnet 2021 U07.1! COVID-19, Virus nachgewiesen 2021 U07.2! COVID-19, Virus nicht nachgewiesen 2021 U10.-Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19 2021 U10.9 Multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19, nicht näher bezeichnet

Tabelle 3.2: Meldepflichtige Krankheiten

3.3 Modifizierte ICD-10-GM

Jedes Jahr werden Anderungen in der Metadaten der ICD-10-GM vorgenommen. Solche Modifikationen sind in der Tabelle 3.3 ausgelistet. In dieser Tabelle ist es zu erkennen, dass die meiste Änderungen in Bezug zur Mortalitätslisten entstanden sind, nämlich 6949 ICD-10-GM bei dem Bezug zur Mortalitätsliste 3 und 6348 Kodierungen bei dem Bezug zur Mortalitätsliste 1. Die Ursache davon ist, dass die Werte solche Listen bei der meisten Codes im Jahr 2007 nicht definiert waren, und mit dem Wert UNDEF gesetzt. Erst in 2008 wurden diese Felder durch einen spezifischen Wert ersetzt. Die zahlreiche Modifikationen an der Klassentitel entstehen durch Vorschläge zur Weiterentwicklung der Klassifikationen. Ein Beispiel davon ist die Schlüsselnummer E10.31 mit dem Titel Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet. Dieser Titel wurde zu Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] : Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet in 2009 geändert. Die Änderung wurde in diesem Jahr durchgeführt, da eine fünfte Stelle in der Klassifikationen von E10 bis E14 eingefügt wurde [17]. Der Titel dieser ICD-10-GM wurde nochmal in 2014 zu Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet ersetzt. In diesem Jahr wurden die Titel von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an die

@(1)

gebräuchliche Terminologie angepasst [18].

Tabelle 3.3: Liste deDr Metadaten und Anzahl an Änderungen

Änderungen	Metadaten		
6949	Bezug zur Mortalitätsliste 3		
5	Bezug zur Mortalitätsliste 3 (davon definiert)		
6348	Bezug zur Mortalitätsliste 1		
2	Bezug zur Mortalitätsliste 1 (davon definiert)		
1111	Klassentitel		
308	Untere Altersgrenze		
42	Untere Altersgrenze (davon relevant)		
299	Bezug zur Morbiditätsliste		
11	Bezug zur Morbiditätsliste (davon definiert)		
286	Obere Altersgrenze		
19	Obere Altersgrenze (davon relevant)		
162	Auswahl der Laborausschlussziffer des einheitlichen Bewertungsmaßtabs		
	(EBM)		
118	Art der Vier- und Fünfsteller		
69	Bezug zur Mortalitätsliste 4		
0	Bezug zur Mortalitätsliste 4 (davon definiert)		
68	Geschlechtsbezug		
64	Bezug zur Mortalitätsliste 2		
2	Bezug zur Mortalitätsliste 2 (davon definiert)		
44	Erster Dreisteller der Gruppe		
40	Meldepflicht		
31	Sehr seltene Krankheit in Mitteleuropa		
6	Belegte Nummer		
3	Paragraph 295		
2	Klassifikationsebene		

Ein interessantes Aspekt ist, dass 52 Diagnosen mit Geschlechtsbezug der 68, Krankheiten der Brustdrüse sind. Diese ICD-10-GM waren frühe auf das weibliche Geschlecht bezogen, jetzt ist der Geschlechtsbezug diese Kodierungen irrelevant. Viele dieser Änderungen wurden in den Jahren 2008 und 2016 vorgenommen. An dieser Stelle können wir nicht erklären, wieso diese Art von Krankheiten nicht immer ohne Geschlechtsbezug waren, denn seit 1930 existieren medizinische Publikationen über Brustdrüse Anomalien bei Männer [19].

In Bezug auf die sehr seltene Krankheiten in Mitteleuropa sind 20 von den 31 belegte Schlüsselnummer. Davon gehören 14 zu den Bereichen A36.- Diphtherie und A80.- Akute Poliomyelitis [Spinale Kinderlähmung]. Diese sind in der Tabelle 3.4 ausgelistet.

Tabelle 3.4: ICD-10-GM der Bereiche A36.- Diphtherie und A80.- Akute Poliomyelitis [Spinale Kinderlähmung]. J Ja, N Nein.

Änderung	ICD-10-GM	Titel	Alt	Neue
2011	A36	Diphtherie		J
2011	A36.0	Rachendiphtherie	N	J
2011	A36.1	Nasenrachendiphtherie	N	J
2011	A36.2	Kehlkopfdiphtherie	N	J
2011	A36.3	Hautdiphtherie	N	J
2011	A36.8	Sonstige Diphtherie	N	J
2011	A36.9	Diphtherie, nicht näher bezeichnet	N	J
2011	A80	Akute Poliomyelitis [Spinale Kin-	N	J
		derlähmung]		
2011	A80.0	Akute paralytische Poliomyelitis durch Impf-		J
		virus		
2011	A80.1	Akute paralytische Poliomyelitis durch im-	N	J
		portiertes Wildvirus		
2011	A80.2	Akute paralytische Poliomyelitis durch ein-	N	J
		heimisches Wildvirus		
2011	A80.3	Sonstige und nicht näher bezeichnete akute	N	J
		paralytische Poliomyelitis		
2011	A80.4	Akute nichtparalytische Poliomyelitis	N	J
2011	A80.9	Akute Poliomyelitis, nicht näher bezeichnet	N	J

Die Ursachen der Änderungen sind die erfolgreiche Impfkampagne in Deutschland, sodass die vom Robert-Koch-Institut (RKI) jährlich selten gemeldeten Fällen importiert sind [20].

3.4 Gelöschte ICD-10-GM

In jeder Fassung von 2008 bis 2021 ICD-10-GM werden gelöscht. Dieses Verhalten ist in der Abbildung 3.5 repräsentiert. Die meiste davon im Jahr 2013.

©(•)




Abbildung 3.5: Anzahl gelöschten ICD-10-GM zwischen den Jahren 2008 und 2021




Abbildung 3.6: Meist betroffene Kapitel in 2013

Die Kapitel, die in diesem Jahr, am meisten getroffen wurden, sind in der Abbildung 3.6 dargestellt. In diesem Jahr wurde eine umfangreiche Umstrukturierung in der Semantik vorgenommen, bei denen bestimmte Kodebereiche im Kapitel 09 Krankheiten des Kreislaufsystems umfänglich überarbeitet wurden, viele fünfstellige Klassifizierungen wurden von Kapitel 13 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes entnommen, und im Kapitel 22 Schlüsselnummern für besondere Zwecke wurden zahlreiche ICD-10-GM umgebaut [21].

Die Abbildung 3.7 zeigt, dass die meiste Codes, nämlich 295 der 327 gelöschten Kodierungen, terminale Schlüsselnummer waren, also ICD-10-GM ohne Subkategorien.

Davon wurden 115 erweitert wie in der Sektion 3.2 erläutert wurde. Von der nicht terminale Kodierungen wurden dann 11 erweitert. Ein Beispiel davon ist Z75.2- Wartezeit auf eine Untersuchung oder Behandlung, diese nicht terminale Kodierung wurde gelöscht und zu der terminalen Code Z75.2 mit demselben Titel umgewandelt. Der Rest der ICD-10-GM wurden einfach nicht mehr weiter benutzt.




Abbildung 3.7: Hierarchie der gelöschte ICD-10-GM

3.5 Wiederverwendete ICD-10-GM

Die Tabelle 3.5 zeigt die 4 Schlüsselnummer, die wiederverwendet wurden.

Gelöscht	Wieder	ICD-10-GM	Aktueller Titel	
2013	2015	M21.60	Erworbener Hohlfuß [Pes cavus]	
2013	2015	M21.6-	Sonstige erworbene Deformitäten	
			des Knöchels und des Fußes	
2014	2016	N90.8	Sonstige näher bezeichnete nicht- entzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums	
2010	2019	K55.8	Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes	

Tabelle 3.5: Liste der wieder benutzten ICD-10-GM

Die Schlüsselnummer M21.6- und M21.60 wurden in 2013 entnommen, da im Kodebereich M20-M25 zahlreiche Schlüssel zu keine sinnvolle Kombinationen führten [21].

@(1)

Andererseits in 2015 wurde die Kategorie M21.6 mit den genannten Schlüsselnummer wieder aufgenommen, um eine bessere Spezifikation der Diagnosen in dem G-DRG-System [22].

Die ICD-10-GM N90.8 wurde in 2014 entnommen und stattdessen wurde N90.8- Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums mit weiteren Subklassifikationen zur spezifischen Kodierung eingeführt [18]. Zwei Jahre später in 2016 wurde der Code N90.8- und deren Unterkategorien wieder entnommen und zu anderem Kapitel mit neuen Codes verlagert, und die Schlüsselnummer N90.8 wurde wieder eingeführt [23].

Die Kodierungsschlüssel K55.8 wurde in 2010 gelöscht und die Kodierung K55.8-Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes mit weiteren Stellen eingeführt, um einige Diagnosen des Dünndarms bessern abgrenzen zu können [24]. In 2019 wurde die ICD-10-GM K55.3- Angiodysplasie des Dünndarmes mit weiteren fünfstelligen Codes eingeführt und die, in 2010, eingeführte Klassifikationen wurden auf dem neuen Kodeberich verlagert, sodass die Kodierungen von 2010 obsolet wurden, und K55.8 wieder benutzt wurde [25].

3.6 Strukturelle Änderungen

Wie in der Subsektion 2.5.2 genannt wurde, es gab auch Änderungen in der Struktur des semantischen Verzeichnisses. Im Jahr 2013 wurde die Spalte titel für den Klassentitel der Tabelle kodes aus dem Dreisteller-, Viersteller- und gegebenenfalls Fünfstellertitel zusammengesetzt. Auch in diesem Jahr wurden drei neue Felder für die einzelnen Bestandteile des zusammengesetzten Klassentitels eingefügt [7]. Eine weitere Änderung in der Tabelle kodes, die schon sei 2015 geplant wurde, und im Jahr 2018 vorgenommen wurde, war die Entnahme der Felder der Altersklassenformaten für die untere und obere Grenze des Altenbezuges mit Angabe von Tagen, Wochen, Monaten und Jahren; und damit blieben nur die Felder mit dem Format in Tagen und Jahren, nämlich altunt für die untere Grenze und altob für die obere Grenze des Altenbezuges [8].

3.7 Zeitliche Entwicklung der ICD-10-GM

Vorher wurden die verschiedenen Änderungen in dem semantischen Verzeichnis und einige Gründe davon genannt und erklärt. In der Tabelle 3.6 wird, Anhang von einem Beispiel, die chronologische Entwicklung der ICD-10-GM in der Tabelle icd10gm_history der DB gezeigt. Die Spalte Fassung, ver in der Tabelle icd10gm_history, stellt die Version der Einführung, Änderung, Löschung oder Wiederverwendung einer ICD-10-GM

◎••◎

dar. Das Feld Alte Fassung, oldver in der vorher genannten Tabelle, beinhaltet den Identifikator der vorherigen Fassung einer Schlüssel. In der Spalte Ereignis, verevent in der Tabelle icd10gm_history, sind die Ereignisse Einführung, Änderung, Löschung und Wiederverwendung, wie in der Subsektion 2.3.1 beschrieben wurden, kodiert. Eine wichtige Anmerkung in der Darstellung ist, dass die gezeigte alte Fassung bei der wiederverwendete Klassifikationen die Fassung der Insertion oder der letzten Änderung ist, weil in der Fassung der Löschung dieser Code nicht vorhanden war.

Es ist zu erkennen, dass unsere Implementierung die Lebenszyklus von ICD-10-GM Klassifikationen darstellen kann, sodass jede Modifikation dokumentiert ist. In einer extra CSV-Datei ist die vollständige Tabelle icd10gm_history mit allen Spalten und Klassifikationen der registrierten Kodierungen von 2007 bis 2021.

Tabelle 3.6: Beispiel der Historisierung einer ICD-10-GM Klassifikation. Dieses stellt eine, nach der Einführung, veränderte, gelöschte, und wieder benutzte Schlüsselnummer dar.

Fassung	Code	Titel	Alte Fassung	Ereignis
2007	N90.8	Sonstige näher bezeichnete nicht-		I
		entzündliche Krankheiten der Vulva		
		und des Perineums		
2008	N90.8	Sonstige näher bezeichnete nicht-	2007	U
		entzündliche Krankheiten der Vulva		
		und des Perineums		
2013	N90.8	Sonstige näher bezeichnete nicht-	2008	U
		entzündliche Krankheiten der Vulva		
		und des Perineums		
2014	N90.8	Sonstige näher bezeichnete nicht-	2013	D
		entzündliche Krankheiten der Vulva		
		und des Perineums		
2016	N90.8	Sonstige näher bezeichnete nicht-	2013	DI
		entzündliche Krankheiten der Vulva		
		und des Perineums		

4 Schlussfolgerung

Mit der Durchführung dieses Projekts konnten wir die Besonderheiten eines Lebenszyklus der historischen ICD-10-GM Auffassungen von 2007 bis 2021 darstellen. Damit wurde eine DB-Schema zur Speicherung der Daten zusammen mit eine ETL-Strecke zum Import der Information in der DB programmiert. Am Ende der Implementierung konnten die Besonderheiten der ICD-10-GM in dem genantem Zeitraum, nämlich Insertion, Modifikation und Löschung in Python analysiert werden. Damit wurden verschiedene Ursachen für die Änderungen in der Auffassungen erkannt und detailliert analysiert.

Literatur

- [1] ICD-10-GM. Zugriff am 22-09-2021. Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), 2021. https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/.
- [2] Marcus Will. pesönliches Gespräch. 2021.
- [3] Alphabetisches Verzeichnis zur ICD-10-GM. Zugriff am 22-09-2021. Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/alphabet/.
- [4] Systematisches Verzeichnis der ICD-10-GM. Zugriff am 22-09-2021. Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/systematik/.
- [5] Aufbau der Vierstelligen ausführlichen Systematik der ICD-10-GM. Zugriff am 30-09-2021. Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/systematik/systematik/.
- [6] LIESMICHDATEI. Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), Nov. 2020.
- [7] LIESMICHDATEI. Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), Sep. 2012.
- [8] LIESMICHDATEI. Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), Sep. 2016.
- [9] Kommentar zur ICD-10-GM Version 2017. Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), Sep. 2016.
- [10] Kommentar zur ICD-10-GM Version 2018. Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), Sep. 2017.
- [11] A Amato-Gauci, P Zucs, R Snacken, B Ciancio, V Lopez, E Broberg, P Penttinen, A Nicoll und collective on behalf of the European Influenza Surveillance Network (EISN). "Surveillance trends of the 2009 influenza A(H1N1) pandemic in Europe". In: Eurosurveillance 16.26 (2011). DOI: https://doi.org/10.2807/ese.16.26.19903-en.
- [12] Robyn Martin, Alexandra Conseil, Abie Longstaff, Jimmy Kodo, Joachim Siegert, Anne-Marie Duguet, Paula Lobato de Faria, George Haringhuizen, Jaime Espin und Richard Coker. "Pandemic influenza control in Europe and the constraints resulting from incoherent public health laws". In: *BMC Public Health* 10.1 (2010). ISSN: 1471-2458. DOI: 10.1186/1471-2458-10-532.

Literatur

- [13] Donald Salami, César Capinha, Maria do Rosário Oliveira Martins und Carla Alexandra Sousa. "Dengue importation into Europe: A network connectivity-based approach". In: *PLOS ONE* 15.3 (2020). DOI: 10.1371/journal.pone. 0230274.
- [14] D. Walther, D.E. Scheuch und H. Kampen. "The invasive Asian tiger mosquito Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) in Germany: Local reproduction and overwintering". In: *Acta Tropica* 166 (2017). DOI: https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2016.11.024.
- [15] Feng He, Yu Deng und Weina Li. "Coronavirus disease 2019: What we know?" In: Journal of Medical Virology 92.7 (2020). DOI: https://doi.org/10.1002/jmv.25766.
- [16] Abdul Mannan Baig. "Chronic COVID syndrome: Need for an appropriate medical terminology for long-COVID and COVID long-haulers". In: *Journal of Medical Virology* 93.5 (2021). DOI: https://doi.org/10.1002/jmv.26624.
- [17] Kommentar zur ICD-10-GM Version 2009. Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), Sep. 2008.
- [18] Kommentar zur ICD-10-GM Version 2014. Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), Sep. 2013.
- [19] Mohd. Ajmal Husain. "Scirrhus Cancer of the Breast in the Male". In: *The Indian Medical Gazette* 65.6 (1930), S. 330. ISSN: 0019-5863. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5157223/ (besucht am 09.09.2021).
- [20] Miriam Wiese-Posselt, Christine Tertilt und Fred Zepp. "Vaccination Recommendations for Germany". In: *Dtsch Arztebl International* 108.45 (2011). DOI: 10.3238/arztebl.2011.0771.
- [21] Kommentar zur ICD-10-GM Version 2013. Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), Sep. 2012.
- [22] Kommentar zur ICD-10-GM Version 2015. Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), Sep. 2014.
- [23] Kommentar zur ICD-10-GM Version 2016. Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), Sep. 2015.
- [24] Kommentar zur ICD-10-GM Version 2010. Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), Okt. 2009.
- [25] Kommentar zur ICD-10-GM Version 2019. Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), Sep. 2018.

