



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
INSTITUTO DE TECNOLOGIA - ITEC

FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA - FEM  
LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA -  
LQAQ

**RELATÓRIO DE PRÁTICA 8: TERMOQUÍMICA, LEI DE  
HESS  
PROF. DR. CARLOS ANTÔNIO NEVES**

ALAN HENRIQUE PEREIRA MIRANDA - 202102140072  
GABRIEL CRUZ DE OLIVEIRA - 202102140055  
PALOMA GAMA DA SILVA - 202102140029  
SILVIO FARIAS LEAL - 202102140035

Belém-PA  
2022


# 1 Introdução

A termoquímica é o ramo da química que estuda as relações entre as energias envolvidas nas reações químicas e o seu efeito sobre a temperatura. A termoquímica pode ser usada para calcular quantidades de energia, como a quantidade de calor envolvida em uma reação, ou para determinar as condições ideais para uma reação ocorrer.

A primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação da energia, que afirma que a energia total de um sistema é constante. A segunda lei da termodinâmica é a lei da entropia, que afirma que o aumento da entropia de um sistema é diretamente proporcional ao tempo. E a terceira lei, também conhecida como a lei da zero da termodinâmica, que afirma que a entropia de um sistema não pode ser negativa. Todas as leis da termodinâmica são aplicadas à química, e são usadas para prever o comportamento de reações químicas.

A quantidade de calor envolvida em uma reação química é medida pelo calor de reação, ou  $q$ . O calor de reação é a quantidade de calor liberado ou absorvido pelo sistema quando uma reação ocorre. O calor de reação pode ser calculado usando a equação  $q = \Delta H$ , onde  $\Delta H$  é a mudança de entalpia da reação. A mudança de entalpia é a diferença entre a energia final do sistema e a energia inicial do sistema.

No exemplo abaixo, a reação é a decomposição do ácido sulfúrico em água e gás sulfúrico.



Neste exemplo,  $q = \Delta H = -184 \text{ kJ}$ . Isto significa que 184 kJ de energia serão liberados quando 2 mol de ácido sulfúrico se decompuser em água e gás sulfúrico.

## 2 Objetivos

Como no exemplo citado na introdução, o fenômeno observado foi a "Dissolução". Trata-se do processo de dissolver um soluto em um solvente. Em tal procedimento, os solutos podem gerar íons, que podem ser ou não classificados como eletrólitos. É dito eletrólito quando a dissolução acontece, ainda podem ser chamados de fortes, quando se dissociam completamente em um processo irreversível.

Os mais proeminentes exemplos de substâncias com forte caráter eletrólito são os sais, que são compostos formados por íons de cátions e ânions. Os cátions são íons positivos, e os ânions são íons negativos. Entre os eletrólitos fracos, podemos citar os ácidos e as bases, que são compostos que se dissociam parcialmente em um processo reversível. Os ácidos são compostos que liberam íons  $H^+$ , e as bases são compostos que liberam íons  $OH^-$ . Os eletrólitos fracos são regidos por uma constante de equilíbrio que nos permite determinar suas quantidades em função das condições impostas ao sistema químico.

Dessa forma, o objetivo deste material passa por:

- Verificar o aumento de temperatura de uma reação de neutralização, através de uma solução de NaOH, quando exposta a uma solução de HCl.
- Verificar o aumento de temperatura de um processo de dissolução, seguido de uma reação de neutralização de HCl, quando exposta ao NaOH em estado sólido, e comparar com o aumento de temperatura observado na mistura das soluções.

### 2.1 Objetivos específicos

- Realizar a medição da variação de temperatura da reação de neutralização, e da dissolução, e comparar os resultados com os obtidos na literatura.

- Verificar a validade da Lei de Hess, que diz que a variação de energia livre de uma reação química é igual à soma das variações de energia livre das reações que a compõem.
- Trabalhar com a dissolução de ácidos e bases.
- Trabalhar conceitos de calorimetria dentro de um ambiente controlado.
- Calcular a variação de entalpia observada em um processo de dissolução, e de uma reação de neutralização.

### 3 Materiais

Os materiais utilizados para a realização desta prática foram:

- 50 mL de solução de NaOH 0,5 mol/L.
- 50 mL de solução de HCl 0,50 mol/L.
- 50 mL de solução de HCl 0,25 mol/L.
- Amostra de 20g de NaOH sólido.

Os utensílios do laboratório utilizados foram:

- Termômetro de vidro.
- Bastão de vidro.
- 2 Provetas de 250 mL.
- Balança.
- Espátula.
- Papel Toalha.
- Erlenmeyer de 250 mL.
- Copo de isopor 250 mL.


## 4 Determinação dos Calores de Reação $\Delta H_1$ e Dissolução $\Delta H_2$ na neutralização de NaOH com HCl

### 4.1 Procedimento

Para a realização desta prática, foram utilizados os materiais e utensílios descritos na seção 3. O procedimento para a medição do calor de dissolução do NaOH foi indireto, ou seja, não foi medido diretamente, para tal, foram preparadas duas soluções, a primeira, foi uma de NaOH 0,5 mol/L de 50 mL e, que posteriormente foi misturada com outra solução com 50 mL de HCl a 0,5 mol/L. Enquanto que a segunda solução foi preparada com 50 mL de HCl a 0,5 mol/L, que posteriormente recebeu 20g de NaOH sólido. Tal reação possui balanço estequiométrico 1:1:1, portanto o procedimento de medição das entalpias associadas é mais simplificado.

A primeira solução foi preparada em um Erlenmeyer de 250 mL, que foi colocado dentro do copo de isopor para reduzir a perda térmica da reação para o ambiente. Foram fracionadas porções das soluções em duas provetas, com 50 mL de NaOH 0,5 mol/L e 50 mL de HCl 0,5


mol/L, respectivamente. E por fim, ambas as soluções foram adicionadas ao Erlenmeyer, onde também foi colocado um termômetro de mercúrio para verificar a elevação da temperatura pela reação. Agitou-se a solução até que a reação fosse completa, conforme a equação abaixo:



As condições observadas durante o procedimento foram:

- Temperatura ambiente:  $20^\circ C$  (a confirmar)
- Temperatura da solução:  $25.1^\circ C$  (a confirmar)
- Volume da solução final:  $100 mL$
- A variação de temperatura foi de  $5.1^\circ C$  (a confirmar)

Por seguinte, a amostra de NaOH sólido foi pesada em  $20g$  e colocada em um erlenmeyer de  $250 mL$  isolado pelo copo de isopor. Em seguida, foi adicionada  $50 mL$  de solução de HCl  $0,50$  mol/L. O calor de reação foi medido utilizando um termômetro de vidro, e a solução foi agitada até que o soluto adicionado fosse completamente dissolvido. A reação realizada foi a seguinte:



As condições observadas durante o procedimento foram:

- Temperatura ambiente:  $20^\circ C$  (a confirmar)
- Temperatura da solução:  $29.5^\circ C$  (a confirmar)
- Volume da solução:  $50 mL$
- A variação de temperatura foi de  $9.5^\circ C$  (a confirmar)

A temperatura inicial foi de  $20,0^\circ C$  e a temperatura final foi de  $29,3^\circ C$ . A variação de temperatura foi de  $9,3^\circ C$ .

## 4.2 Cálculos

A equação da entalpia de dissolução de NaOH em HCl é dada por:

$$\Delta H_{rxn} = \Delta H_{for} + \Delta H_{dis} - \Delta H_{Neutr} \quad (3)$$

A legenda para equação é:  $\Delta H_{rxn}$ : entalpia da reação;  $\Delta H_{fus}$ : entalpia de formação;  $\Delta H_{dis}$ : entalpia de dissolução;  $\Delta H_{Neutr}$ : entalpia de neutralização.

E onde  $\Delta H_{rxn}$ : entalpia da reação, sendo descrita como:

$$\Delta H_{dis} = H_{inicial} - H_{final} \quad (4)$$

**OBSERVAÇÃO:** Não foram encontradas tabelas de entalpia de formação para o Hidróxido de Sódio e para o Ácido Clorídrico a  $20^\circ C$ , mas sim a  $25^\circ C$ , portanto, foi feito um ajuste de temperatura para  $20^\circ C$  utilizando a equação de Arrhenius, conforme a equação abaixo:

$$\Delta H_{rxn} = \Delta H_{rxn}^{25^\circ C} - \frac{E_a}{R} \left( \frac{1}{T} - \frac{1}{298} \right) \quad (5)$$

Onde  $\Delta H_{rxn}^{25^\circ C}$ : entalpia de reação a  $25^\circ C$ ;  $E_a$ : energia de ativação;  $R$ : constante dos gases ideais;  $T$ : temperatura;  $298$ : temperatura de referência.

A entalpia de formação do Hidróxido de Sódio foi encontrada na tabela de entalpia de formação de substâncias inorgânicas, conforme a tabela abaixo: O calor de fusão do NaOH é

Substância	Entalpia de Formação	Unidade
Hidróxido de Sódio	$-1.1 \times 10^3$	$kJ \cdot mol^{-1}$
Ácido Clorídrico	$-1.1 \times 10^3$	$kJ \cdot mol^{-1}$

Tabela 1: Entalpia de Formação do Hidróxido de Sódio

de  $6,02 kJ/mol$  e o calor de vaporização do  $H_2O$  é de  $40,66 kJ/mol$ .

O calor de dissolução do NaOH em HCl é de  $-46,68 kJ/mol$ .

O calor de dissolução do NaOH sólido em HCl é de  $-52,70 kJ/mol$ .

A variação de entalpia de dissolução do NaOH sólido em HCl é de  $-6,02 kJ/mol$ .

#### 4.2.1 Determinação do Calor de Neutralização $\Delta H_{neu}$ do NaOH em HCl

A equação da entalpia de dissolução de NaOH em HCl é dada por:

#### 4.2.2 Determinação do Calor de Dissolução $\Delta H_{dis}$ do NaOH em HCl

A equação da entalpia de dissolução de NaOH em HCl é dada por:

## Referências

Mudança de estilo após este ponto com o comando `\citeoption{abnt-show-options=list}`.  
Opção selecionada `abnt-show-options=list`.

Mudança de estilo após este ponto com o comando `\citeoption{abnt-substyle=none}`.

Mudança de estilo após este ponto com o comando `\citeoption{abnt-substyle=UFLA}`.  
. Opção selecionada `abnt-and-type=&`. Opção selecionada `abnt-et-al-cite=2`. Opção selecionada `abnt-et-al-list=0`.

Mudança de estilo após este ponto com o comando `\citeoption{abnt-substyle=COPPE}`.  
Opção selecionada `abnt-title-command=yes`.

Mudança de estilo após este ponto com o comando `\citeoption{abnt-thesis-year=final}`.  
Opção selecionada `abnt-thesis-year=final`.

Mudança de estilo após este ponto com o comando `\citeoption{abnt-thesis-year=title}`.  
Opção selecionada `abnt-thesis-year=title`.

Mudança de estilo após este ponto com o comando `\citeoption{abnt-title-command=no}`.  
Opção selecionada `abnt-title-command=no`.

Mudança de estilo após este ponto com o comando `\citeoption{abnt-title-command=yes}`.  
Opção selecionada `abnt-title-command=yes`.

Mudança de estilo após este ponto com o comando  
`\citeoption{abnt-url-package=hyperref}`. Opção selecionada  
`abnt-url-package=hyperref`.

Mudança de estilo após este ponto com o comando `\citeoption{iso-690-1987}` . Opção selecionada `abnt-cite-style=(Author, YEAR)`. Opção selecionada `iso-abbreviation=standard`. Opção selecionada `iso-author-punctuation=void`.