

LUBOFOSKA® 5-10-15

ДОБРИВО WE • ГРАНУЛЬОВАНЕ • ТИП В.1.1.
NPK (Ca,S) 5-10-15-(12,5-30)

- під усі сільськогосподарські культури, особливо озимі, ярі зернові, ріпак і коренеплоди
- може також використовуватись під картоплю, цукрові буряки, стручкові і бобові дрібнонасінні культури, вирощувані в сумішах з травами
- особливо рекомендується для ґрунтів з дефіцитом калію і середнім вмістом фосфору
- рекомендується також для луків і пасовищ для підживлення під час вегетації через дужехорошу розчинність
- сприятливе співвідношення фосфору до калію - 1 до 1,5
- дуже хороші розсіювальні властивості
- мікроелементи, що містяться в добриві, покращують засвоєння інших компонентів

ГРАНУЛЯЦІЯ ТА НАСИПНА ГУСТИНА

Типовий вміст гранул з розмірами від 2,0 до 5,0 мм не менше 92%. Насипна густина: 0,9 до 1,0 кг/дм³
Дійсний сертифікат відповідності див. на сайті www.nawozyzlubonia.pl

ВЛАСТИВОСТІ

5%	аміачний азот (N)
10%	п'ятиокис фосфору (P ₂ O ₅), розчинний в мінеральних кислотах
9%	п'ятиокис фосфору (P ₂ O ₅), розчинний в нейтральному розчині цитрату амонію і воді
8%	п'ятиокис фосфору (P ₂ O ₅), розчинний у воді
15%	оксид калію (K ₂ O), розчинний у воді
12,5%	оксид кальцію (CaO), розчинний у воді
30%	триоксид сірки (SO ₃) загальний

ЗАСТОСУВАННЯ

Найбільша ефективність досягається при використанні добрива Lubofoska® 5-10-15 перед посівом, змішуючи з ґрунтом на глибині до 10-20 см під час допосівної обробки ґрунту. Добриво не містить компонентів, що обмежують схожість насіння, що дозволяє сібу через 2-4 дні після підживлення.

На луках та пасовищах добриво слід застосовувати поверхнево і розсівати раною весною, одноразово, відповідно до доз фосфору і калію, призначених для всього періоду вегетації.

ДОЗУВАННЯ [кг/га]

Підживлювані рослини	Урожайність т/га	Вміст засвоюваного фосфору і калію в ґрунті		
		низький	середній	високий
озимі зернові	5,0	650	500	350
ярі зернові	4,0	600	470	320
озимий ріпак	3,0	750	650	500
цукровий буряк (на перегної)	40,0	800	650	500
картопля (на перегної)	25,0	700	500	400
зернові бобові культури	2,5	600	450	300
сінокоси	6,0	750	600	400
бобові з травами – зелена маса	50,0	800	650	500
трави при польовому травосіянні - зелена маса	45,0	800	650	500



Містить у своєму складі ряд мікроелементів, зокрема:

