

Chińskie twierdzenie o resztach (z1)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Dane jest N zapytań, a każde z nich składa się z K par liczb p_i oraz a_i , gdzie p_i jest pierwsza. Twoim zadaniem jest znalezienie dla każdego zapytania takiej liczby A , że $0 \leq A < p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_K$ oraz dla każdej pary liczb z zapytania zachodzi $A \bmod p_i = a_i$.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita N , oznaczająca liczbę zapytań. W kolejnych wierszach znajdują się kolejne zapytania.

Każde zapytanie rozpoczyna się jednym wierszem z liczbą K , oznaczającą liczbę par liczb z zapytania. W kolejnych K wierszach znajdują się po dwie liczby całkowite p_i oraz a_i .

Wyjście

Dla każdego zapytania wypisz w osobnym wierszu szukaną liczbę A . Możesz założyć, że zawsze istnieje tylko jedna taka liczba.

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 10\,000$, $1 \leq K \leq 12$, $0 \leq a_i < p_i < 40$, wartości p_i są liczbami pierwszymi.

Przykład

Wejście

```
2
3
5 4
7 6
11 3
4
2 1
3 2
5 3
7 1
```

Wyjście

```
69
113
```

Łączenie zbiorów (z2)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 2.00 s

Dane jest ukorzenione drzewo o N wierzchołkach. Wierzchołki te numerujemy liczbami naturalnymi od 1 do N , gdzie 1 jest korzeniem. Dodatkowo, każdy wierzchołek ma przypisany pewien kolor.

Definiujemy *zbiór wierzchołka* jako zbiór kolorów, które występują w jego poddrzewie.

Twoim zadaniem jest określenie dla każdego wierzchołka liczby różnych kolorów w jego zbiorze.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita N , oznaczająca liczbę wierzchołków w drzewie.

W drugim wierszu wejścia znajduje się N oddzielonych pojedynczymi odstępami liczb całkowitych c_1, c_2, \dots, c_N , oznaczających kolory kolejnych wierzchołków.

W kolejnych $N - 1$ wierszach znajdują się po dwie liczby całkowite a i b , oznaczające, że w drzewie istnieje krawędź między tymi wierzchołkami.

Wyjście

W pierwszym wierszu wyjścia powinno się znaleźć N oddzielonych pojedynczymi odstępami liczb, oznaczających liczby różnych kolorów w zbiorach kolejnych wierzchołków.

Ograniczenia

$$1 \leq N \leq 200\,000, 1 \leq a, b \leq N, 1 \leq c_i \leq 10^9.$$

Przykład

Wejście

```
5
2 3 2 2 1
1 2
1 3
3 4
3 5
```

Wyjście

```
3 1 2 1 1
```

Spójne fragmenty (z3)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 2.00 s

Mamy dany graf posiadający N wierzchołków, pomiędzy którymi pierwotnie nie ma żadnych krawędzi. Następnie, w M krokach dodano do niego po jednej krawędzi. Twoim zadaniem jest, po każdym dodaniu pojedynczej krawędzi, określić ile spójnych fragmentów ma graf oraz ile wierzchołków znajduje się w największym z nich.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N oraz M , oznaczające kolejno liczbę wierzchołków oraz kolejno dodawanych krawędzi w grafie.

W kolejnych M wierszach podane są po dwie liczby całkowite a oraz b oznaczające numery wierzchołków, które właśnie zostały połączone krawędzią.

Wyjście

Na wyjściu wypisz M wierszy, a każdy z nich powinien zawierać dwie oddzielone pojedynczym odstępem liczby, oznaczające kolejno liczbę spójnych fragmentów grafu oraz rozmiar największego z nich.

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 100\,000$, $1 \leq M \leq 200\,000$, $1 \leq a, b \leq N$, $a \neq b$.

Przykład

Wejście

```
5 3
1 2
1 3
4 5
```

Wyjście

```
4 2
3 3
2 3
```

Współczynnik różnorodności (z4)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 1.00 s

Mamy dany graf składający się z N wierzchołków, pomiędzy którymi pierwotnie nie ma żadnych krawędzi. Następnie, w M krokach dodano do niego po jednej krawędzi.

Twoim zadaniem jest, po każdym dodaniu pojedynczej krawędzi, określić *współczynnik różnorodności* spójnego fragmentu, który zawiera dodaną właśnie krawędź.

Współczynnik różnorodności definiujemy jako różnicę pomiędzy największym oraz najmniejszym numerem wierzchołka wewnątrz spójnej, pomnożoną razy liczbę jej krawędzi.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite N oraz M , oznaczające kolejno liczbę wierzchołków oraz kolejno dodawanych krawędzi w grafie.

W kolejnych M wierszach podane są po dwie liczby całkowite a oraz b oznaczające numery wierzchołków, które właśnie zostały połączone krawędzią.

Wyjście

Dla każdej nowo dodanej krawędzi na wyjściu wypisz jeden wiersz zawierający jedną liczbę, oznaczającą współczynnik różnorodności spójnego fragmentu zawierającego właśnie dodaną krawędź.

Ograniczenia

$1 \leq N \leq 100\,000$, $1 \leq M \leq 200\,000$, $1 \leq a, b \leq N$, $a \neq b$.

Przykład

Wejście

5 5
1 3
2 3
4 5
1 2
3 5

Wyjście

2
4
1
6
20

Wyjaśnienie

Po dodaniu ostatniej krawędzi cały graf jest spójny, a jego liczba krawędzi wynosi 5, co oznacza, że współczynnik różnorodności wynosi $(5 - 1) \cdot 5 = 20$.