

Prepare-se para a >> evolução

KETOCHLOR®

Shampoo terapêutico auxiliar no tratamento dos sinais clínicos de infecções secundárias da pele.



Virbac



AS INFECÇÕES SECUNDÁRIAS DA PELE

A Dermatite Atópica Canina é a principal causa de desequilíbrio do microbioma cutâneo, que leva à hiperproliferação de fungos e bactérias.¹




> Neste contexto, a terapia tópica deixa de ser um coadjuvante e assume um **papel central no cuidado com as infecções secundárias da pele.**

> De acordo com as diretrizes do tratamento de infecções cutâneas do ISCAID (2025), a **Clorexidina em concentrações de 2% a 4%, associada ou não a antifúngicos, deve ser a principal escolha terapêutica tópica para cães.**¹



A SOLUÇÃO TERAPÊUTICA DE DUPLA AÇÃO PARA CASOS COMPLEXOS

Indicado para o tratamento dos sinais clínicos relacionados às infecções secundárias associadas à Dermatite Atópica Canina (DAC), promovendo a redução do prurido e da gravidade das lesões de pele, principalmente naquelas agravadas pela hiperproliferação de fungos e bactérias sensíveis à Clorexidina e ao Cetoconazol.



Cetoconazol 1%

Ação antifúngica superior.



Maior penetração no estrato córneo. Atinge concentrações **7 a 14 vezes superiores** às do miconazol.²



Efeito residual prolongado. Alta afinidade pela queratina, garante ação mais duradoura e previne a recolonização.²



Maior espectro de ação antifúngica *in vitro*.³

Digluconato de Clorexidina 2,3%

Potente ação antisséptica, otimizada para um controle bacteriano decisivo.

Ketochlor® foi formulado com uma concentração ideal¹ de clorexidina em associação com antifúngico, para garantir máxima eficácia contra a hiperproliferação bacteriana.

ÚNICO COM A EXCLUSIVA TECNOLOGIA SIS⁴

Skin Innovative Science™ é o nome da junção de 2 tecnologias da Virbac que, combinadas, ajudam a manter o equilíbrio do microbioma e auxiliam a manter a pele saudável.

Auxílio no **equilíbrio do microbioma cutâneo**



Tecnologia
Glyco®

Tecnologia
Defensin®



PROTOCOLO DE USO SIMPLES E PRECISO

Modo de uso



Frequência: aplicar duas vezes por semana.



Duração do tratamento: durante 5 semanas (ou a critério do médico veterinário).



Tempo de ação: massagear e deixar o produto agir na pelagem por 10 minutos antes de enxaguar.

Guia de volume do shampoo por peso do animal

Peso do animal (kg)	Volume do shampoo (mL)
< 4,99	10
5 - 10,99	15
11 - 15,99	20
16 - 20,99	25
21 - 30,99	30
31 - 45,99	40
> 46	50

KETOCHLOR®



Único do mercado que oferece garantia de estabilidade por **12 meses** após aberto.

A escolha evidente para dermatopatias complexas



Eficácia antifúngica superior

Cetoconazol com 7-14x mais penetração no estrato córneo e efeito residual prolongado.²



Potência antisséptica otimizada

2,3% de Clorexidina para um controle bacteriano robusto.



Estabilidade incomparável

12 meses de validade em uso, garantindo tratamento completo e sem desperdício.



Tecnologia exclusiva SIS

Estimula as defesas naturais da pele, essencial para pacientes atópicos.



A qualidade e o suporte científico Virbac


Prescrição assertiva, resultados garantidos ao seu paciente.

KETOCHLOR® NA PRÁTICA

Comprovação científica⁵


41 cães com sinais clínicos de Dermatite Atópica e Supercrescimento Bacteriano (BOG) e de *Malassezia spp.* (MOG), foram divididos em 2 grupos: grupo tratado com Ketochlor® e grupo controle (shampoo neutro).⁵

ESCALA VISUAL DO PRURIDO (PVAS10)




70% de redução no prurido em relação aos sintomas iniciais.

ESCALA DE GRAVIDADE E EXTENSÃO DAS LESÕES (CADESI4)



63% de redução na gravidade e extensão das lesões, em relação aos sintomas iniciais.

● GRUPO CONTROLE ● GRUPO TRATADO



Cão com Dermatite Atópica e sinais de infecção cutânea antes do início do tratamento (A) e 5 semanas após o uso de Ketochlor® (B).

100%

de satisfação no grupo tratado com Ketochlor®⁵.

74%

dos tutores relatam que a resposta terapêutica foi excelente.

26%

relatam que a resposta foi boa.

No grupo controle, **apenas 28% dos tutores** consideraram a resposta como **boa ou excelente**.



Conclusão: Ketochlor® se mostrou eficaz no tratamento dos sinais clínicos associados a quadros de DAC, especialmente naquelas agravadas pela hiperproliferação de fungos e bactérias⁵.

O DESAFIO CLÍNICO DAS INFECÇÕES CUTÂNEAS

As infecções cutâneas (bacterianas, fúngicas ou mistas) estão entre as causas mais comuns de consulta na rotina clínica veterinária. Elas raramente são condições primárias, ocorrendo quase sempre de forma secundária a fatores predisponentes que alteram a barreira cutânea e o seu microbioma.¹





A Virbac possui uma linha completa para o tratamento dos sinais clínicos de infecções secundárias associadas à DAC.

De acordo com Ferreira et al. 2023, os pacientes atópicos apresentam diferentes fenótipos, que variam de acordo com as interleucinas produzidas e a fase da doença⁶:

Paciente agudo (*Resposta Th2*)




Pele eritematosa e prurido;
Maior ocorrência de Folliculite Bacteriana Superficial.

Sugestão de uso:
Hexadene Spherulites®



Paciente crônico (*Resposta Th1 e Th2*)



- Hiperqueratose e hiperpigmentação;
- Infecções recorrentes com BOG e MOG - *Malasseziose*.

Sugestão de uso:
Ketochlor®



1. Loeffler A, Cain CL, Ferrer L, Nishifuji K, Varjonen K, Papich MG, Guardabassi L, Frosini SM, Barker EN, Weese JS. Antimicrobial use guidelines for canine pyoderma by the International Society for Companion Animal Infectious Diseases (ISCAID). Vet Dermatol. 2025 Jun;36(3):234-282.
2. PERSHING, L. K.; CORLETT, J.; JORGENSEN, C. In vivo pharmacokinetics and pharmacodynamics of topical ketoconazole and miconazole in human stratum corneum. Antimicrobial agents and chemotherapy, v. 38, n. 1, p. 90-95, 1994.
3. GUPTA, Aditya K.; DE DONCKER, Piet; TALUKDER, Mesbah. Role of Topical Ketoconazole in Therapeutic Hair Care Beyond Seborrheic Dermatitis and Dandruff. J EADV Clinical Practice, 2025.
4. Santoro D, Bohannon M, Ahrens K, Navarro C, Gatto H, Marsella R. Evaluation on the effects of 0.1% Peumus boldus leaf and Spiraea ulmaria plant extract combination on bacterial colonization in canine atopic dermatitis: A preliminary randomized, placebo controlled, double-blinded study. Res Vet Sci. 2018 Jun;118:164-170.
5. Data on file – Virbac.
6. FERREIRA, Tiago Cunha; CUNHA, Marina Gabriela Monteiro Carvalho Mori da; NUNES-PINHEIRO, Diana Célia Sousa. Canine atopic dermatitis: systemic immunomodulatory protocol based on clinical phenotype. Ciência Rural, v. 53, n. 8, p. e20220068, 2023.