The Elixir

PRODUCT INTRODUCTION

디엘릭서 화이트 글로우 교육자료



제품 기획의도

What's
The Elixir White Glow?

잔주름 없이 맑고 깨끗한 피부는 모두가 부러워하는
동안 얼굴의 필수 요소 입니다.
숨길 수 없는 세월의 흔적을 지우기 위해
사람들은 큰 돈을 써서 피부과를 다니고,
좋은 화장품, 좋은 영양 성분을 찾아 다닙니다.

시중에는 정말 많은 콜라겐 제품이 출시되고 있어
제대로 된 콜라겐 제품을 선택하기 어렵습니다.

디엘릭서는 이너뷰티 전문 브랜드로서
명성에 맞는 피부 건강 제품을 기획하게 되었습니다.




건강한 아름다움의 시작

☑ 이너뷰티란? (Inner Beauty)

- 피부 속, **내면에서부터 건강을 관리**하는 것!
- 식품섭취, 생활습관 개선 등을 통해 **'건강한 뷰티 라이프 스타일'** 을 가꾼다는 뜻

☑ 국내 이너뷰티 시장규모

마스크 착용 해제에 이너뷰티도 '날개', 1조 돌파한 이너뷰티시장, **성장세 지속 전망**




(단위 : 원/ 출처 : 신한금융투자 리서치센터 보고서)


COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

한국인들의 피부 고민은?

Q. 당신은 피부에 관심이 있나요?



Q. 평소 많이 하는 피부 고민은?



- 전국 만 15-59세 성인 남녀 1200명을 대상으로 '피부' 관련 설문조사를 실시한 결과, 응답자의 72.3%가 피부에 관심이 있는 편이라고 응답했습니다.
- 성별로는 남성(63.2%) 보다는 여성(81.3%)이 훨씬 많이 가지고 있었으며 연령별로는 20대의 관심이 가장 높았습니다.
- 평소 많이 하는 피부 고민을 기준으로 **보습, 미백, 주름 개선**에 특히 관심도가 높게 나타남을 확인 할 수 있었습니다.


[출처 : 마크로밀엠브레인 트렌드 모니터]

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

우리가 몰랐던 피부의 단면

피부 조직을 구성하며 고무와 같은 신축성을 가지고 진피의 80% 이상을 차지하는 콜라겐. 그리고 진피 속에서 콜라겐을 꽉 묶어주는 탄성단백질인 엘라스틴, 콜라겐과 엘라스틴으로 만들어진 골조에 수분을 채워주는 히알루론산 으로 구성됨.

피부의 구조



COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

피부밸런스를 위한 진피 3 요소

피부를 구성하는 콜라겐



진피의 약 90%를 차지하고 있는 콜라겐은
피부의 결합력을 갖게 하는
단백질 성분 입니다.

피부를 지탱하는 기둥 역할

콜라겐 지지대 엘라스틴



콜라겐을 단단하게 묶어주는 탄성 단백질인
엘라스틴은 콜라겐을 받쳐주는 지지대의
역할을 수행합니다.

콜라겐 기둥을 연결하는 스프링 역할

수분을 저장하는 히알루론산



히알루론산은 자기 무게의 1000배 이상의 수분을
저장할 수 있는 피부 속 수분 저장고 입니다.

피부 속 빈 공간을 수분으로 채움

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

피부의 기둥, "콜라겐"이란?


피부의 기둥 역할을 하는 콜라겐은
피부/ 머리카락/뼈/근육 등 인체의 주요 구성요소로
우리 몸의 단백질 중 약 30%, 피부 진피층의 약 85-90%를
구성하기 때문에 인체에 매우 중요한 역할을 합니다.

출처 : Advanced Drug Delivery Review, 2003

콜라겐의 작동 원리

우리 몸의 단백질 중 25-35% 정도를 차지하는 비중이 상당히 높은 단백질입니다.
단백질의 기본 구성 단위인 아미노산들 중 글라이신(Gly), 프롤린(Pro)의 비중이 높고,
특징적인 하이드록시프롤린(Hyp)이 구성 아미노산인 단백질 형태를 콜라겐이라고 합니다.

피부의 단면



COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

피부탄력은 진피층의 콜라겐이 결정 짓는다!

진피층은 전체 피부의 90%, 피부에 탄력이 없어지는 이유는 무엇일까? 바로 나이가 들며 콜라겐이 감소하기 때문!
평균적으로 30세 이후부터 콜라겐은 줄어들기 시작한다 섬유아세포의 콜라겐 생성능력이 퇴화하기 때문.
콜라겐 기둥이 점차 사라지니 피부가 쉽게 쳐지고 주름이 생긴다.


피부에 주름이 생기는 이유

어린피부



콜라겐, 엘라스틴,
히알루론산의 감소

노화가 진행된 피부




Information

피부를 떠받치고 있던 콜라겐 기능이
점차 사라지니 피부가 쉽게 쳐지고 주름이 생김

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

콜라겐의 섭취량과 흡수율 관계



Food Chemistry 150 (2014) 328–332

Contents lists available at ScienceDirect

Food Chemistry

journal homepage: www.elsevier.com/locate/foodchem

Dose-dependent changes in the levels of free and peptide forms of hydroxyproline in human plasma after collagen hydrolysate ingestion

Yasutaka Shigemura [a,*], Daiki Kubomura [b], Yoshio Sato [a], Kenji Sato [c]

[a] Department of Nutrition, Faculty of Domestic Science, Tokyo Kasei University, 1-18-1 Kaga, Itabashi-ku, Tokyo 173-8602, Japan
[b] Yaizu Suisankagaku Industry Co., Ltd., 11-1, Surugaku-Minamichou, Shizuoka City, Shizuoka 422-8067, Japan
[c] Division of Applied Life Sciences, Graduate School of Life and Environment Sciences, Kyoto Prefectural University, 1-5 Shimogamo, Kyoto 606-8522, Japan

ARTICLE INFO

Article history:
Received 24 October 2013
Received in revised form 27 January 2014
Accepted 18 February 2014
Available online 12 March 2014

Keywords:
Collagen
Hydroxyproline
Collagen hydrolysate
Hyp-containing peptide
Peptide absorption

ABSTRACT

The presence of hydroxyproline (Hyp)-containing peptides in human blood after collagen hydrolysate ingestion is believed to exert beneficial effects on human health. To estimate the effective beneficial dose of these peptides, we examined the relationship between ingested dose and food-derived Hyp levels in human plasma. Healthy volunteers (n = 4) ingested 30.8, 153.8 and 384.6 mg per kg body weight of collagen hydrolysate. The average plasma concentration of Hyp-containing peptides was dose-dependent, reaching maximum levels of 6.43, 20.17 and 32.84 nmol/ml following ingestion of 30.8, 153.8 and 384.6-mg doses of collagen hydrolysate, respectively. Ingesting over 153.8 mg of collagen hydrolysate significantly increased the average concentrations of the free and peptide forms of Hyp in plasma. The Hyp absorption limit was not reached with ingestion of as much as 384.6 mg of collagen hydrolysate. These finding suggest that ingestion of less than 30.8 mg of collagen hydrolysate is not effective for health benefits.

© 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction


Collagen is a major proteinaceous component of the extracellular matrix and contains a specific amino acid, hydroxyproline (Hyp). Genetically, 28 types of collagen have been identified and are classified by type and Roman numeral (Veit et al., 2011). The most abundant collagen in mammalian tissues such as the dermis, blood vessels and tendons is type I. The heat-denatured form of collagen, referred to as gelatin, is often used in foods, pharmaceuticals, photographic films and cosmetics. Gelatin is also used in folk medicine in Asia to improve blood circulation and arrest bleeding (Yao, Zhang, & Zhou, 1989). The oldest description of beneficial health effects associated with gelatin ingestion was written in 1175 by St. Hildegard, who indicated that gelatin ingestion improves joint conditions by reducing pain (Moskowitz, 2000). Other human studies have demonstrated that daily ingestion of gelatin leads to improvement of brittle nails and increases in hair diameter (Rosenberg, Oster, Kallos, & Burroughs, 1957; Scala, Hollies, & Sucher, 1976).

In order to increase the solubility of gelatin, partially hydrolysed gelatin products have been developed and are referred to as collagen hydrolysates. Ingestion of collagen hydrolysate has been shown to moderate joint pain in athletes and subjects with knee osteoarthritis, as effectively as gelatin (Clark et al., 2008; Deal & Moskowitz, 1999). Both human and animal studies have reported improvements in skin condition associated with collagen hydrolysate ingestion. Matsumoto, Ohara, Itoh, Nakamura, and Takahashi (2006) suggested that a daily ingestion of collagen hydrolysate increases the moisture content of the epidermis of women during winter. Zhuang, Hou, Zhao, Zhang, and Li (2009) and Tanaka, Koyama, and Nomura (2009) reported that collagen hydrolysate ingestion suppresses UV-induced skin damage in mice. In addition to these studies, Saito, Kiyose, Higuchi, Uchida, and Suzuki (2009) reported that levels of total lipids and triglycerides in rat plasma decrease after ingestion of collagen hydrolysate.

A number of food-derived peptides have been identified in human blood following ingestion of collagen hydrolysate, including Pro-Hyp, Pro-Hyp-Gly, Ala-Hyp, Ala-Hyp-Gly, Ser-Hyp, Ser-Hyp-Gly, Leu-Hyp, Ile-Hyp, Phe-Hyp and Hyp-Gly, of which Pro-Hyp and Hyp-Gly are the major peptides found (Iwai et al., 2005; Ohara, Matsumoto, Ito, Iwai, & Sato, 2007; Shigemura et al., 2011). A previous study involving a murine chondrocytic cell line demonstrated that Pro-Hyp inhibits mineralization of chondrocytes and modulates expression of the Runx1 and osteocalcin genes (Nakatani, Mano, Sampei, Shimizu, & Wada, 2009). Ohara, Iida, Ito, Takeuchi, and Nomura (2010) reported that Pro-Hyp stimulates hyaluronic acid production in cultured synovial cells.

* Corresponding author. Tel./fax: +81 3 3961 5629.
E-mail address: shigemura@tokyo-kasei.ac.jp (Y. Shigemura).

http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.02.091
0308-8146/© 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.



· 세계적인 식품분야 학술지인 'FOOD Chemistry'의 연구결과에 따르면1회에 약 8,000 mg 과 19,000 mg의 매우 높은 함량의 콜라겐을 섭취 했을 때 1회에 1,500 mg를 섭취 했을 때에 비해서 더욱 흡수량이 증가 하였습니다.

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

콜라겐의 구성



머리부터 발끝까지 콜라겐으로 이루어진 우리의 몸

- 콜라겐의 가장 큰 역할로 일컬어지는 것이 '세포나 조직을 연결하는 역할'.
  풀이나 접착제처럼 붙인다기 보다는 각각의 세포를 연결하는 실과 같은 역할

- 피부, 근육, 뼈, 내장 등 모든 조직에 존재하며 세포와 세포 사이를
  콜라겐 섬유로 연결하는 역할 과 세포를 지탱하는 발판 으로서의 기능도 수행

출처 : 일본 오카야마 이과 대학 어학부 기초 어학과 어학박사 하마다 히로시교수 인용

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

콜라겐이 줄어드는 원인 1.


나이가 들수록 줄어드는 콜라겐

"체내 콜라겐 양은 성인 기준 매년 1% 이상 감소하기 때문에 피부 노화를 억제하기 위해서는 보충 해주어야 할 필요가 있다고 생각된다"

(대한피부미용학회지 제7권 2호 출처)

나이에 따른 콜라겐 함량

- ✓ 콜라겐의 감소는 피부탄력 저하의 직접적인 원인
- ✓ 콜라겐은 매일매일 분해되고 손실



The influence of age and sex on skin thickness, skin collagen and density.
British Journal of Dermatology (1975) 93, 639.


· 우리 몸은 20살부터 콜라겐 합성이 1%씩 줄어들며, 40대 부터는 30% 이상으로 급속도로 떨어지면서 피부 탄력 저하가 급격하게 일어난다고 한다.

· 게다가 미세먼지, UV 자외선, 에어컨/히터로 인한 실내 건조함, 잦은 야근과 수면장애로 인한 스트레스, 피로 등으로 인해서 우리에게 촉촉한 날은 갈 수록 더 없어지고 있습니다.


COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

콜라겐이 줄어드는 원인 2.

자외선에 의한 피부손상으로 콜라겐 감소



- 자외선(UVA)는 피부의 진피층까지 깊숙이 침투해 콜라겐 분해 증가와 콜라겐 합성 감소 초래
- 콜라겐 감소는 주름 생성 및 피부 노화의 직접적 원인으로 작용



COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

기존 콜라겐 제품의 효과성 의문

Q 먹는 콜라겐은 효과가 없다?

A


콜라겐은 새끼줄처럼 매우 단단하게 꼬인 상태로 존재합니다.
때문에 소화효소가 결합하고 작용하기 힘들어,
음식으로 섭취한 콜라겐과 가수분해 등의 가공이 되지 않은
커다란 콜라겐은 대부분 소화되지 않고 배출 됩니다.

또한 피부를 위해 필요한 콜라겐 형태는 타입1 콜라겐 입니다.
다른 타입의 콜라겐은 다른 곳에 도움을 주었을 수 있지만
피부에 영향을 주기는 힘듭니다.
즉, **섭취한 콜라겐이 원하는 효능을 갖기 위해서는**
흡수 장애를 이겨낼 수 있을 만큼 작거나 고함량을 복용하거나,
효능에 맞는 콜라겐이 체내에서 흡수되고 사용될 수 있도록
도와줄 원료가 필요합니다.



콜라겐 제품의

올바른 선택기준




선택기준 1. 콜라겐의 분자 크기

우리가 섭취하는 콜라겐은 단백질의 일종으로
새끼줄처럼 매우 단단하게 꼬인 상태로 존재합니다.
때문에 소화효소가 결합하고 작용하기 힘들어
음식으로 섭취한 콜라겐은 대부분 소화되지 않고 배출됩니다.

분자 크기가 작을수록 흡수율은 높아집니다!

[Reference]



5000 달톤인 콜라겐 분자에 비해 300 달톤 저분자 그래프는
분자 크기가 흡수율에 미치는 영향을 콜라겐은 흡수율이
거의 200배까지 증가하는 것을 볼 수 있습니다.

*달톤(Da)이란? 콜라겐제품들의분자크기를따질때나타내는단위


COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

선택기준 2. 콜라겐의 함량

우리가 섭취하는 콜라겐은 단백질의 일종으로
새끼줄처럼 매우 단단하게 꼬인 상태로 존재합니다.
때문에 소화효소가 결합하고 작용하기 힘들어

음식으로 섭취한 콜라겐은 대부분
소화되지 않고 배출됩니다.

[Reference]



콜라겐의 효능을 검증한 논문들은 대부분 1일 2.5g~10g 함량의 콜라겐을 섭취했습니다. 각종 연구를 통해 제시된 하루 최대 섭취량은 20g 정도 이기에 각자 자신에게 적합하게 용량 조절이 필요합니다.


COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

선택기준 3. 콜라겐의 타입

피부와 골격근계 효능을 위해 콜라겐을 섭취할 경우
타입1 콜라겐이 풍부한 콜라겐 제품을 섭취하는 것이 좋습니다.
제품을 살필 때 콜라겐 타입에 대한 정보까지는 얻기 힘들기 때문에
어디서 추출한 콜라겐인지 살피는 것이 도움이 됩니다.

동물성 원료 보다는 어류에서 추출한
콜라겐은 타입1 콜라겐 입니다.

[Reference]



polymers

MDPI

Review

Fish Collagen: Extraction, Characterization, and Applications for Biomaterials Engineering

Hafez Jafari [1,*], Alberto Lista [2], Manuela Mafosso Siekapen [3], Pejman Ghaffari-Bohlouli [4], Lei Nie [5,*], Houman Alimoradi [6] and Amin Shavandi [1,*]

2.1.2. Fish Scale

Fish scales constitute a considerable amount of waste from the fish processing industries. Recent studies [46–48] suggested that collagen obtained from fish scales possess properties typical of type I collagen consisting of two α1 chains and one α2 chain. A study on collagen from the scales of tilapia (*Oreochromis* sp.) showed a high denaturation temperature (57.9–79.0 °C) that was possibly due to its high amino acid content and higher intra/interchain bonds (hydrogen bonds, dipole–dipole


"최근의 연구는 생선 비늘에서 얻은 콜라겐이 타입1 콜라겐의 특성인
두개의 알파1체인과 알파2체인으로 구성되어 있다고 말한다"

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

선택기준 4. 시너지 원료

비타민C는 체내에서 콜라겐이 합성될 때 보조효소 역할을 하며 필수적으로 사용됩니다. 아미노산, 히드록시프롤린(Hyp)가 비타민C의 도움으로 생성되기 때문에 반드시 콜라겐과 함께 섭취해야 하는 성분이라고 할 수 있습니다.

[Reference]



▶콜라겐이 합성될 때 반드시 필요한 비타민 C

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

디엘릭서 화이트 글로우
제품소개





디엘릭서 화이트 글로우 제품특징



01 주름+미백+보습 all-in-one 케어!

02 초저분자 & 초고함량 콜라겐 배합

03 화이트토마토추출물로 시너지 효과

04 글루타치온, 엘라스틴, 비타민C, 비오틴 함유

05 유기농 파이토 뉴트리언트 함유

섭취방법 | 1포를 물 150ml 에 타서 섭취하십시오.
회원가격 | 39,000원(15.6 BV)

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

GCOOP

Chapter 01

주름+미백+보습 all-in-one 케어!



주름·탄력

피부의 기둥 역할



미백개선

먹는 자외선차단제



보습개선


피부 속 수분 잠금

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

Chapter 02 초저분자, 초고함량 콜라겐 함유

☑ 300 달톤의 저분자 콜라겐이 1포에 4,000 mg 함유

일반 콜라겐
(동물성)



300,000 달톤

흡수율 2%

저분자콜라겐
(어린)



300 달톤

흡수율 84%

동물성 콜라겐에 비해 어린 콜라겐은 흡수율이 약 42배 정도 우수합니다.
어린 콜라겐은 분자가 작기 때문에 체내 흡수율이 높다는 장점이 있습니다.

[제품 내 함유된 콜라겐 분자 크기 분석결과]



GBSA 경기도경제과학진흥원

분석 결과서

시 료 명	Marine collagen_RBE009	의 뢰 처	제너럴바이오
의뢰일자	2022. 05. 27.	의 뢰 자	송원주
의뢰항목	MALDI-TOF 분석	시험용도	분자량 확인


	시 료	시험항목	Matrix	시험결과
1	Marine collagen_RBE009	분자량확인	CHCA	Spectrum 참조

* matrix peak 제외 가중평균 분자량 : 308.6 Da

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

Chapter 02 초저분자, 고함량 콜라겐 함유

☑ 300 달톤의 저분자 콜라겐이 1포에 4,000 mg 함유



Food Chemistry
Volume 159, 15 September 2014, Pages 328-332

Dose-dependent changes in the levels of free and peptide forms of hydroxyproline in human plasma after collagen hydrolysate ingestion

Yasutaka Shigemura, Daiki Kubomura, Yoshio Sato, Kenji Sato

Show more


Add to Mendeley Share Cite

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.02.091 Get rights and content

Abstract

The presence of hydroxyproline (Hyp)-containing peptides in human blood after collagen hydrolysate ingestion is believed to exert beneficial effects on human health. To estimate the effective beneficial dose of these peptides, we examined the relationship between ingested dose and food-derived Hyp levels in human plasma. Healthy volunteers (n=4) ingested 30.8, 153.8 and 384.6mg per kg body weight of collagen hydrolysate. The average plasma concentration of Hyp-containing peptides was dose-dependent, reaching maximum levels of 6.43, 20.17 and 32.84nmol/ml following ingestion of 30.8, 153.8 and 384.6-mg doses of collagen hydrolysate, respectively. Ingesting over 153.8mg of collagen hydrolysate significantly increased the average concentrations of the free and peptide forms of Hyp in plasma. The Hyp absorption limit was not reached with ingestion of as much as 384.6mg of collagen hydrolysate. These finding suggest that ingestion of less than 30.8mg of collagen hydrolysate is not effective for health benefits.

콜라겐의 흡수율은 섭취량에 비례하게 증가하여
고함량 콜라겐 섭취 시, 피부와 신체 곳곳에 필요한 양을
충분히 흡수시켜 줍니다



실제로 함량과 흡수율을 분석한 논문에 따르면,
하루 1500mg의 적은 함량을 섭취한 후 관찰 결과,
혈중 농도에 유의미한 변화가 나타나지 않았습니다.

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.


Chapter 03

유기농 화이트 토마토 함유

피부톤 개선 · 미백 효과에 탁월한 원료 함유

화이트 토마토란?

- 일반적인 토마토와 달리 흰색은 띠고 있는 토마토
- 무색 카로티노이드 피토엔&피토플루엔* 풍부
- 기미와 주근깨의 멜라닌을 감소시킴
- 해외가 주목하고 있는 이너뷰티 신소재



피토엔&피토플루엔 이란?

화이트 토마토에 풍부하다고 알려진 무색 카로티노이드. 일반토마토에 400배 효과!

카로티노이드 중에서도 희귀한 성분, 자외선으로 인해 생성 되는 유해산소로부터 식물 스스로를 보호

피토엔 : 자외선B 차단 / 피토플루엔 : 자외선 A차단

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

Chapter 04

다양한 피부 시너지 원료 함유

-글루타치온, 히알루론산, 엘라스틴, 비타민C, 비오틴 등


시너지1. 글루타치온

글루타치온 이란?

글루타치온은 간에서 만들어지는 3개의 아미노산이 결합된 아미노산 화합물로 생체 산화-화원 반응에 중요한 역할을 하는 항산화 물질

글루타치온과 피부

- 노화의 주범인 산화반응을 막고 세포를 보호하는 글루타치온은 나이가들며 점점 감소합니다.
- 2018년 연구결과, 글루타치온 경구복용은 피험자에서 피부색이 밝아지는 결과를 보였다.



Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology — Dovepress

ORIGINAL RESEARCH

Glutathione and its antiaging and antimelanogenic effects

This article was published in the following Dove Press journal:
Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology
27 April 2017
Number of times this article has been viewed

Sinee Weschawalit[1]
Siriwan Thongthip[2]
Phanupong Phutrakool[3]
Pravit Asawanonda[1]

[1]Department of Medicine, Division


Background: Previous studies showed that supplementation of reduced form of glutathione (GSH, 500 mg/d) has a skin-lightening efficacy in humans. This study was designed to evaluate the influences of both GSH and oxidized form (GSSG), at doses lower than 500 mg/d, on improving skin properties.

Patients and methods: A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel, three-arm study was conducted. Healthy female subjects were equally randomized into three groups [illegible] orally for 12 weeks. At each visit at [illegible] were collected for safety monitoring. [illegible] melanin index and ultraviolet spots of [illegible] GSSG tended to be lower than placebo. [illegible] showed a significant reduction in wrinkles [illegible] increased skin elasticity was observed [illegible] no serious adverse effects throughout

effectively influences skin properties. Overall, glutathione in both forms are well tolerated.

Keywords: glutathione, melanin, pigment, aging, wrinkle, whitening

※ [피부색] 출처 :
Fanelli S et al.(2018)
Oral Administration of S-acetyl-glutathione:
Impact on the Levels of Glutathione in
Plasma and in Erythrocytes of Healthy Volunteers



※출처 : Synergistic effect of collagen peptide and elastin peptide derived from salmon on promoting hyaluronic acid production and cell growth of normal human dermal fibroblast cells (SF-TY). NIPPON SUISAN GAKKAISHI, 75(1), 86-88


COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

Chapter 04

다양한 피부 시너지 원료 함유


- 글루타치온, 히알루론산, 엘라스틴, 비타민C, 비오틴 등

시너지2. 히알루론산



히알루론산은 자기 무게 1,000배 이상의 수분을
끌어당길 수 있어 피부 속 수분 저장고 라고 부르기도 합니다.
이렇게 보습효과가 뛰어나기 때문에 스킨케어 제품에
자주 사용됩니다.

시너지3. 엘라스틴



진피의 3대 구성요소 중 하나로
피부의 콜라겐을 지탱하는 신축성 있는 탄성 단백질

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

Chapter 04

다양한 피부 시너지 원료 함유


-글루타치온, 히알루론산, 엘라스틴, 비타민C, 비오틴 등

시너지3. 비타민 C



비타민C가 부족하면 콜라겐을 합성하는데 문제가 생깁니다.
비타민C는 콜라겐 생성에 보조 효소로 작용 하기 때문에 콜라겐 제
품과 함께 섭취하시는 것이 중요합니다.
항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하고
체내 결합조직 형성과 기능 유지에 필요한 필수 영양소 입니다.

시너지4. 비오틴



지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필수적인 비타민으로
단백질을 주 구성성분으로 하는 영양소
'지방, 탄수화물, 단백질대사에 필요'로 식약처에서 인정받은
기능성 성분

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

Chapter 05

유기농 파이토 뉴트리언트 함유

디엘릭서 화이트 글로우 1포에 담긴 유기농 야채 10종을 확인하세요!





















피부에 이로운 역할을 하는 파이토 케미컬을 엄선하여 안전하고 건강하게 담았습니다.

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

이런 분들에게 추천합니다!

- 믿을 수 있는 이너뷰티 제품을 구매하고 싶은 분.
- 민 낯 자신감을 키우고 싶은 분
- 빛나는 광채 피부를 원하시는 분
- 자외선에 의한 피부 손상이 고민이신 분
- 하루 1포로 간편한 피부관리를 원하시는 분
- 항산화 관리가 필요하신 분

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

The Elixir

- 내가 찾는 진정한 아름다움 -

비움



가벼운 몸을 위한 시작

채움



최적의 건강을 위한 영양

new 이너뷰티 (피부)



속부터 채워지는 피부 자신감

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

GCOOP

GCOOP

본 자료는 광고/홍보 목적인 아닌 회원을 위한 내부 교육용 자료입니다.

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.