내부교육용

디엘릭서 브라운 효소
교육자료



Important Notice

GCOOP은 모든 회원 분이 과대 광고로 인하여, 피해가 가지 않도록 건전한 광고 문화에 힘쓰고 있습니다.
건강기능식품 과대광고에 관한 법률을 참고 하시어 허위 과대광고로 이어지지 않도록 많은 협조 부탁드립니다.

본 자료는 내부 교육을 위한 자료로 외부 반출 및 별도 게시를 할 수 없습니다.

건강기능식품 과대광고에 관한 법률

01. 질병의 예방·치료에 효능이 있는 것으로 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고
02. 식품 등을 의약품으로 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고
03. 건강기능식품이 아닌 것을 건강기능식품으로 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고
04. 거짓·과장된 표시 또는 광고
05. 소비자를 기만하는 표시 또는 광고
06. 다른 업체나 다른 업체의 제품을 비방하는 표시 또는 광고
07. 객관적인 근거 없이 자기 또는 자기의 식품 등을 다른 영업자나 다른 영업자의 식품 등과 부당하게 비교하는 표시 또는 광고
08. 사행심을 조장하거나 음란한 표현을 사용하여 공중도덕이나 사회윤리를 현저하게 침해하는 표시 또는 광고
09. 영업자 준수 사항 (제조시설, 유통기한, 부패 사행성 조장) 위반하여 표시 또는 광고

발췌] 식품 등의 표시 · 광고에 관한 법률(약칭 : 식품표시광고법) [시행 2020. 4. 7] [법률 제 17246호, 2020. 4. 7 일부 개정)
식품 등의 표시 · 광고에 관한 법률 시행 규칙 [시행 2019. 4. 25] [총리 령 제 1535호, 2019. 4. 25 일부 개정)

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.


내부교육용

효소 관련 건강정보



효소란? Enzyme

흔히 섭취한 음식이 곧바로 몸에 흡수되는 것으로 생각하지만 아쉽게도 우리 몸에는 그러한 능력이 없어서
모든 음식들을 중간에서 흡수 가능한 영양분으로 변화하는 과정을 거쳐야 한다. 이렇게 중간에서 변화시키는 역할을 효소가 담당



음식물 → 효소 → 영양소 흡수 → 정상적인 대사작용

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved

효소의 종류

잠재효소

Digestive Enzyme
소화효소

먹은 음식을 영양소로 분해하여
체내에서 흡수 가능한 형태로
만들어주는 효소
탄수화물, 단백질, 지방 등 분해

Metabolic Enzyme
대사효소

세포 안에서 일어나는
에너지 생산, 해독, 항산화, 면역,
그리고 세포 유지, 회복을 돕는 효소.
세포 안에서 일어나는 각종
대사 과정에 관여 하는 효소들



건강한 사람의 효소 비율



건강하지 못한 사람의 효소 비율


소화 효소를 많이 사용할 경우 대사 효소의 양은 줄어 들 수 밖에 없음

외부로 부터 효소를 채워 몸 속 효소들이 대사작용에 집중할 수 있도록 하는 것이 중요

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved

소화 효소의 종류

✓ 소화효소는 소화기관의 다양한 부위에서 생성되며 각각의 효소는 특정한 종류의 음식 성분을 분해



☑ 주로 입에서 나오는 침이 **탄수화물**을 분해



☑ 주로 위에서 작용하여 **단백질**을 분해




☑ 주로 소장에서 작용하여 **지방**을 분해

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved

대사 효소의 역할과 중요성

- 음식이 영양소로 분해된 후, 영양소를 각 기관, 세포에 전달하고 활용하게 하는 역할을 담당
- 대사효소가 부족하면 영양소의 이동, 흡수가 원활하지 않음
- 좋은 음식을 먹어도 영양소가 제대로 활용되지 않아 영양결핍 발생 가능
- 그 결과 **에너지 부족, 기력 저하, 피로감 증가 등의** 증상으로 이어짐
- 소화효소가 부족하면 대사효소가 소화 기능까지 대신하게 되어 결국 **대사효소 본연의 대사 기능이 저하되고 대사장애, 면역 저하 등의 문제가 발생 할 수 있음**

[대사효소의 기능]




COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved

에드워드 하웰 (Dr. Howell) 의 한정적 효소 이론

'평생 몸에서 만들어지는 효소의 양은 한정적'





* 에드워드 하웰 :
세계적인 효소영양학자. 50년간 효소를 연구해
1985년 출간한 효소영양학 개론은 효소 연구의 기초가 됨

- 인간이 평생 만들어 낼 수 있는 '잠재 효소량'이 정해져 있다고 봄
  잘못된 식습관과 생활습관은 이 **잠재 효소를 지나치게 소모해 건강 수명을 단축시킨다고 주장**
- 평균적인 현대인은 평생 효소의 80%를 소화에, 20%만을 대사에 쓴다고 하였으며
- **소화 효소 사용을 줄이면 그만큼 대사 효소 활용도가 높아져 건강과 장수에 도움이 된다고 설명**
  반대로 소화효소를 많이 사용하면 대사효소로 돌아가는 양이 적어지기 때문에 질병치료가 어려움

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved

효소와 현대인

점점 고갈되어가는 생명 에너지


바쁘고 불규칙한 생활 속,
우리의 몸은 점점 더 많은 효소를 필요로 합니다.
하지만 채소와 과일의 섭취는 줄고
육류, 가공식품 중심의 식습관이 효소 섭취를 방해합니다.

인스턴트 식품, 과음, 과식으로 인해
체내 효소는 빠르게 소모되고 있습니다.



COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved

나이가 들수록 감소하는 체내 효소



* 출처 :효소영양학개론 Food enzymes for health & longevity (2003)

소화 효소는 우리 몸 속에서 합성되지만 시간이 흐를수록, 나이가 들수록
우리 몸 안의 소화 효소 보유량이 줄어듭니다.
70-80대의 경우 30배 이상 급격하게 감소

효소 부족 체크 리스트

- ☐ 소화가 잘 안되고 하루 종일 속이 더부룩 하다
- ☐ 식후 유난히 졸리고 무력감을 느낀다
- ☐ 대변이나 소변에서 악취가 심하다
- ☐ 변비가 심하다
- ☐ 만성피로가 지속되고 있다
- ☐ 예전에 비해 숙취가 심해졌다


*** 이 중 하나라도 해당된다면? '효소부족'**

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved

효소 섭취 왜 중요할까?

효소는 체내 대사 활동에 작용하는 단백질 촉매제


체내 효소가 부족한 경우



효소 작용 저하

섭취한 영양성분의 분해가
완전하게 이루어지지 않음

체내 효소가 충분한 경우




효소 작용 원활

섭취한 영양성분의 분해가
완전하게 이루어짐

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved

탄수화물 섭취 비중이 높은 한국 식단

[한국인의 영양소 별 1일 섭취량]



* 출처 :2012 국민건강 영양 통계, 질병 관리 본부

한국인의 하루 열량 중 약 65%는 탄수화물로 구성되어 있습니다.
주식이 '밥' 이기 때문에 전분 섭취량이 높으며
쌀, 밀, 감자 등 전분질 식품은 소화 효소의 도움 없이는 포도당 단위로 분해되어
흡수될 수 없습니다.

게다가 한국인의 식습관에는 다음과 같은 이유로
체내 효소의 소모가 많고, 효소 보충이 필요합니다.

- 다양한 반찬 구성에도 불구하고 조리 과정의 가열로 효소가 대부분 파괴됨
- 생채소와 과일 섭취 비율이 낮아 외부 효소 공급이 부족함
- 빠른 식사 속도, 과식, 잦은 야식으로 소화 부담이 큼

결국 효소를 보충하는 식습관이 현대인의 건강 관리에 필수적 !

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved

효소의 역할

■ 효소는 소화는 물론 몸 전체의 대사 흐름을 움직이는 핵심 작용을 담당

효소의 기능

소화 흡수 작용
음식물을 분해시켜
에너지원으로 만들어 줍니다.

분해 배출 작용
소화되고 남은 물질이 쉽게
배출될 수 있도록 도와줍니다.

해독 살균 작용
내 몸에 침입한 미생물이나 바이러스를 죽이고
독소 물질을 분해하여 새로운 세포를 보호

항염·항균 작용
감염이나 염증 작용을 억제해
세포를 보호합니다.

혈액 정화 작용
혈액 속 독소를 해독하고 불필요한
콜레스테롤, 과다한 혈당을 분해합니다.

세포 재생 작용
생명이 다한 세포를 사멸 시키고
새로운 세포를 생성합니다.

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved

Digestive Enzyme Deficiency Symptoms

효소 결핍 관련 증상

✔ 소화 뿐만 아니라 염증, 면역, 혈관, 정신 관련 문제까지 발생

아밀라아제 결핍

- 피부발진
- 알레르기
- 안면홍조
- 저혈당
- 월경전증후군
- 혈액순환장애

프로테아제 결핍

- 만성피로 / 무기력함
- 변비
- 곰팡이 / 감염

리파아제결핍

- 여드름
- 담낭(담도 질환)
- 방광 문제

복합적 결핍

- 만성피로 / 우울증
- 만성 알레르기
- 만성 변비

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved

효소 부족과 질병



소화 기능 장애 | 대사기능 장애 | 면역력 저하 | 기억력 감퇴 | 만성피로

☑ 사람에 따라 신체 내 효소가 부족하면 소화나 대사 기능에 장애가 생길 수 있음. 영양소 분해와 흡수 등 소화 기능에 장애가 발생할 수 있고, 체내에 독소가 쌓이거나 면역력과 저항력 등이 저하되어 각종 질병에 노출되기 쉬움. 기억력, 만성피로 등의 증상 또한 발생 가능

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved


소화의 핵심 단계

소화 기능 저하는 전신 균형에 위험

소화의 핵심 과정	살균 →	분해 →	흡수
역할 및 기능	음식 속 세균을 감소시키고 단백질 구조를 풀어 분해를 준비	탄수화물, 단백질, 지방을 흡수 가능한 영양소 형태로 쪼개는 과정	분해된 영양소를 혈관, 림프관으로 전달하는 핵심 대사 단계
문제점	・가스 증가(발효 촉진) ・장내 독소 부담 증가 ・염증 증가	・ 음식물 정체 ・식후 더부룩함, 체중 증가 (부종/정체감) ・ 에너지 생성 효율 증가 ・분해가 제대로 안되면 먹었는데 피곤한 상태	・변비/설사 등 배출 이상 ・장내 세균 불균형 ・면역력 저하

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved

소화 과정과 효소



소화기관	작용 효소	효소 부족 시
입(침샘)	탄수화물 분해 시작 아밀라아제(Amylase)가 전분을 작은 당으로 분해	탄수화물 분해 지연 위에서 부담 증가 식사 후 더부룩함, 트림 증가
위	단백질 분해 시작 위산과 펩신(Pepsin)이 단백질을 작은 사슬로 끊어주는 역할	단백질이 거의 분해되지 않은 상태로 소장으로 내려 감 장에서 발효 되면서 가스, 복부팽만 아미노산 흡수 부족으로 체력저하, 회복력 감소 동물성 단백질 섭취 후 특히 불편함 증가
췌장	**아밀라아제, 리파아제, 프로테아제 분비** **3대 소화 효소 본격적인 소화 시작	모든 영양소 소화 효율 저하 더부룩함, 속 답답함, 가스, 지방 등의 문제 발생 장기적으로 체력, 피로, 면역에 영향
소장	락타아제, 말타아제, 펩티다아제	유당불내증 탄수화물 발효 → 가스, 복부 팽만 영양소가 완전히 분해되지 않아 흡수율 감소

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved

효소의 섭취 시기

위에서 음식이 머무는 시간



- 탄수화물 위주의 식사 : 약 20-40분
- 단백질 위주의 식사 : 약 1-2시간
- 지방 위주의 식사 : 약 3시간
- 혼합식(일반 한식) 약 2-4시간

위에서의 소화 기능

- 음식을 섭취하면 그대로 소장으로 보내지 않고 위에서 잠시 저장
- 위산과 펩신에 의해 음식을 잘게 부수고 소장으로 내려 보내는 역할
  단 이때 췌장 효소는 전혀 도움을 받지 못하는 상태
  (췌장 효소는 PH 7에서 가장 잘 작동 하지만 위는 PH 1.5-3)
- 이 단계에서 외부 효소의 도움으로 위산과 펩신 분비량이 감소,
  위의 근육 운동 스트레스 저하

▶ 음식은 먼저 위에 머무르며, 췌장 효소가 본격적으로 작용하기 전에 효소의 도움을 거의 받지 못하는 시간이 존재함

위에서 부터 소화를 돕기 위해 식전 섭취를 권장

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved

내부교육용

디엘릭서 브라운 효소
제품소개



내부교육용

효소 섭취의 새로운 루틴!

식전 효소 섭취의 장점



효소는 매개체(기질)가
있을 때 가장 잘 작용



위에서 부담 저하로
인한 부작용 감소



음식물 체류 시간 감소로
소화 부담 ↓



체내 영양소 흡수
과정 강화

내부교육용

식전 한 포로 가볍게

디엘릭서 브라운 효소



- 자연발효 효소 그대로의 고역가 배합
- 탄수화물 / 단백질 / 지방 분해를 1포로
- 혈당 상승 완화 원료 함유
- 소화에 도움을 주는 원료 배합

나만의 식전 효소 루틴!
매일 식사 전 한 포, 식후까지 편안하게!

Point 1 자연발효 효소 그대로의 고역가 배합

[1포 당 효소 역가 수치]



탄수화물 분해효소

α-아밀라아제

1,000,000 unit/1포 당



단백질 분해효소

프로테아제

5,000 unit/1 포당

✓ **역가수치 :** 효소의 함량과 활성도를 나타내는 수치.

효소 식품은 효소 활성도가 얼마나 높은지, 역가 안정성이 보장되는지를 확인하는 것이 중요합니다.

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved

Point1

Point 1

자연발효 효소 그대로의 고역가 배합

최소 100만 unit, 실제 검사 결과 300만 unit 이상

참고용 시험성적서

1g당 (1포 = 3g)	α-아밀라아제	프로테아제
보장 역가	1포 = 3,000,000 unit	1포 = 5,000 unit
검사결과	1포 = 3,000,000 unit	1포 = 1,400,000 unit

* 분석 기관 : 한국기능식품연구원
* 성적서 발급일 : 25.10.23

☑ 정제효소를 첨가하지 않은, 자연 발효 그대로의 곡류 및 과채 발효 효소로 완성

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved

Point 2

탄수화물, 단백질, 지방까지 분해하는 3중 효소

탄수화물, 단백질 뿐만 아니라 지방까지 분해하는 리파아제 함유!

탄수화물 분해 효소



포도당

단백질 분해 효소



아미노산

지방 분해 효소



지방산

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved

Point 3

혈당 상승 완화를 위한 원료 함유

여주, 돼지감자, 바나바잎 조합으로 당 변화에 민감한 분들을 위한 배합



여주

전통적으로 식후 균형 유지에
활용된 식물



돼지감자

이눌린 식이섬유가 풍부해 당 흡수
속도와 식후 부담을 낮추는데 도움



바나바잎

식물성 컴파운드가 당 대사 흐름을
부드럽게 하는 데 사용된 잎

(*원료적 설명에 한함)

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved

Point 4

소화를 돕는 자연 유래 원료 배합

자연에서 찾은 소화의 지혜,

예로부터 소화와 기력 회복에 사용 되어온 진피, 매실, 감초를 정성스럽게 배합했습니다.



진피

플라보노이드 성분을 포함해
위장 운동과 소화 리듬 개선



매실

유기산이 풍부해
소화 분비 촉진과 식후 불편감 완화



감초

글리시리진 등 성분이 위점막
보호와 소화 환경 안정화

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved

Point 5 고급스럽고 깊은 맛



발효 원료 고유 풍미를 살린 배합으로 자극적 요소를
최소화 하고 깊은 맛을 구현 했습니다.
과한 향이나 단맛 없이, 발효 본연의 부드럽고 깔끔한 맛을
느낄 수 있습니다.

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved

CHECK POINT!

01. 식사 후 더부룩함 이나 부담감을 자주 느끼시는 분
02. 밀가루, 단백질 식단이 많아 소화 리듬이 흐트러지기 쉬운 분
03. 외식, 불규칙한 식사 패턴이 잦은 분
04. 평소 편안한 소화를 원하시는 분
05. 가벼운 식후 컨디션 관리를 원하시는 분
06. 식사 시 혈당 상승에 대한 우려가 있으신 분
07. 탄수화물, 단백질, 지방의 균형 케어가 가능한 효소가 필요하신 분
08. 효소 제품 중 고역가 제품을 찾으시는 분

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved