

一 .客观题: 1-3 小题为判断题, 在对的后面括号中填 “√”, 错的后面括号中填“×”,

4-8 为单选题, 将正确选项前的字母填在括号中. (每小题 2 分, 共 16 分)。

1. × 2. √ 3. ×
4. C 5. D 6. B 7. C 8. B

二、行列式计算 (第 1 小题 6 分, 第 2 小题 8 分, 共 14 分)

1. 计算行列式
$$\begin{vmatrix} x+a & b & c & d \\ a & x+b & c & d \\ a & b & x+c & d \\ a & b & c & x+d \end{vmatrix}.$$

解: (方法一)

$$\begin{vmatrix} x+a & b & c & d \\ a & x+b & c & d \\ a & b & x+c & d \\ a & b & c & x+d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+a+b+c+d & b & c & d \\ x+a+b+c+d & x+b & c & d \\ x+a+b+c+d & b & x+c & d \\ x+a+b+c+d & b & c & x+d \end{vmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

$$= (x+a+b+c+d) \begin{vmatrix} 1 & b & c & d \\ 1 & x+b & c & d \\ 1 & b & x+c & d \\ 1 & b & c & x+d \end{vmatrix}$$

$$= (x+a+b+c+d) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & x & 0 & 0 \\ 1 & 0 & x & 0 \\ 1 & 0 & 0 & x \end{vmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

$$= x^3 (x+a+b+c+d) \quad (2 \text{ 分})$$

解: (方法二)

$$\begin{vmatrix} x+a & b & c & d \\ a & x+b & c & d \\ a & b & x+c & d \\ a & b & c & x+d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & x+a & b & c & d \\ 1 & a & x+b & c & d \\ 1 & a & b & x+c & d \\ 1 & a & b & c & x+d \end{vmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -a & -b & -c & -d \\ 1 & x & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & x & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & x & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+\frac{a}{x}+\frac{b}{x}+\frac{c}{x}+\frac{d}{x} & -a & -b & -c & -d \\ 0 & x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x \end{vmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \left(1 + \frac{a}{x} + \frac{b}{x} + \frac{c}{x} + \frac{d}{x}\right) x^4 = x^3 (x+a+b+c+d) \quad (1 \text{ 分})$$

此处要求 $x \neq 0$ ，但当 $x=0$ 时，原行列式显然等于 0，与 $x^3(x+a+b+c+d)$ 结果一致。

(1 分)

2. 解：(方法一)

$$|D_n| = \begin{vmatrix} 1 & x & x & \dots & x & x \\ 1 & 1 & x & \dots & x & x \\ 1 & 1 & 1 & \dots & x & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & x \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x & x & \dots & x & x \\ 0 & 1-x & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-x & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1-x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1-x \end{vmatrix} \quad (6 \text{ 分})$$

$$= 1 \cdot (1-x)^{n-1} = (1-x)^{n-1} \quad (2 \text{ 分})$$

解：(方法二)

$$|D_n| = \begin{vmatrix} 1 & x & x & \dots & x & x \\ 1 & 1 & x & \dots & x & x \\ 1 & 1 & 1 & \dots & x & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & x \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-x & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1-x & 1-x & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1-x & 1-x & 1-x & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1-x & 1-x & 1-x & \dots & 1-x & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad (6 \text{ 分})$$

$$= (1-x)^{n-1} \cdot 1 = (1-x)^{n-1} \quad (2 \text{ 分})$$

三、已知 $A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, 求 A^{-1} 和 AB

解：令 $A = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}$, 其中 $A_1 = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $A_2 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ (2 分)

则 $A^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & 0 \\ 0 & A_2^{-1} \end{bmatrix}$, $A_1^{-1} = \frac{A_1^*}{|A_1|} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$, $A_2^{-1} = \frac{A_2^*}{|A_2|} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$ (3 分)

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & 0 \\ 0 & A_2^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad (1 \text{ 分})$$

$$AB = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 2 & -1 \\ 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

四、解：方程组的增广矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & \mu \end{pmatrix}$ (2 分)

对 A 作初等行变换，化成阶梯形矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & \mu \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & \lambda-4 & \mu+2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda-5 & \mu+3 \end{pmatrix} \quad (3 \text{ 分})$$

因此当 $\lambda \neq 5$ 时，方程组的系数矩阵的秩和增广矩阵的秩都等于 3，且等于方程组未知数个数，方程组有唯一解；当 $\lambda = 5$ 且 $\mu = -3$ 时，方程组的系数矩阵的秩和增广矩阵的秩都等于 2，小于未知数的个数，方程组有无穷多组解；当 $\lambda = 5$ 且 $\mu \neq -3$ 时，方程组系数矩阵的秩为 2，增广矩阵的秩为 3，方程组无解。 (3 分)

当 $\lambda \neq 5$ 时，继续对增广矩阵作初等行变换

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{\mu+3}{\lambda-5} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1-2\frac{\mu+3}{\lambda-5} \\ 0 & 1 & 0 & 1+\frac{\mu+3}{\lambda-5} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{\mu+3}{\lambda-5} \end{pmatrix}$$

方程组解为 $\begin{cases} x_1 = -1-2\frac{\mu+3}{\lambda-5} \\ x_2 = 1+\frac{\mu+3}{\lambda-5} \\ x_3 = \frac{\mu+3}{\lambda-5} \end{cases}$ (2 分)

当 $\lambda = 5$ 且 $\mu = -3$ 时，方程组化为 $\begin{cases} x_1 + 2x_3 = -1 \\ x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$ (1 分)

取 x_3 为自由未知量， $x_3 = \tilde{x}_3$ ，得

$$\begin{cases} x_1 = -1-2\tilde{x}_3 \\ x_2 = 1+\tilde{x}_3 \\ x_3 = \tilde{x}_3 \end{cases}, \text{ 写成向量形式: } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \tilde{x}_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

其中 \tilde{x}_3 取任意实数。 (1 分)

五、解：

(1) 解法 1:

取基 $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, (1 分)

则从基 $[e_1, e_2, e_3]$ 到 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 的过渡矩阵为 $T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ (1 分)

从基 $[e_1, e_2, e_3]$ 到 $[\beta_1, \beta_2, \beta_3]$ 的过渡矩阵为 $S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (1 分)

所以从基 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 到 $[\beta_1, \beta_2, \beta_3]$ 的过渡矩阵为

$$M = T^{-1}S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad (3 \text{ 分})$$

另解法 2:

也可直接由

$$\beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + a_{31}\alpha_3$$

$$\beta_2 = a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + a_{32}\alpha_3$$

$$\beta_3 = a_{13}\alpha_1 + a_{23}\alpha_2 + a_{33}\alpha_3$$

解出 a_{ij} , 进而得到 $M = (a_{ij})$, 最终结果同解法 1

(若思路正确, 但 M 计算有误, 扣 3 分; M 写成 M^T 扣 3 分)

(2) 解法 1:

$\alpha = \beta_1 + \beta_2$ 在基 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 下的坐标为 M 的前两列之和, 即为 $\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ (3 分)

解法 2:

也可直接求 $\alpha = \beta_1 + \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$ 求出 $k_1 = 4, k_2 = 3, k_3 = -1$,

从而 α 在基 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 下的坐标为 $\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ (3 分)

解法 3:

$\alpha = \beta_1 + \beta_2$ 在基 $[\beta_1, \beta_2, \beta_3]$ 的坐标为 $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 从而 α 在基 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 下的坐标为

$$Y = MX = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

六、二次型矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ (1 分)

求出特征根为 1 (二重), 4 (一重) (2 分)

获得特征根 1 的特征向量 $x_1=(-1,1,0), x_2=(-1,0,1)$

特征根 4 的特征向量 $x_3=(1,1,1)$ (2 分)

对特征根 1 的特征向量正交化 $a_1=(-1,1,0)$, $a_2=(-1/2,-1/2,1)$,
对特征根 4 的特征向量正交化 (无需显式进行) (2 分)

对上述正交向量组单位化

$b_1=(-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0)$, $b_2=(-1/\sqrt{6}, -1/\sqrt{6}, 2/\sqrt{6})$, $b_3=(1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3})$ (2 分)

故正交矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \quad (X=PY) \quad (2 \text{ 分})$$

所得标准形为 $f = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2$ (系数与 P 的列需对应) (2 分)

该二次型为正定二次型。 (1 分)

七、

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 $AX=0$ 的一个基础解系, 则其解空间 (1 分)

$$k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_2+\alpha_3)+k_3(\alpha_3+\alpha_1)=0$$

$$\Rightarrow (k_1+k_3)\alpha_1+(k_1+k_2)\alpha_2+(k_2+k_3)\alpha_3=0$$

$\therefore \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

$$\therefore \begin{cases} k_1+k_3=0 \\ k_1+k_2=0 \\ k_2+k_3=0 \end{cases} \Rightarrow k_1=k_2=k_3=0 \quad (4 \text{ 分})$$

$\therefore \alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3+\alpha_1$ 线性无关

$\therefore \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 $AX=0$ 的解

$\therefore \alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3+\alpha_1$ 也为 $AX=0$ 的解 (3 分)

即 $\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3+\alpha_1$ 为 $AX=0$ 的解空间的极大线性无关组

\therefore 为基础解系 (1 分)

八、解: 显然 $(A+C)^{-1}$ 和 D^{-1} 都存在, 由于

$$\begin{bmatrix} E & E \\ & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & -D \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & \\ -D^{-1}C & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A+C & O \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & \\ -D^{-1}C & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A+C & O \\ O & D \end{bmatrix} \quad (3 \text{ 分})$$

对上式两端同取逆得

$$\begin{bmatrix} E & \\ -D^{-1}C & E \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} A & -D \\ C & D \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} E & E \\ & E \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A+C & O \\ O & D \end{bmatrix}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} A & -D \\ C & D \end{bmatrix}^{-1} &= \begin{bmatrix} E & \\ -D^{-1}C & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A+C & O \\ O & D \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} E & E \\ & E \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} E & \\ -D^{-1}C & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (A+C)^{-1} & O \\ O & D^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & E \\ & E \end{bmatrix} \\ \text{于是有} \quad &= \begin{bmatrix} (A+C)^{-1} & O \\ -D^{-1}C(A+C)^{-1} & D^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & E \\ & E \end{bmatrix} \quad (4 \text{ 分}) \\ &= \begin{bmatrix} (A+C)^{-1} & (A+C)^{-1} \\ -D^{-1}C(A+C)^{-1} & D^{-1} - D^{-1}C(A+C)^{-1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

解 2: 显然 $(A+C)^{-1}$ 和 D^{-1} 都存在, 由于

$$\begin{bmatrix} A & -D & E & \\ C & D & & E \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A+C & O & E & E \\ C & D & & E \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} E & O & (A+C)^{-1} & (A+C)^{-1} \\ C & D & & E \end{bmatrix} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow \begin{bmatrix} E & O & (A+C)^{-1} & (A+C)^{-1} \\ O & D & -C(A+C)^{-1} & E - C(A+C)^{-1} \end{bmatrix} \\ &\rightarrow \begin{bmatrix} E & O & (A+C)^{-1} & (A+C)^{-1} \\ O & E & -D^{-1}C(A+C)^{-1} & D^{-1} - D^{-1}C(A+C)^{-1} \end{bmatrix} \quad (4 \text{ 分}) \end{aligned}$$

$$\text{从而} \begin{bmatrix} A & -D \\ C & D \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} (A+C)^{-1} & (A+C)^{-1} \\ -D^{-1}C(A+C)^{-1} & D^{-1} - D^{-1}C(A+C)^{-1} \end{bmatrix} \quad (1 \text{ 分})$$

九、证明: 由 A 是 n 阶实反对称矩阵得 $A^T = -A$, 从而 $E - A^2 = E + A^T A$. (1 分)

考虑二次型 $X^T(E - A^2)X$, 对于 $\forall X \neq 0$, 有 $X^T X > 0, (AX)^T(AX) \geq 0$, (2 分)

因此 $X^T(E - A^2)X = X^T(E + A^T A)X = X^T X + (AX)^T(AX) > 0$, (1 分)

故 $X^T(E - A^2)X$ 是正定二次型, 从而 $E - A^2$ 是正定矩阵. (1 分)