

CONDITIONS SANS DIAGNOSTIC

AMORCE DE TRAITEMENT

Prescrire annexes II et MVL lorsque pertinent.

Diarrhée du voyageur	00970034	Personnes à risque Valves/prothèse (nettoyage, extraction) Ex : amoxicilline, clindamycine prévention 00901116 traitement 00901117	Antibiotique Extraction ou Nettoyage Dentaire
Prévention Malaria	00970085	Grossesse : Apparition < 9 sem Ex : Diclectin, Dimenhydrinate, autres : ...	Nausées (excluant prévention mal des transports)
Prévention Mal Montagne	00970131	Avant / pendant / après grossesse. Ex : Acide folique, Materna, Pregvit, ...	Supplément Périnatalité
MD 72 hrs Prévention VIH post exposition	00901112	Rx initiale 6 mois (R=1) Ex : Contraceptif oraux combinés, Noréthindrone, Depo-provera, Evra, Nuvaring	Contraception
Chlamydia Gonorrhée (à venir)	00901115	Contraception d'urgence (COU) Ex : Plan B, Ella	Contraception d'urgence (COU)
Cessation tabagique	00970077	Infection active et / ou lentes Ex : Nix, Kwellada-P, R & C, Pronto, Nyda, Resultz, Zap	Poux
Reflux ou ATCD ulcère	≥18 ans (AINS) 00970182 6 sem/an (max 4 consécutives) ATCD ulcère avec AINS Ex : Pantoprazole, dexlansoprazole,	Région à risque 00901110 Tique vue ou accrochée ≥ 24 hrs ou incertain Absence de sx systémiques Ex : Doxycycline	Prévention Lyme (Tiques)
MD 48 hrs Prévention Traitement Influenza	00901109 00901111 Tx : Sx < 48 hrs. Résidence, comorbidités, grossesse 2e/3e Ex : Oseltamivir	00901113 Ex : Crème cortico puissance légère et modérée (Celestoderm, Desonide, Spectro eczema care, HC, Westcort, Hydroval, Elocom cr, Aristocort R et Triderm)	Dermatite de Contact Allergique
		MD 72 hrs Traitement Zona	Sauf visage/tête ≥ 18 ans Ex : Valacyclovir, famciclovir, Zovirax

CONDITIONS MINEURES

REPRESCRIRE UN TRAITEMENT PONCTUEL.

Peu importe le type de prescripteur (MD, optométriste, dentiste, IPS, podiatre, ...)

Éligible si prescription originale au dossier selon la légende

Aviser le prescripteur original

<input type="checkbox"/>	2 ans
<input checked="" type="checkbox"/>	5 ans



Muguet sans pompe	00901107	
		Ex : Fluconazole, Nystatine (cr ou susp.), ...
Infection urinaire ♀	00969532	≤ 2 / 12 mois (et 1/ 6 mois) Âge ≥ 14 ans, Femme Ex : Septra DS, ciprofloxacine, nitrofurantoin, fosfomycine
Acné mineure	00969818	Ex : Benzaclim / Clindoxyl, Dalacin T, Stiev-A
Aphtes buccaux	00969524	Ex : Oracort, Orabase
Érythème fessier	00969869	Ex : Zincofax crème, Canesten crème, Hydrocortisone 0,5-1%
Feux sauvages	00969621	Âge ≥ 12 ans < 6 tx / 12 mois Ex : Valacyclovir, famciclovir, zovirax
Vaginite	00969699	Âge ≥ 12 ans < 4 tx / 12 mois Ex : clotrimazole, miconazole, terconazole, fluconazole

Douleurs menstruelles	00969648	
		Ex : naproxène, ibuprofène, celecoxib
Hémorroïdes	00969745	Âge ≥ 12 ans Ex : Anusol, proctosedyl : Ong. ou Supp., Proctofoam
Candidose cutanée	00901106	Ex : Clotrimazole crème, Nystatin, Miconazole
Rhinite allergique	00969680	Âge > 3 ans Ex : antihistaminiques (cetirizine, loratadine, ...), spray nasal
Conjonctivite allergique	00969907	Âge ≥ 3 ans Ex : antihistaminiques, gouttes (Patanol, Opticrom)
Muguet avec pompe	00901107	Ex : Fluconazole Nystatine (cr ou susp.) exclusion : Sporanox nouveau-né
Eczéma	00969974	Âge > 2 ans Ex : Puissance légère ou modérée (excluant : Cyclocort, Diprolene, Diprosone, Luxiq, Dermovate, Ultravate, Lyderm, Topicort)

CONDITIONS CHRONIQUES

PROLONGER POUR UN PROBLÈME DE SANTÉ CHRONIQUE

(même si parfois usage occasionnel des médicaments)



PRISE EN CHARGE

SUIVRE UN PROBLÈME DE SANTÉ (En plus d'ajuster les médicaments si c'est nécessaire)

Hypertension Artérielle

IECA (perindopril, ramipril, ...) ARA (valsartan, irbesartan, ...) BB (bisoprolol, metoprolol), BCC (amlodipine, nifedipine, verapamil, diltiazem) ...

Statine (atorvastatine, rosuvastatine, ...), ezetimibe, fenofibrate ...

Dyslipidémie

Diabète

metformine, sulfonylurée (gliclazide, glyburide), DPP4 (sitagliptine, ...) iGPL-1 (semaglutide), SGLT2 (jardiance, forxiga...), insulines

duloxetine, amitriptyline, candesartan, topiramate, acide valproïque, ...

Prévention Migraine

Hypothyroïdie

levothyroxine

warfarine

Anticoagulo thérapie

Asthme

Flovent, Ventolin, Alvesco, Symbicort, ...

Atrovent, Incruse, Seebri, Spiriva, Tudorza, Foradil, Onbrez, Serevent, Trelegy, Symbicort, Advair, Breo ...

MPOC

Douleur chronique

Gabapentinoides (pregabaline, gabapentin), Duloxetine, ATC (amitriptyline)
Morphine et dérivés (morphine, hydromorphone) * ajuster qté totale en mg

Benzodiazépine (lorazepam, clonazepam, ...) Antidépresseur (venlafaxine, citalopram, sertraline,), IPP (pantoprazole,...), Antidouleur (pregabaline, gabapentin, morphine, ...)

Déprescription

AJUSTEMENTS À NE PAS OUBLIER

COLOSCOPIE - plusieurs médicaments à gérer

Cessation Avant Coloscopie

Insuline, fer, antiplaquettaires, anticoagulants...

SIDMAAI : S (sulfo), I (IECA), D (diurétiques et inhibiteurs rénine), M (metformine), A (ARA), A (AINS), I (ISGLT-2)

CONDITIONS POUVANT ÊTRE TRAITÉES PAR MVL

Certains produits ont des versions remboursées RAMQ (♦)

Antidotes : Glucagon, Epipen, Nitro S/L, Naloxone, Insuline (rare cas servi en MVL)

RGO : Condition mineure ou antiacides, anti-H2 (famotidine, ranitidine)

Suppléments : Laits maternisés, suppléments (ensure, boost...)

