

イタリア半島におけるファジョーリニ（サヤインゲン）の包括的文化誌：歴史的起源、農業生物多様性の展開、および地域食文化の構造分析

1. 序論：イタリアの食卓における「緑の革命」

イタリアのガストロノミーにおいて、「ファジョーリニ（Fagiolini）」——一般にサヤインゲンとして知られる未成熟なインゲンマメのサヤー——は、単なる野菜のカテゴリーを超越した存在である。それは、季節の到来を告げる象徴であり、地域ごとの微気候（マイクロクライメート）に適応した農業技術の結晶であり、そして何世紀にもわたる品種改良の歴史的証言でもある。植物学的には *Phaseolus vulgaris* L.（インゲンマメ）に属しながら、種子（セミ）ではなくサヤ（バッチェット）全体を食すという消費形態は、イタリアの食文化において「マンジャトゥット（Mangiatutto、すべて食べる）」という独自のカテゴリーを形成した。

本報告書は、ファジョーリニがイタリア半島においてどのように受容され、進化し、そして今日の多様な地域名称や伝統料理へと昇華されたのかを、歴史学、植物学、言語学、および調理科学の多角的な視点から包括的に分析するものである。乾燥豆としての消費が主流であった古代から、いかにして「サヤごと食べる」という革新が定着したのか。その背景には、品種改良による繊維質（ペルガメーナ）の除去という農学的な勝利と、それを支えた農民たちの知恵が存在する。

ヴェネツィアの潟（ラグーナ）が生んだ黄金色の「メラヴィリア・ディ・ヴェネツィア」、トスカーナの丘陵地帯で愛される湾曲した「ストルティーノ・ディ・ルッカ」、そしてアルプスの冷涼な気候に耐える「アネッリーノ・ディ・トレント」。これらの品種は単なる植物ではなく、各地域のアイデンティティそのものである。本稿では、これらの伝統的品種（Cultivar）の詳細な特性記述に加え、北の「テゴリーネ」から南の「コルネッティ」に至る呼称の変遷、そしてジェノヴァのペストやナポリのトマト煮込みといった郷土料理における役割について、20ページ以上にわたる詳細な論述を展開する。

2. 歴史的変遷：新大陸からの渡来と受容のプロセス

2.1 プレ・コロンブス期の「マメ」と旧大陸の遺産

イタリアにおける豆食の歴史を紐解く際、まず明確に区別しなければならないのが、コロンブス以前と以後の「マメ」の定義である。1492年以前、ローマ帝国の食卓に上っていた「ファセオルス（Phaseolus）」あるいは「ファジョーロ（Fagiolo）」は、今日我々が知るインゲンマメ（*Phaseolus vulgaris*）ではなく、アフリカ原産のササゲ属（*Vigna unguiculata*）であった。

これらは古代ローマ時代から栽培されており、主に乾燥豆として保存食に利用されていたが、一部の未成熟なサヤも食用にされていた痕跡がある。ウンブリア州トラジメーノ湖周辺で現代も栽培されている「ファジヨリーナ・デル・トラジメーノ（Fagiolina del Trasimeno）」は、この古代種（ササゲ属）の直系であり、歴史の生きた化石として極めて重要な意味を持つ。

2.2 新大陸からの導入と教皇クレメンス7世の役割

真正のインゲンマメ（*Phaseolus vulgaris*）は、中央アメリカおよび南アメリカ（ペルー、コロンビア）を起源とする。この作物がイタリア半島に到達したのは16世紀初頭であり、その普及にはカトリック教会のネットワークと貴族階級の好奇心が大きく寄与した。

特筆すべき歴史的転換点は、1529年に訪れる。メディチ家出身の教皇クレメンス7世（Clemente VII）が、神聖ローマ皇帝カール5世（Carlo V）のスペイン宮廷から贈られた新大陸の種子を、植物学者であり人文学者でもあったジョヴァンニ・ピエリオ・ヴァレリアーノ（Giovanni Pierio Valeriano）に下賜したのである。ヴァレリアーノはこの種子を自身の出身地であるベッルーノ（ヴェネト州）へ持ち帰り、栽培を試みた。これが、今日「ラモンの豆（Fagiolo di Lamon）」として知られるヴェネト地方の名産品が誕生する契機となったとされる。当初、これらの豆は貴重なエキゾチック植物として扱われたが、その高い生産性と環境適応能力により、瞬く間に農民層へと浸透していった。

2.3 乾燥豆から「マンジャトウツ」への進化

導入初期の数世紀間、インゲンマメは依然として「乾燥種子」を収穫するための作物であった。タンパク質源としての価値が優先され、サヤは硬く繊維質（羊皮紙層）が強いため、食用には適さないと考えられていたからである。

しかし、18世紀から19世紀にかけて、イタリアの農民や育種家たちは、突然変異的に現れる「繊維の少ない」個体を選抜し始めた。これが「マンジャトウツ（Mangiatutto）」、すなわち「サヤごと食べられる豆」の誕生である。この選抜プロセスは、サヤの内側にある硬い内果皮（endocarpo）——通称「ペルガメーナ（pergamena、羊皮紙）」——が形成されない、あるいは形成が著しく遅れる形質を固定化する作業であった。

2.4 19世紀の証言：ペッレグリーノ・アルトゥージと近代料理

1891年に出版されたペッレグリーノ・アルトゥージ（Pellegrino Artusi）の記念碑的著作『厨房の科学と美味しく食べるための芸術（La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene）』は、19世紀末におけるファジヨリーノの地位を如実に示している。

アルトゥージは、レシピ第386番「サヤインゲンのスフォルマート（Sformato di fagiolini）」において、以下のように記述している：

「500グラムの非常に柔らかいサヤインゲンを用意し、先端を切り、**もしあれば糸を取り除く（levate loro le punte e il filo se l'hanno）**」

この「もしあれば（se l'hanno）」という条件節は、歴史的な移行期を示唆する極めて重要な

記述である。当時、すでに糸のない（Senza filo）改良品種が市場に出回っていた一方で、依然として伝統的な、糸取り作業を必要とする品種も一般的であったことを証明している。アルトゥージはまた、ファジョーリニを単なる煮込み料理の具材としてだけでなく、ベシャメルソースやパルミジャーノ・チーズ、卵と組み合わせた洗練された「スフォルマート（型焼き）」として紹介しており、この野菜がブルジョワ階級の食卓においても重要な位置を占めていたことがわかる。

3. 植物学的特性と農学的考察：品質を決定づけるメカニズム

ファジョーリニの食味と品質を理解するためには、その植物学的構造と栽培環境の相互作用を解明する必要がある。

3.1 植物生理学と「ペルガメーナ」の欠如

ファジョーリニ（サヤインゲン）と、種子を食べるインゲンマメ（サヤインゲン用品種以外）の決定的な違いは、サヤの組織構造にある。

- **ペルガメーナ (Pergamena)** : サヤの内側に形成されるリグニン化した繊維層。通常、種子を保護し乾燥させるために発達するが、ファジョーリニ品種では遺伝的にこの層の発達が抑制されている（Senza pergamena）。これにより、サヤが成熟しても肉厚でジューシーな食感が維持される。
- **フィロ (Filo)** : サヤの背腹の縫合線に沿って走る維管束（筋）。伝統的な品種ではこれが硬化しやすく、調理前の下処理（筋取り）が必須であったが、現代の品種や一部の伝統品種（メラヴィリア・ディ・ヴェネツィアなど）では、この筋がほとんど感じられないレベルまで改良されている。

3.2 生育習性と栽培形態

ファジョーリニには、その草姿によって大きく二つのタイプが存在し、それぞれが異なる農業的・文化的意味を持つ。

1. **ランピカンテ (Rampicante、つるあり種)** :
 - **特徴**: 支柱やネットに絡みつきながら2メートル以上に成長する。
 - **農業的意義**: 生育期間が長く、初夏から秋まで継続的に収穫が可能（スカラー収穫）。家庭菜園や小規模な伝統的農法に適しており、手摘み収穫が前提となる。多くの伝統的高級品種（メラヴィリア・ディ・ヴェネツィア、ストルティーノ・ディ・ルッカなど）はこのタイプに属する。
 - **品質**: 一般的にサヤが柔らかく、風味が豊かであるとされる。
2. **ナノ (Nano、つるなし種/矮性種)** :
 - **特徴**: 草丈が低く（40-50cm程度）、自立する。支柱が不要。
 - **農業的意義**: 収穫が一斉に行えるため、大規模な圃場での栽培や機械収穫に適している。加工用（冷凍、缶詰）や大量流通向けの生鮮品として栽培されることが多い。

- **品質:** 現代の品種改良により品質は向上しているが、機械収穫への耐性を持たせるため、皮がやや硬めの品種が選ばれる傾向にある。

3.3 季節性と産地リレー

イタリアにおけるファジオーリニの旬は、露地栽培において5月から9月（遅い品種は10月まで）である。しかし、イタリア半島の南北に長い地形と多様な気候帯を利用した「産地リレー」により、消費期間は大幅に拡大されている。

- **3月～4月:** シチリア島や北アフリカ（モロッコ、エジプト、チュニジア）からの早期出荷品（プリミツィエ）が市場に登場する。
- **5月～6月:** カンパニア州、プーリア州、ラツィオ州などの中南部産がピークを迎える。
- **7月～9月:** 北イタリア（ヴェネト、エミリア＝ロマーニャ、ピエモンテ）および冷涼な山間部の生産が本格化する。

4. 伝統的品種（Cultivar）の多様性とP.A.T.

イタリア農業の真髄は、地域ごとのテロワールに特化した膨大な数の在来品種（Ecotipi）にある。これらは多くの場合、イタリア農林水産省によって「伝統的農産物（Prodotti Agroalimentari Tradizionali, P.A.T.）」に認定されている。

4.1 メラヴィリア・ディ・ヴェネツィア（Meraviglia di Venezia）

ヴェネト州、特にヴェネツィアの潟（ラグーナ）周辺の砂質土壌で育まれた、イタリアを代表する平サヤインゲンである。

- **名称の由来:** 「ヴェネツィアの驚異」という名は、その圧倒的な美しさと品質への賛辞である。
- **形態的特徴:** サヤは非常に幅広（約2cm）で平たく、長さは16～20cmに達する。最大の特徴は、サヤの色が鮮やかな**黄金色（giallo）**であることだ。熟すと内部の種子は黒色になるが、食用とする段階では種子は未発達である。
- **食味:** 肉厚でありながら繊維（糸）が全くなく、とろけるような食感を持つ。バターのような風味（burroso）と表現されることもある。
- **栽培史:** 1826年のオーストリア統治下の地籍簿には、すでにカヴァッリーノ＝トレポルティ地域での主要作物として記録されている。この地域の塩分を含んだ砂地と湿潤な気候が、独特の甘みを生み出す。

4.2 ストルティーノ・ディ・ルッカ（Stortino di Lucca）

トスカーナ州ルッカ平原およびヴェルシリア地方の至宝。「アネッリーノ・ジャッロ・ディ・ルッカ（Anellino Giallo di Lucca）」とも呼ばれる。

- **形態的特徴:** 名称の「ストルティーノ（少し曲がった）」や「アネッリーノ（小さな輪）」が示す通り、サヤは強く湾曲してC字型や円環状になる。色はクリームがかった黄色で、長さは5～6cmと短い。種子は光沢のある黒色で、平べったい。

- **食味:** 「サピディタ (Sapidità、旨味・塩気)」が非常に強く、ファジョーリニの中でも特に味が濃厚であるとされる。繊維質は皆無で、食感は滑らか (morbida)。
- **栽培の難しさ:** 収穫適期が非常に短く、適切なタイミング (サヤが黄色くなり、かつ糸が出る前) を逃さずに手摘みする必要があるため、市場に出回る量は限られている。地元では6〜8回に分けて丁寧に収穫される。

4.3 アネッリーノ・ディ・トレント (Anellino di Trento)

アルプス山脈の麓、トレンティーノ地方で栽培される「ガンチェット (Gancetto、小さなフック)」タイプの代表格。

- **形態的特徴:** サヤは緑色をベースに、鮮やかな**紫色の縞模様**が入るのが特徴。湾曲しており、フックのような形状をしている。加熱すると紫色は消え、緑色に変化する。
- **適応性:** 山間部の冷涼な気候に適応しており、低温に強い。4月の早い時期から播種が可能である。
- **食味:** 非常に肉厚でジューシー。豆の風味が強く、煮込み料理にしても煮崩れしにくい。

4.4 トリオンフォ・ヴィオレット (Trionfo Violetto)

「紫の勝利」という勇ましい名を持つ、イタリア全土で見られるつるあり品種。

- **色彩の魔術:** サヤ全体が深く美しい紫色 (アントシアニン由来) をしており、菜園での観賞価値も高い。調理の際、熱湯にくぐらせると一瞬で鮮やかな緑色に変色する「ブランチングの魔法」は、イタリアの家庭料理における視覚的な楽しみの一つである。
- **食味:** 繊細で、わずかに甘みがある。繊維がなく柔らかいため、サラダや軽いソテーに適している。

4.5 ファジョーリ・ディ・サントアンナ (Fagioli di Sant'Anna) と「ストリング」

トスカーナ州、特にルッカやピサ周辺で崇拜される、極めて長いサヤを持つ品種群。

- **名称:** 聖アンナの祝日 (7月26日) の頃に収穫の最盛期を迎えることから名付けられた。別名「ファジョーリ・ア・ストリング (靴紐)」、「セルペンテ (蛇)」、「フルスタ (鞭)」とも呼ばれる。
- **植物学的特異性:** これらは一般的なインゲンマメ (*Phaseolus vulgaris*) の長サヤ品種である場合と、ササゲ属 (*Vigna unguiculata* ssp. *sesquipedalis*、いわゆる三尺ササゲ) である場合が混在しているが、イタリアの伝統的な「サントアンナ」は主に *Phaseolus* の長サヤ系品種を指すことが多い。
- **形態:** 長さは30cmを超え、時には50cm〜1メートル近くに達する。
- **食文化:** トマトソースでじっくり煮込む調理法が定石であり、長いサヤがソースをよく吸い込む。

4.6 その他の重要品種

- **ボビス (Bobis):** 円筒形の断面を持つ、最も標準的な緑色の品種。市場で最も一般的に見

られる。

- スーパーボ（Superbo）：ボビスの一種で、非常に生産性が高い。
- マルコーニ（Marconi）：平サヤの緑色品種。種子が目立たず、サヤが滑らか。

5. 言語地理学：呼称から見る地域アイデンティティ

イタリア語におけるファジョーリニの呼称は、地域の歴史や文化を映し出す鏡である。標準イタリア語の「Fagiolini（小さな豆）」以外に、各地方には独自の方言や慣用名が存在する。

地域・州	呼称	語源・意味・背景
ヴェネト州	Tegoline (テゴリーネ) / Tege (テゲ)	ラテン語の <i>theca</i> （覆い、鞘）に由来する方言「Tega」から。ヴェネト地方におけるサヤの呼び名。調理器具「Tecia（テッチャ）」との関連も深い。
ロンバルディア州	Cornetti (コルネッティ) / Fagiolini	一般的な呼称が混在。
リグーリア州	Fagiolini	ジェノヴェーゼ・ペストの文脈で語られることが多い。
エミリア＝ロマーニャ	Cornetti / Fagiolini	商業的な農業地帯では標準語が浸透。
トスカーナ州	Fagiolini / Fagiuoli (古語)	アルトゥージの時代には「Fagiuoli」と記述され、文脈でサヤか種子かを判断していた。特定の形状を指す「Stringa」や「Stortino」も多用される。
ラツィオ州（ローマ）	Piattoni (ピアットーニ) / Corallo (コラルロ)	「Piattoni」は平らな形状（Piatto）から。「Corallo」は本来、種子が赤い特定の品種を指していた可能性が

		あるが、現在はローマ周辺で「平サヤインゲン」の総称として使われる。
カンパニア州（ナポリ）	Cornetti (コルネッティ)	「小さな角（Corno）」の意味。南イタリアにおける幸運のお守り「コルノ」に形状が似ていることから。
シチリア州	Cornetti / Fasola	ナポリと同様「Cornetti」が優勢だが、方言で豆全般を指す言葉も使われる。
イタリア全土（市場用語）	Mangiatutto (マンジャトウト)	「全部食べる」の意。サヤインゲン全般、または特に繊維のない品種を強調する際に使われる。
混同されやすい用語	Taccole (タッコレ)	植物学的にはエンドウ（ <i>Pisum sativum</i> ）のサヤエンドウ（スノーピー）を指すが、地域によっては平たいサヤインゲン（Piattoni）をタッコレと呼ぶ混同が見られる。

考察：言語的境界線

北東部（ヴェネト）の「テゴリーネ」圏と、中南部を中心とする「コルネッティ」圏、そしてローマ特有の「ピアットーニ/コラッロ」圏という三つの大きな言語的ブロックが存在する。これはイタリアの食文化が、行政区分（州）よりもさらに細かい、歴史的な文化圏によって分断・形成されていることを示唆している。

6. 地域別食文化と調理法の分析

ファジョーリニは、イタリア料理において「コントルノ（Contorno、付け合わせ）」として扱われることが多いが、地域によってはプリモ・ピアット（第一皿）の主役、あるいは独立した料理としての地位を確立している。

6.1 リグーリア州：ペストとの共生と「貧しい料理」の知恵

リグーリア料理において、ファジョーリニはバジルペスト（Pesto alla Genovese）と不可分な関係にある。

- **トロフィエ・アル・ペスト・コン・パターテ・エ・ファジョーリニ（Trofie al Pesto con Patate e Fagiolini）**：
これはリグーリアの古典的なプリモ・ピアットである。パスタ（トロフィエ）を茹でる際、角切りのジャガイモと寸断したファジョーリニを同じ鍋に投入する。
 - **機能的理由**: ジャガイモから溶け出すデンプン質が茹で汁に粘度を与え、ペストソースがパスタに絡みやすくなる（乳化を助ける）。ファジョーリニは、柔らかいパスタとジャガイモに対し、シャキッとした食感（Crunchy texture）のアクセントを加える。
- **ポルペットーネ・ディ・ファジョーリニ（Polpettone di Fagiolini）**：
肉を使わない「ポルペットーネ（ミートローフ状の料理）」。「茹でて刻んだファジョーリニを、ジャガイモのピューレ、卵、パルミジャーノ、マジョラム、そして地元の酸味のあるフレッシュチーズ「プレシンセア（Prescinseua）」と混ぜ合わせ、パン粉をまぶしてオーブンで焼く。これは野菜を主役にした「クチーナ・ポーヴェラ（Cucina Povera、貧民の料理）」の傑作であり、冷めても美味しいため夏のピクニックの定番である。

6.2 ヴェネト州：土鍋で引き出す「テッチャ」の魔術

ヴェネト州、特に内陸部やヴェネツィア周辺では、野菜をくたくたになるまで煮込む調理法が好まれる。

- **テゴリーネ・イン・テッチャ（Tegoline in Tencia）**：
「テッチャ」は方言で鍋を意味する。オリーブオイル（またはバター）と叩き潰したニンニクを熱し、ファジョーリニを生のまま（あるいは軽く湯通ししてから）投入する。蓋をして蒸し煮にし、途中で少量のトマトピューレや水を加えながら、サヤが完全に柔らかくなり、旨味を吸い込むまで長時間火を通す。
 - **特徴**: アルデンテ（歯ごたえを残す）を良しとする現代的な感覚とは対照的に、ここでは「柔らかさ（Tenerezza）」と「味の浸透」が美德とされる。「テガ・ニョッカ（Tega Gnocca）」という表現は、ニョッキのように柔らかく美味しいサヤを称賛する言葉である。

6.3 トスカーナ州：トマトとの融合「イン・ウミド」

トスカーナでは、野菜をトマトソースで煮込む「イン・ウミド（In Umido）」が基本技法である。

- **ファジョーリニ・アッラ・トスカーナ（Fagiolini alla Toscana）**：
赤土の鍋（コッチョ）を使用するのが伝統的である。タマネギ、セロリ、ニンジンのソフリット（香味野菜ベース）を作り、完熟トマトとファジョーリニを加えて煮込む。ニンニクやセージ、時にはパンチェッタ（塩漬け豚バラ肉）を加えてコクを出す。特に「サントアンナ」のような長サヤ品種は、この調理法でその真価を発揮する。

6.4 ローマとラツィオ州：酸味と平サヤの競演

ローマ料理では、平サヤの「ピアットーニ」や「コラッロ」が好まれる。

- **ファジョーリニ・アッラグロ (Fagiolini all'Agro) :**
茹でたファジョーリニに、オリーブオイルとレモン汁（または酢）をかけたシンプルなサラダ。ローマの夏には欠かせない、胃を休めるための清涼剂的な料理である。
- **ファジョーリニ・アル・ポモドーロ:**
ローマ風のトマト煮込みでは、平サヤの「コラッロ」を使い、ニンニクとミント（Mentuccia）を効かせることが多い。

6.5 南イタリア（カンパニア・プーリア）：太陽の恵みと「コルネッティ」

ナポリや南イタリア全般では、素材の鮮烈さを活かした調理が主流である。

- **コルネッティ・アル・ポモドーロ (Cornetti al Pomodoro) :**
新鮮なダッテリーノやチェリートマト (Pomodorini) を使い、短時間で仕上げる。オリーブオイルでニンニクを熱し、トマトとファジョーリニを入れ、最後に大量のバジル (Basilico) を手でちぎって加える。煮込むというよりは、トマトのジュースで「和える」感覚に近い。
 - **ブルスケッタとの相性:** 皿に残った美味しいソース (Sugo) は、パンで拭って食べる (スカルペッタをする) のがマナーであり、最大の楽しみである。

7. 現代的課題と社会経済的側面

7.1 スローフード運動と生物多様性の保護

イタリアのファジョーリニ文化において、スローフード協会 (Slow Food) の役割は極めて大きい。彼らは、生産効率の追求によって絶滅の危機に瀕している伝統品種を「プレシディオ (Presidio、食の砦)」として認定し、保護している。

- **手摘みの価値:** 機械収穫に適した現代品種（皮が硬く、一斉に熟す）に対し、伝統品種は収穫期が長く、サヤが柔らかいため機械にかけると損傷しやすい。スローフードは、労働集約的な「手摘み (Raccolti a mano)」によってのみ得られる品質の高さを啓蒙し、生産者が適正な価格（1kgあたり3〜6ユーロ、機械収穫の倍以上）で販売できる市場環境を整備している。

7.2 市場動向と輸入問題

イタリア国内では、依然として国産、特に地場産 (Km 0) のファジョーリニへの選好が強い。しかし、労働コストの上昇により、早春の時期には北アフリカ（モロッコ、エジプト）産の安価な輸入品が増加している。これらは「プリミツィエ (初物)」として重宝される一方、輸送にかかる時間（コールドチェーン）による鮮度低下や、栽培基準の違いを懸念する声もある。

消費者は、サヤのハリや「折った時の音（スナップ音）」で鮮度を見極める眼識を持っている。

8. 結論：未来へ続く「サヤ」の系譜

イタリアにおけるファジョーリニの歴史は、新大陸からの「異邦人」であったインゲンマメが、数世紀をかけてイタリアの土壌と文化に同化し、かけがえのない「家族」となった過程の記録である。

乾燥豆としての利用から、サヤごと食べる「マンジャトゥット」への転換は、イタリア人の食に対する探究心と、品種改良への情熱がもたらした農学的革命であった。ヴェネツィアの潟が生んだ黄金色の「メラヴィリア」、ルッカの土壌が育んだ旨味の塊「ストルティーノ」、そしてアルプスの厳しさに耐える「アネッリーノ」。これらの品種は、単なる遺伝資源ではなく、それぞれの土地の記憶を宿した文化遺産である。

現代において、機械化と効率化の波は避けられない現実であるが、「テゴリーネ・イン・テッチャ」の鍋底に残る焦げ目の風味や、ジェノヴァのペストに絡むファジョーリニの食感を愛する人々がいる限り、この多様な豆文化は守られ続けるであろう。ファジョーリニは、イタリアの食卓において、最も小さく、しかし最も雄弁に「地域の味」を語る野菜の一つなのである。

表1：イタリアの主要なファジョーリニ伝統品種とP.A.T.認定状況

品種名 (イタリア語)	産地・州	タイプ	色・形状	P.A.T.認定	特記事項
Meraviglia di Venezia	ヴェネト州 (ヴェネツィア)	つるあり	黄色・平サヤ・幅広	Yes	「ヴェネツィアの驚異」。バターのような風味。
Stortino di Lucca	トスカーナ州 (ルッカ)	つるあり	クリーム黄・湾曲	Yes	強い旨味。種子は黒色。
Anellino di Trento	トレンティーノ州	つるなし/あり	緑に紫斑・湾曲	Yes (関連)	「Gancetto」。低温に強い。

Fagiolino di Sant'Anna	トスカーナ州	つるあり	緑・極長 (30cm+)	Yes	7月下旬収穫。トマト煮込み用。
Fagiolo a Pisello	カンパニア州	つるあり	黄色・丸サヤ	Yes	エンドウ豆のような丸い形状。
Trionfo Violetto	全土	つるあり	紫色・円筒形	-	加熱で緑に変色。観賞用にも。
Fagiolina del Trasimeno	ウンブリア州	つるなし	多色 (種子)	Yes (Presidio)	古代種 (Vigna)。サヤより種子を食す。

表2：ファジョーリニの栄養価比較 (100gあたり)

成分	生鮮ファジョーリニ	乾燥インゲンマメ (参考)	備考
エネルギー	31 kcal	300+ kcal	野菜として低カロリー。
水分	90.5 g	10-12 g	高い水分含有量が特徴。
タンパク質	1.8 g	20-25 g	乾燥豆より少ないがアミノ酸バランス良。
炭水化物	2.4 g	45-60 g	低糖質。
食物繊維	3.4 g	15-20 g	消化の良い繊維質。
ビタミンC	16 mg	微量	生鮮サヤ特有の栄養素。

カリウム	210 mg	1400 mg	利尿作用に寄与。
------	--------	---------	----------

(データソース: CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
他)

本報告書は、提供された調査資料に基づき、専門的な視点からイタリアにおけるファジヨール
ニの全貌を体系化したものである。