

イタリア半島における*Brassica oleracea* var. *gongylodes*（コールラビ）の歴史植物学的および民俗学的考察：古代から現代に至る栽培と食文化の変遷

序論：境界上のアブラナ科植物

イタリアの食文化と農業史において、*Brassica oleracea* var. *gongylodes*（一般にコールラビ、イタリア語ではCavolo rapa）は、極めて特異な位置を占めている。ブロッコリーやカリフラワーといった他のアブラナ科野菜がイタリア料理の象徴として世界的に認知されているのに対し、カボロ・ラパは「忘れられた野菜」あるいは「再発見された野菜」という二重のアイデンティティを持つ。本報告書は、この野菜の植物学的特性、イタリア半島における断絶と連続を含む複雑な歴史、そして特定の地域（特にシチリアとプーリア）で保存されてきた固有品種の文化的意義について、包括的な分析を行うものである。

対象範囲は、古代ローマ期から現代に至るまでのイタリア全土、および関連する欧州（EU圏）の文脈に限定し、北米や日本における受容史は除外する。特に、16世紀の博物学者ピエトロ・アンドレア・マッティオリによる記述を分水嶺とし、それ以前の古代における存在の曖昧さと、それ以降の北方からの「再導入」という歴史的ダイナミクスを解明する。

第1部：植物学的分類と形態生理学

1.1 分類学的体系と形態的特異性

Brassica oleracea var. *gongylodes*は、アブラナ科アブラナ属に属する二年草であり、野生のキャベツ（*Brassica oleracea*）から人為選択によって派生した栽培品種群の一つである。本種を他の変種（ケール、キャベツ、ブロッコリー等）と区別する決定的な形態的特徴は、胚軸（hypocotyl）の上部および上胚軸（epicotyl）の二次肥大にある¹。

一般に「球根」や「根」と誤認されることが多いが、この肥大部は植物学的には茎（stem）である。カブ（*Brassica rapa*）が地下部の根を肥大させるのに対し、カボロ・ラパの肥大茎は完全に地上で発育する³。この球状の茎には葉痕（leaf scars）が螺旋状に配置されており、そこから長い葉柄を持つ葉が直接生じる。この形態は、古代の観察者にとって「土から飛び出したカブ」として驚異の対象であった。

植物学的分類	詳細
--------	----

界	Plantae (植物界)
科	Brassicaceae (アブラナ科)
属	Brassica (アブラナ属)
種	<i>Brassica oleracea</i> (ヤセイカンラン)
変種	var. <i>gongylodes</i> (Gongylodes Group)
主要部位	肥大茎 (Swollen stem)
染色体数	2n = 18 (Cゲノム)

1.2 遺伝的起源と分化のタイムライン

遺伝学的解析によれば、*B. oleracea*の栽培化は地中海東部および小アジアで始まったとされる。ケール (Acephala group) のような結球しない葉菜タイプが最も原始的な形態であり、そこから茎の肥大を選抜する過程でGongylodesグループが分化したと考えられる⁴。

ドイツにおける表現型の選抜圧が、現在の「コールラビ」の形態確立に大きく寄与したという説が有力である。紀元1世紀頃にはすでに茎の太い変異種が存在していた可能性が示唆されているが、現代的な品種として固定されたのは中世以降、特に北ヨーロッパの冷涼な気候下での栽培化が進んでからであると推測される⁴。イタリアにおける在来種（特にシチリアの紫品種）と、北ヨーロッパ由来の改良種（ウィーン種など）の間には、遺伝的な距離が存在する可能性があり、これがイタリア国内における南北の品種差を生み出している。

1.3 生理生態と環境応答

カボロ・ラパは冷涼な気候を好むが、他のアブラナ科野菜と比較して極端な寒さや暑さに対する耐性はやや劣る。特に水分ストレスに対して敏感であり、土壌水分が不足すると肥大茎の木質化 (lignification) が急速に進行し、食味を著しく損なう⁵。

イタリア南部、特にシチリアのエトナ山麓における栽培（後述のCavolo Trunzo）は、火山性土壌の保水性と排水性のバランスが、この生理的制約を克服する上で重要な役割を果たしている。一方、北部イタリアにおいては、春作および秋作が一般的であり、夏の高温期を避ける作型が確立されている。

第2部：古代ローマにおける痕跡と「コリントスのカブ」

論争

2.1 プリニウスの証言：*Rapum Corinthium*

イタリア半島におけるカボロ・ラパの歴史を遡る際、最大の争点となるのが古代ローマ時代の文献における記述の同定である。紀元1世紀、大プリニウスは『博物誌』（*Naturalis Historia*）の中で、「コリントスのカブ」（*rapum corinthium*）あるいは「コリントスのナウェウ」（*napus*）と呼ばれる奇妙な野菜について記述している。

「根はほとんど地表に出ており、成長において下へ伸びる他のすべての種類とは異なり、これだけが上へと伸びる。」³

この「地上で上に向かって成長する根」という記述は、カボロ・ラパの肥大茎の特徴と驚くほど一致している。通常のカブ（*Brassica rapa*）は地中に形成されるため、プリニウスがこれを特異なものとして記録したことは、当時この形態が一般的ではなかったことを示唆している。

「コリントス」という地名は、この野菜がギリシャ経由でイタリアに持ち込まれた可能性を示しており、東地中海起源説を補強するものである⁸。

2.2 アピキウスとローマの食卓

ローマ帝国の美食家アピキウスの料理書『デ・レ・コキナリア』（*De Re Coquinaria*）にも、コールラビと思われる野菜の調理法が記されているとされる⁸。ローマ人はアブラナ科野菜（*olera*）を好み、特に若芽や茎を油、ワイン、ガルム（魚醤）、スパイス（クミンやコリアンダー）で調理していた。カボロ・ラパが当時存在していたとすれば、その甘みとクリスピーな食感は、ローマの複雑な調味と相性が良かったはずである。

しかし、植物考古学的な証拠は断片的である。ポンペイやヘルクラネウムの遺跡から出土する炭化種子の多くは、*Brassica*属であることは特定できても、それがキャベツなのかコールラビなのかを変種レベルで判別することは困難である¹⁰。したがって、古代ローマにおける存在は「文献的には濃厚であるが、考古学的には未確定」という領域に留まる。

第3部：中世の沈黙とルネサンス期の「再発見」

3.1 シャルルマーニュと北方の台頭

ローマ帝国崩壊後、地中海世界におけるカボロ・ラパの記録は一時的に途絶える。一方で、栽培の中心は北ヨーロッパへと移動したと考えられる。8世紀末、フランク王国のシャルルマーニュ（カール大帝）が発布した『荘園令』（*Capitulare de villis*）には、帝国全土で栽培すべき野菜のリストが含まれており、その中にコールラビの前身と思われる植物が含まれていたとされる⁹。

ドイツ語圏において、この野菜は「キャベツ（Kohl）」と「カブ（Rabi）」を組み合わせた「Kohlrabi」という名称を獲得し、重要な食料源として定着していった。冷涼なドイツの気候

は、茎の肥大を促進し、繊維質が少なく甘みの強い品種を選抜するのに適していたのである。

3.2 マッティオリの1554年：イタリアへの「帰還」

イタリアにおけるカボロ・ラパの歴史において、最も確実かつ重要な転換点は1554年である。シエナ出身の医師・植物学者ピエトロ・アンドレア・マッティオリ（Pietro Andrea Mattioli）は、ディオスコリデスの薬物誌に対する注釈書の中で、この植物について明確な記述を残している。

マッティオリは、この植物が「最近イタリアに入ってきた」（*come lately into Italy / venuto nuovamente in Italia*）と記している¹。この「最近」という表現は極めて重要である。それは、ルネサンス期のイタリア人にとって、カボロ・ラパが古来の伝統野菜ではなく、北方（おそらくドイツ）からの新来種、あるいは長い忘却の彼方から戻ってきた珍しい野菜として認識されていたことを示している。

彼はその形態を「基部が肥大した茎を持ち、葉は疎らで狭い」と正確に描写し、イタリアでの食べ方として「油、塩、胡椒」を用いたシンプルな調理法を紹介している¹²。これは現代の「ピンツィモニオ」やサラダに通じる食べ方であり、500年前からイタリアにおける受容の仕方が一貫していたことを示唆している。

3.3 16世紀末の拡散と名称の混乱

16世紀末までには、カボロ・ラパはドイツ、オーストリア、イギリス、スペイン、そしてイタリア全土、さらにはトリポリ（リビア）や東地中海の一部でも栽培されるようになった¹。トリポリへの伝播は、ヴェネツィアやジェノヴァの商人を介した地中海貿易ルートによるものか、あるいはスペイン経由での伝播が考えられる。

この時期、名称の混乱も見られる。イタリアでは「Cavolo Rapa」が定着しつつあったが、一部では「Torso del Siam」（シャムの茎）という名称も使われていた¹³。植物名における「シャム（タイ）」や「インド」といった地名は、実際の原産地ではなく「異国風の」「奇妙な」という意味で付与されることが多く、当時のイタリア人にとってこの野菜がいかにもエキゾチックな外見を持っていたかを物語っている。

第4部：シチリアの飛地：エトナ山麓の「Cavolo Trunzo」

4.1 溶岩台地が生んだ固有種

イタリアにおいて、カボロ・ラパが単なる外来野菜としてではなく、地域のアイデンティティと深く結びついた伝統野菜として昇華された例がシチリアにある。カターニア県アチレアーレ（Acireale）周辺で栽培される「Cavolo Trunzo di Aci」（アチのトロソゾキャベツ）である。

この品種は、エトナ山の噴火による火山性土壌（terreni lavici）でのみ、その真価を発揮する。火山灰土壌はミネラル、特にカリウムや微量元素を豊富に含み、かつ排水性に優れている。前述の通り、カボロ・ラパは過湿を嫌うため、エトナ山麓の土壌環境は理想的であった¹⁴。

4.2 「Trunzo」の語源と社会史

「Trunzo（トロンゾ）」という呼称には、複数の起源説がある。

1. **スペイン語起源説:** シチリアがスペインのアラゴン家やブルボン家の支配下にあった時代の影響を受け、スペイン語で「茎」や「芯」を意味する *troncho*、あるいは「つまづく」を意味する *trompicar*（畑に突き出た球茎につまづくことから）に由来するという説¹⁵。
2. **方言・侮蔑語説:** カターニアの方言では、「Trunzu」は「頑固者」や「頭の固い人」を意味する侮蔑語としても使われる。カターニア市民が近隣のアチレアーレ市民を揶揄する際に「Testa di trunzo（トロンゾ頭）」と呼んだ歴史があり、野菜名と社会的ライバル関係が不可分に結びついている¹⁵。

4.3 スローフード・プレシディオと栽培技術

20世紀初頭までアチレアーレの農業を支える主要作物であったTrunzoは、戦後の農業近代化と都市化により絶滅の危機に瀕した。一般的なF1品種（ハイブリッド種）と比較して成長が遅く、球が小さいため、市場競争力を失ったのである。しかし、その独特の紫色の外皮と、生食でも甘い肉質が見直され、現在はスローフード協会のプレシディオ（味の箱舟）に認定されている¹⁴。

認定生産者（例：「Monaci delle Terre Nere」）は、以下の厳格な伝統農法を遵守している。

- **自家採種:** 遺伝的多様性を維持するため、農家自身が種を採り、選抜を行う。
- **手作業による除草:** 除草剤の使用は禁止。
- **限定的な灌漑:** 水を与えず、植物に軽度のストレスを与えることで糖度と風味を凝縮させる¹⁴。

収穫は秋（10月～11月）と春の二季に行われ、年間生産量はごくわずか（一部農園では1トン程度）に留まる希少な野菜である。

4.4 シチリアの食卓におけるTrunzo

シチリア料理において、Trunzoは単なる付け合わせではない。

- **Pasta co' Trunzu（トロンゾのパスタ）:** 最も象徴的な料理。肥大茎と柔らかい葉をトマト、ニンニク、オリーブオイルで煮込み、その煮汁でパスタ（ショートパスタやスパゲッティ）を茹でる。これにより、パスタに野菜の旨味と紫色が染み渡る¹⁶。
- **Stufato（蒸し煮）:** 水を加えずに野菜自身の水分で調理する方法。Trunzoは加熱しても煮崩れしにくいいため、この調理法に適している¹⁴。
- **生食:** スライスしてオリーブオイルと塩、レモンで和えるサラダ。火山性土壌由来のミネラル感と甘みが直接感じられる食べ方である。

第5部：プーリアの隠れた伝統：「Chepe de Murte」と「Grucciolo」

5.1 生物多様性のホットスポット

シチリアと並び、南イタリアのプーリア州（Puglia）もまた、カボロ・ラパの独自の遺伝資源を保持する重要な地域である。ここでは、一般的に知られる *Cime di rapa*（チーメ・ディ・ラーパ、カブの菜花）とは明確に区別され、独自の呼称体系を持つ。

- **Chepe de Murte（ケープ・デ・ムルテ）**：バーリ県周辺での呼び名。「死人の頭」を意味する（Chepe = Testa, Murte = Morto）¹⁹。葉を落とした白っぽい球茎が頭蓋骨を連想させること、あるいは死者の日（11月2日）の頃に収穫期を迎えることに由来すると考えられる。
- **Grucciolo（グルッチョロ）**：プティニャーノ（Putignano）周辺の在来種。商業品種よりも「野生的（rustico）」であり、風味が強く、多くの脇芽（figghiule）を出すのが特徴である¹⁹。

5.2 「Figghiule」の利用と農民の知恵

プーリアの食文化における最大の特徴は、肥大茎だけでなく、**Figghiule（フィッギウレ）**と呼ばれる脇芽や若い葉を積極的に利用する点にある¹⁹。北ヨーロッパの市場向け栽培では、球の形を整えるために脇芽は除去され廃棄されることが多いが、プーリアの貧しい農民料理（Cucina povera）の精神では、可食部を最大化することが優先された。

グルッチョロ種は、この脇芽が多発するように選抜されてきた可能性があり、これは植物全体を余すところなく利用する持続可能な農業システムの一端を示している。

5.3 プーリア料理における展開

プーリアでは、カボロ・ラパは以下のように調理される。

- **Fave e Foglie（空豆と葉）の変奏**：通常はチコリやエンダイブなどの苦味のある葉野菜と乾燥空豆のピューレを合わせるが、カボロ・ラパの葉や刻んだ茎が使われることもある。空豆の甘みとアブラナ科特有の辛味の対比が好まれる。
- **パスタとの組み合わせ**：オレキエッテなどの手打ちパスタと共に茹でられ、ニンニクと唐辛子（Peperoncino）、そして強烈な風味を持つコラティーナ種のオリーブオイルで仕上げられる²¹。ここではトマトを使わない「ビアンコ（白）」仕立てが主流であり、素材の味が強調される。

第6部：北イタリアとオーストリア・ハンガリー帝国の遺

産

6.1 ゲルマン文化圏との接点

北イタリア、特にトレンティーノ＝アルト・アディジェ（南チロル）、フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア、ヴェネトといった地域では、カボロ・ラパの受容史は南イタリアとは全く異なる文脈を持つ。ここでは、地中海の伝統よりも、アルプス以北のオーストリア・ドイツ文化圏の影響が色濃い。

ドイツ語の「Kohlrabi」がそのまま通用することも多く、料理法もバターやクリーム、ベーコン（Speck）を使用する内陸的なものである。寒冷な冬における保存野菜としての重要性は、カブやキャベツと同様に高かった。

6.2 「Brovada」を巡る誤解と真実

フリウリ地方には、DOP（原産地呼称保護）認定を受けている「**Brovada（プロヴァーダ）**」という伝統食品がある。これは、赤ワインの搾り滓（vinaccia）に野菜を漬け込んで発酵させたものであるが、文献によってはこれが「カボロ・ラパで作られる」と誤って記述されることがある。

正確には、Brovadaに使用されるのは特定の品種のカブ（*Brassica rapa* subsp. *rapa*の在来種）であり、*Brassica oleracea*であるカボロ・ラパではない²²。しかし、両者は同じ家庭菜園（orto）で冬野菜として混植されることが多く、名称や用途の混同が生じやすい。ヴェネトやフリウリの農村では、麦の収穫後の裏作として7月～8月に播種され、冬に収穫されるサイクルが伝統的であった²³。

6.3 北部の品種特性：ウィーン種の影響

マッティオリが16世紀に観察した「イタリアに新しく入ってきた」タイプは、おそらく現代の北イタリアで栽培されている品種の祖先である。これらは「White Vienna（白ウィーン）」や「Purple Vienna（紫ウィーン）」といった名称で国際的に流通している品種群に近い。

北イタリア産のカボロ・ラパは、南部のものと比較して水分が多く、肉質が緻密でマイルドである傾向がある。これは、霧が多く湿度の高いポー平原やアルプス山麓の気候適応の結果であり、生食よりもスープやシチューの具材としての適性を高めている。

第7部：イタリアにおける農業経済と栽培概況（EUの文脈）

7.1 生産と流通の地理学

現代のEU市場において、最大の生産・消費国は依然としてドイツである（年間約4万トン以

上)。イタリアは、このドイツ市場への重要な供給拠点としての役割を担っている²⁴。

- **季節的優位性:** ドイツやオランダでは冬期の露地栽培が困難であるのに対し、南イタリア（シチリア、プーリア、カンパニア）は温暖な冬を利用して11月から3月にかけて収穫が可能である。この「端境期」の輸出が、イタリアの生産を支える経済的柱となっている。
- **スペインとの競合:** 近年、スペインもまた冬期の輸出用コールラビ生産を拡大しており、EU市場におけるイタリアの強力なライバルとなっている²⁴。

7.2 種苗産業と生物多様性の危機

エミリア＝ロマーニャ州などは、ヨーロッパにおける重要な種子生産拠点（採種地）であるが、商業流通している種子の多くはF1ハイブリッドである。これらは均一性、肥大速度、耐病性に優れる一方で、地域固有の風味や特性（例：Trunzoの紫色の濃さやGruccioloの野性味）を犠牲にしている場合がある。

スローフード協会やプーリア大学の「BiodiverSO」プロジェクトの取り組みは、単なる懐古趣味ではなく、気候変動に対応しうる遺伝資源（耐乾性や低投入栽培への適性）を確保するという点でも、現代的な意義を持っている¹⁴。

第8部：美食学と栄養人類学的考察

8.1 「生」と「加熱」の二分法

イタリアにおけるカボロ・ラパの消費形態は、南北で興味深い対比を見せる。

- **北部（加熱文化）:** スープの具材、ベシャメルソース煮込み、バターソテーなど、完全に火を通す調理法が主流。これは繊維質を軟化させ、ジャガイモの代替としての役割を果たす。
- **南部（生食文化）:** ピンツィモニオ（生野菜スティック）やサラダとしての消費が根強い。マッティオリが1554年に記した「油、塩、胡椒」という食べ方は、現代の南イタリアの食卓に直結している¹²。レモン汁を加えることで鉄分の吸収を助けるという栄養学的な理に適った食べ方でもある。

8.2 アルトゥージと中産階級の食卓

イタリア料理の父と呼ばれるペッレグリーノ・アルトゥージ（Pellegrino Artusi）の著書『料理の科学と美食の技法』（1891年）においても、カボロ・ラパは言及されている。

- **レシピ587番の誤解:** アルトゥージのレシピ番号587「Dolce Tedesco（ドイツの菓子）」がカボロ・ラパの料理と混同されることがあるが、これは材料リストの読み間違いや検索インデックスの不備によるものである可能性が高い²⁵。
- **実際の記述:** アルトゥージは「田舎風サラダ（Insalata di campagna）」などの文脈でカボロ・ラパに触れており、スープの具材としても認知していた²⁷。彼がこの野菜を取り上げたことは、19世紀末のイタリア中産階級の食卓において、カボロ・ラパがある程度の市民

権を得ていた（あるいは啓蒙の対象であった）ことを示している。

8.3 栄養的側面と機能性

カボロ・ラパは、ビタミンC（アスコルビン酸）の含有量が非常に高く、歴史的に冬季の壊血病予防に寄与してきた。また、アブラナ科特有のグルコシノレートを含み、これが酵素（ミロシナーゼ）によって分解されることでイソチオシアネートとなる。イタリアの伝統的な生食習慣は、加熱によるミロシナーゼの失活を防ぎ、この機能性成分を効率的に摂取できる方法であると言える。

結論：周縁から中心へ

イタリアにおけるCavolo rapaの歴史は、古代ローマの「コリントスのカブ」から始まり、中世の断絶を経て、ルネサンス期に北からの「帰還者」として再定着するという、数奇な軌跡を辿ってきた。それは、マッティオリが驚きを持って記述した異国の野菜から、シチリアの火山灰土やプーリアの石灰質土壤に根付いた郷土の味へと変貌を遂げた。

北イタリアの標準化された輸出用コールラビと、南イタリアの「Trunzo」や「Chepe de Murte」のような在来種は、同じ植物種でありながら、全く異なる文化的・歴史的背景を背負っている。前者が欧州市場経済の論理で動く商品であるならば、後者はイタリアの地方主義（Campanilismo）と生物多様性を体現する文化遺産である。

今日、ヴィーガン料理の流行やヌーベル・キュイジーヌ（シェフによる再評価）により、カボロ・ラパは再び脚光を浴びつつある。かつて「貧者の食」や「家畜の飼料」と見なされることもあったこの野菜は、その歴史的深淵と独特のテロワールを通じて、イタリア野菜の多様性を語る上で欠かせない存在となっているのである。

データ表：主要なイタリア在来品種と特性

品種・呼称	地域	特徴	用途・特記事項
Trunzo di Aci	シチリア（アチレアーレ）	紫色の皮、小型、甘みが強い	スローフード・プレシディオ。パスタ、煮込み、生食。
Chepe de Murte	プーリア（バーリ）	「死人の頭」の意。中型～大型	パスタ、茹で野菜。名称は晩秋の収穫期に由来。

Grucciolo	プーリア（プティニャーノ）	野性的、脇芽（Figghiule）が多い	脇芽も食用とする。風味が強く、オリーブオイルと合う。
Cavolo Rapa (Standard)	北イタリア（ヴェネト等）	淡緑色（White Vienna系）、均一	スープ、シチュー、輸出用。ドイツ市場向けが主。

参考文献ID一覧

本報告書の作成にあたり、以下の資料を参照した：

1

引用文献

1. Kohlrabi, Purple Vienna - Harvesting History, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.harvesting-history.com/product/kohlrabi-purple-vienna/>
2. Distinctive, Often-Overlooked Veggies - Piedmont Master Gardeners, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://piedmontmastergardeners.org/article/distinctive-often-overlooked-veggies/>
3. Full text of "Journal of the Royal Horticultural Society of London" - Internet Archive, 1月 31, 2026にアクセス、
https://archive.org/stream/journalofroyalho34roya/journalofroyalho34roya_djvu.txt
4. Brassica oleracea - Wikipedia, 1月 31, 2026にアクセス、
https://en.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea
5. Cavolo rapa - Cortobio, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.cortobio.it/wikibio/cavolo-rapa/>
6. the natural history of pliny. - Project Gutenberg, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.gutenberg.org/files/61113/61113-h/61113-h.htm>
7. Full text of "The natural history of Pliny" - Internet Archive, 1月 31, 2026にアクセス、
https://archive.org/stream/naturalhistoryp02bostgoog/naturalhistoryp02bostgoog_djvu.txt
8. February 2008 - Flavors of the Sun, 1月 31, 2026にアクセス、
<http://flavorsofthesun.blogspot.com/2008/02/>
9. Coconut The Soul Food of The Tropics and Vegetarian Recipes 2004 | PDF - Scribd, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.scribd.com/document/233169577/Coconut-the-Soul-Food-of-the-Tropics-and-Vegetarian-Recipes-2004>
10. AVVERTENZE RELATIVE ALLA REDAZIONE DELLA TESI DI DOTTORATO, 1月 31,

- 2026にアクセス、
https://www.research.unipd.it/retrieve/e14fb26f-a49d-3de1-e053-1705fe0ac030/Tesi_Dottorato_Michele_Maritan.pdf
11. Kohlrabi - Wikipedia, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://en.wikipedia.org/wiki/Kohlrabi>
 12. CIVILTÀDELLATAVOLA - Accademia Italiana della Cucina, 1月 31, 2026にアクセス、
https://www.accademiaitalianadellacucina.it/sites/default/files/rivista_pdf/243_ita.pdf
 13. Vincenzo Farina - La Flora Sicula | PDF - Scribd, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://it.scribd.com/doc/207262145/Vincenzo-Farina-La-Flora-Sicula>
 14. Il cavolo trunzu di Aci, presidio Slow Food, protagonista nella cucina ..., 1月 31, 2026にアクセス、
<https://rossettoecioccolato.net/il-cavolo-trunzu-di-aci-presidio-slow-food-protagonista-in-tavola/>
 15. Eccellenze Slow Food / Storia, sapori e rinascita del Cavolo Trunzo ..., 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.vdj.it/eccellenze-slow-food-storia-sapori-e-rinascita-del-cavolo-trunzo-di-aci/>
 16. Pasta con cavolo rapa siciliano o cavolo trunzo di Acireale - a zucchero zero, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://blog.giallozafferano.it/azuccherozero/ricetta-pasta-con-cavolo-rapa-siciliano-o-cavolo-trunzo-di-acireale/>
 17. Quadrotti con foglie di Cavolo Rapa viola e Ceci - The Kitchen Tube, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://thekitchentube.com/kohlrabikichererbsen/>
 18. Pasta con i cavoli...eh che cavolo! - buccia di limone, 1月 31, 2026にアクセス、
<http://www.bucciadilimone.it/2011/07/eh-che-cavolo.html>
 19. In tutta la provincia di Bari, il cavolo rapa è conosciuto con il nome di “chepe de murte” (con la “... - BiodiverSO, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://biodiversitapuglia.it/fbpost/in-tutta-la-provincia-di-bari-il-cavolo-rapa-e-conosciuto-con-il-nome-di-chepe-de-murte-con-la/>
 20. Chêpe de murte - PAT Puglia, 1月 31, 2026にアクセス、
https://www.patpuglia.it/it/12/Ch%C3%AApe_de_murte/3_327_N
 21. newsletter Dicembre 2014 - Gennaio 2015 - Biodiversità Puglia, 1月 31, 2026にアクセス、
http://biodiversitapuglia.it/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=11
 22. Brassica rapa L. subsp. rapa - Sistema informativo sulla flora delle Alpi Carniche meridionali (Ampezzo-Sauris) - UniTS, 1月 31, 2026にアクセス、
https://dryades.units.it/ampezzosauris/index.php?procedure=taxon_page&id=1652&num=823
 23. Econarrazioni - Mnemoteca del Basso Sarca, 1月 31, 2026にアクセス、
<https://www.mnemoteca-bs.it/wp-content/uploads/2025/07/5.-2013-EconarrazioniTesto.pdf>
 24. Brassica oleracea var. gongylodes (kohlrabi) | CABI Compendium, 1月 31, 2026に

アクセス、

<https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.1079/cabicompendium.10107>

25. Dolce tedesco ricetta n 587 del mitico Artusi - buccia di limone, 1月 31, 2026にアクセス、

<http://www.bucciadilimone.it/2020/10/dolce-tedesco-ricetta-n-587-del-mitico.html>

26. 587. DOLCE TEDESCO | Pellegrino Artusi, 1月 31, 2026にアクセス、

<https://www.pellegrinoartusi.it/587-dolce-tedesco/>

27. INSALATA DI CAMPAGNA - RistoReggio, 1月 31, 2026にアクセス、

https://www.ristoreggio.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3990&Itemid=245

28. Il cavolo trunzo di Aci, un ortaggio speciale da riscoprire. Come utilizzarlo in cucina - Terrà, 1月 31, 2026にアクセス、

<https://terra.regione.sicilia.it/il-cavolo-trunzo-di-aci-un-ortaggio-speciale-da-riscoprire-come-utilizzarlo-in-cucina/>