
Estimação Bayesiana em Modelos Lineares com Aplicações em Economia

Trabalho de Conclusão de Curso

Aishameriane Schmidt
Orientador Prof. Fernando Pozzobon

UDESC - ESAG Graduação em Ciências Econômicas

Fevereiro de 2018.









Estimação Bayesiana em Modelos Lineares com Aplicações em Economia

Inferência Bayesiana

O modelo de regressão linear normal

Resultados analíticos

Resultados de simulação

Aplicação com dados do mercado de trabalho

Definições de Probabilidade

Empírica ou Clássica

Número de ocorrências de um fenômeno em n repetições de um experimento

Axiomática

Probabilidade como uma função que satisfaz os três axiomas de Kolmogorov

Subjetiva

Representação de uma crença, pode ser atribuída a tudo que é incerto ou desconhecido

Definições de Básicas

 Densidade à Priori: Uma densidade que representa a crença a respeito do parâmetro antes de observar os dados;

Definições de Básicas

- Densidade à Priori: Uma densidade que representa a crença a respeito do parâmetro antes de observar os dados;
- Função de Verossimilhança: Contém toda a informação que os dados observados carregam a respeito do parâmetro;

Definições de Básicas

- Densidade à Priori: Uma densidade que representa a crença a respeito do parâmetro antes de observar os dados;
- Função de Verossimilhança: Contém toda a informação que os dados observados carregam a respeito do parâmetro;
- ▶ Densidade à Posteriori: É obtida a partir da combinação da Priori com a Verossimilhança utilizando o Teorema de Bayes.
 - Intuitivamente, é o que se sabe a respeito do parâmetro após atualizar a priori com as informações trazidas pela verossimilhança.

O teorema de Bayes

Sejam A e B dois eventos dentro de um mesmo espaço de amostral com $\mathbb{P}(B) \neq 0$, então,

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$$
(1)

O teorema de Bayes

Sejam A e B dois eventos dentro de um mesmo espaço de amostral com $\mathbb{P}(B) \neq 0$, então,

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$$
 (1)

Se y representa um vetor de dados que segue uma densidade de probabilidade cujo vetor de parâmetros é θ , então, usando (1), podemos escrever:

$$\mathbb{P}(\theta|y) = \frac{\mathbb{P}(y|\theta) \quad \mathbb{P}(\theta)}{\mathbb{P}(y)}$$
posteriori
$$\mathbb{P}(y) \quad \mathbb{P}(y)$$
f.d.p. marginal (constante)

Um exemplo

Uma moeda é lançada 3 vezes e desejamos saber informações a respeito do parâmetro θ , que representa a probabilidade de sair cara.

Um exemplo

Uma moeda é lançada 3 vezes e desejamos saber informações a respeito do parâmetro θ , que representa a probabilidade de sair cara.

► A verossimilhança é calculada a partir da distribuição de Binomial;

Um exemplo

Uma moeda é lançada 3 vezes e desejamos saber informações a respeito do parâmetro θ , que representa a probabilidade de sair cara.

- ► A verossimilhança é calculada a partir da distribuição de Binomial;
- ightharpoonup Na estimação clássica, sabemos que o EMV de θ é a média amostral
 - Ou seja, caso sejam observadas 3 caras, teremos

$$\hat{\theta}_{MV} = \frac{\sum_{i=1}^{3} y_i}{3} = \frac{3}{3} = 1$$

Um exemplo

Uma moeda é lançada 3 vezes e desejamos saber informações a respeito do parâmetro θ , que representa a probabilidade de sair cara.

- ► A verossimilhança é calculada a partir da distribuição de Binomial;
- lacktriangle Na estimação clássica, sabemos que o EMV de θ é a média amostral
 - Ou seja, caso sejam observadas 3 caras, teremos

$$\hat{\theta}_{MV} = \frac{\sum_{i=1}^{3} y_i}{3} = \frac{3}{3} = 1$$

Será que temos informação suficiente para concluir que a probabilidade de sair cara nesta moeda é igual a 1?

Um exemplo (contin.)


 \blacktriangleright Podemos considerar que θ é uma quantia aleatória e escolher uma densidade a priori:

- ▶ Podemos considerar que θ é uma quantia aleatória e escolher uma densidade a priori:
 - ► Como θ é uma probabilidade, deve estar entre zero e um;

- ▶ Podemos considerar que θ é uma quantia aleatória e escolher uma densidade a priori:
 - ightharpoonup Como θ é uma probabilidade, deve estar entre zero e um;
 - Além disso, vamos supôr que θ assume *qualquer* valor neste intervalo;

- Podemos considerar que θ é uma quantia aleatória e escolher uma densidade a priori:
 - Como θ é uma probabilidade, deve estar entre zero e um;
 - ightharpoonup Além disso, vamos supôr que θ assume *qualquer* valor neste intervalo;
 - Vamos assumir a moeda é (possivelmente) honesta, isto é, acreditamos que θ tem uma maior "chance" de ser 50%.

- Podemos considerar que θ é uma quantia aleatória e escolher uma densidade a priori:
 - Como θ é uma probabilidade, deve estar entre zero e um;
 - ► Além disso, vamos supôr que θ assume *qualquer* valor neste intervalo;
 - Vamos assumir a moeda é (possivelmente) honesta, isto é, acreditamos que θ tem uma maior "chance" de ser 50%.



Um exemplo (contin.)


A combinação de uma priori Beta $(\underline{\alpha}, \underline{\beta})$ com uma verossimilhança que vem de uma densidade Binomial (n, θ) resulta em uma posteriori Beta com parâmetros $\bar{\alpha} = (\underline{\alpha} + \sum y_i)$ e $\bar{\beta} = (\underline{\beta} + n - \sum y_i)$.

- ▶ A combinação de uma priori Beta($\underline{\alpha}$, $\underline{\beta}$) com uma verossimilhança que vem de uma densidade Binomial(n, θ) resulta em uma posteriori Beta com parâmetros $\bar{\alpha} = (\underline{\alpha} + \sum y_i)$ e $\bar{\beta} = (\beta + n \sum y_i)$.
- ▶ No exemplo das moedas, assumindo $\underline{\alpha} = \underline{\beta} = 10$, n = 3 e $\sum y_i = 3$, temos que a posteriori para θ é uma densidade Beta(13,10).

- A combinação de uma priori Beta $(\underline{\alpha}, \underline{\beta})$ com uma verossimilhança que vem de uma densidade Binomial (n, θ) resulta em uma posteriori Beta com parâmetros $\bar{\alpha} = (\underline{\alpha} + \sum y_i)$ e $\bar{\beta} = (\beta + n \sum y_i)$.
- No exemplo das moedas, assumindo $\underline{\alpha} = \underline{\beta} = 10$, n = 3 e $\sum y_i = 3$, temos que a posteriori para θ é uma densidade Beta(13,10).
- ► Consequentemente, $\mathbb{E}[\theta|y] = \frac{\bar{\alpha}}{\bar{\alpha} + \bar{\beta}} = \frac{13}{23} \approx 0.57$

- ▶ A combinação de uma priori Beta($\underline{\alpha}$, $\underline{\beta}$) com uma verossimilhança que vem de uma densidade Binomial(n, θ) resulta em uma posteriori Beta com parâmetros $\bar{\alpha} = (\underline{\alpha} + \sum y_i)$ e $\bar{\beta} = (\beta + n \sum y_i)$.
- No exemplo das moedas, assumindo $\underline{\alpha} = \underline{\beta} = 10$, n = 3 e $\sum y_i = 3$, temos que a posteriori para θ é uma densidade Beta(13,10).
- ▶ Consequentemente, $\mathbb{E}[\theta|y] = \frac{\bar{\alpha}}{\bar{\alpha}+\bar{\beta}} = \frac{13}{23} \approx 0.57$
 - Vantagens da abordagem bayesiana (neste exemplo): é menos suscetível ao excesso de ajuste que o EMV; podemos incorporar (de forma fácil) novos dados para atualização da priori quando lançarmos a moeda mais vezes.

Ideias básicas



Ideias básicas - baseado em [Koop, 2003]

O modelo básico de regressão linear múltipla em forma matricial é escrito como:

$$Y = X\beta + \varepsilon \tag{3}$$

Onde:

- ► Y é *N* × 1;
- ► Xén×k;
- ▶ β é k × 1
- ▶ ε é *N* × 1.

Ideias básicas - baseado em [Koop, 2003]

O modelo básico de regressão linear múltipla em forma matricial é escrito como:

$$Y = X\beta + \varepsilon \tag{3}$$

Onde:

- ► Y é *N* × 1;
- ► Xén×k:
- β é k × 1
- ► εéN×1.

Duas suposições básicas:

- $\triangleright \varepsilon \sim \mathcal{N}(0_N, \mathbb{I} \cdot h^{-1}) \text{ com } h^{-1} = \sigma^2;$
- Os elementos de X são fixos ou, no caso de aleatórios, são independentes de h e β.

Resultados analíticos

Utilizando uma verossimilhança normal multivariada com uma densidade à priori para β (condicional a h) também normal e uma priori Gama para h, é possível mostrar que a posteriori conjunta de β e h é uma densidade Normal-Gama.

Resultados analíticos

Utilizando uma verossimilhança normal multivariada com uma densidade à priori para β (condicional a h) também normal e uma priori Gama para h, é possível mostrar que a posteriori conjunta de β e h é uma densidade Normal-Gama.


▶ A densidade marginal posterior de β é uma t multivariada;

Resultados analíticos


Utilizando uma verossimilhança normal multivariada com uma densidade à priori para β (condicional a h) também normal e uma priori Gama para h, é possível mostrar que a posteriori conjunta de β e h é uma densidade Normal-Gama.

- ► A densidade marginal posterior de β é uma t multivariada;
- ► A densidade preditiva para um novo valor *y** também segue uma distribuição *t* multivariada.

Simulações



Simulações



Simulações - Principais resultados

 A priori com o valor correto dos parâmetros e baixa variância serviu como "melhor cenário possível" para comparações com os demais resultados;

Simulações - Principais resultados

- A priori com o valor correto dos parâmetros e baixa variância serviu como "melhor cenário possível" para comparações com os demais resultados;
- Foram utilizadas as médias da densidade a posteriori de β para comparar com a estimativa de MQO usando o EQM;

Simulações - Principais resultados

- A priori com o valor correto dos parâmetros e baixa variância serviu como "melhor cenário possível" para comparações com os demais resultados;
- Foram utilizadas as médias da densidade a posteriori de β para comparar com a estimativa de MQO usando o EQM;
- Valores amostrais grandes implicaram convergência dos resultados para os valores de MQO;

O modelo de regressão linear Normal

Simulações - Principais resultados

- A priori com o valor correto dos parâmetros e baixa variância serviu como "melhor cenário possível" para comparações com os demais resultados;
- Foram utilizadas as médias da densidade a posteriori de β para comparar com a estimativa de MQO usando o EQM;
- Valores amostrais grandes implicaram convergência dos resultados para os valores de MQO;
- Para amostras pequenas, as estimativas bayesianas em média tinham valores melhores, porém ainda assim apresentavam alto EQM;

O modelo de regressão linear Normal

Simulações - Principais resultados

- A priori com o valor correto dos parâmetros e baixa variância serviu como "melhor cenário possível" para comparações com os demais resultados;
- Foram utilizadas as médias da densidade a posteriori de β para comparar com a estimativa de MQO usando o EQM;
- Valores amostrais grandes implicaram convergência dos resultados para os valores de MQO;
- Para amostras pequenas, as estimativas bayesianas em média tinham valores melhores, porém ainda assim apresentavam alto EQM;
- Nas simulações com erro de medida a priori com valores distantes dos verdadeiros e alta variância apresentou melhores resultados.

Motivação e Hipótese

▶ O salário de um indivíduo é função de suas características individuais (experiência, escolaridade, produtividade, etc) e também de fatores externos (piso salarial, competitividade entre as empresas, dentre outros).

Motivação e Hipótese

➤ O salário de um indivíduo é função de suas características individuais (experiência, escolaridade, produtividade, etc) e também de fatores externos (piso salarial, competitividade entre as empresas, dentre outros).

Hipótese

Isoladas as características individuais, **não** deveria haver diferenciação de salário entre homens e mulheres que ocupam os mesmos tipos de cargos.

Revisão de Literatura

[Bonini and Pozzobon, 2016] utilizaram um modelo de regressão linear múltipla para investigar os salários e características individuais de trabalhadores da área de tecnologia da informação (TI) e trabalhadores da indústria nos três estados da Região Sul do Brasil no ano de 2011.

Revisão de Literatura

[Bonini and Pozzobon, 2016] utilizaram um modelo de regressão linear múltipla para investigar os salários e características individuais de trabalhadores da área de tecnologia da informação (TI) e trabalhadores da indústria nos três estados da Região Sul do Brasil no ano de 2011.

Controlados os demais fatores, seus resultados mostraram que as mulheres em Santa Catarina que trabalhavam área de TI recebiam, em média, um salário 15% inferior ao dos homens.

Modelo Econométrico

In(salário) =
$$\beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Sup. Inc.} + \beta_2 \cdot \text{Sup. Comp.} + \beta_3 \cdot \text{Pós-Grad.}$$

+ $\beta_4 \cdot \text{Idade} + \beta_5 \cdot \text{Idade}^2 + \beta_6 \cdot \text{T. Emp.} + \beta_7 \cdot \text{Gênero} + \varepsilon$ (4)

Base de dados

- ▶ Dados de salário, idade, escolaridade, tempo de emprego e gênero de 4318 trabalhadores retirados da RAIS:
- ► Setor de tecnologia da informação do Estado de Santa Catarina;
- ► Ano de 2011.

Decrição da amostra

Tabela 3 – Estatísticas descritivas das variáveis quantitativas do modelo

	$\ln({\rm Sal\acute{a}rio\text{-}Hora})^*$	Tempo de Emprego †	$\mathrm{Idade}^{\star\star}$	$(Idade)^2$
Nº de Observações	4318	4318	4318	4318
Mínimo	1.38	0.10	17.00	289.00
1^o quartil	3.78	9.70	26.00	676.00
Mediana	4.22	16.90	29.00	841.00
Média	4.21	34.59	30.58	989.10
3^o quartil	4.60	37.10	34.00	1156
Máximo	7.32	433.40	72.00	5184
Desvio Padrão	0.69	54.26	7.35	527.32

^{*} O salário-hora é medido em reais (R\$) de 2011 e ln(Salário-Hora) denota seu logaritmo na base neperiana.


† Tempo de emprego é medido em meses.

Fonte – Elaboração própria utilizando dados da RAIS de trabalhadores de setores de TI no estado de Santa Catarina para o ano de 2011.

^{**} Idade é medida em anos e, consequentemente, idade ao quadrado, denotada por (Idade)², tem como unidade anos ao quadrado.

Decrição da amostra


Figura 4 – Histograma do logaritmo do salário hora dos trabalhadores de TI do Estado de Santa Catarina para o ano de 2011



Fonte – Elaboração própria com base nos dados da RAIS.

Decrição da amostra

Figura 5 – Gráficos de dispersão das variáveis explicativas quantitativas contra a variável explicada no modelo



(a) Distribuição da idade e logaritmo do salário (b) Distribuição do tempo de emprego e logahora ritmo do salário hora

Fonte – Elaboração própria com base nos dados da RAIS.

Decrição da amostra

Tabela 5 – Proporções nas categorias das variáveis categóricas incluídas no modelo

	\mathbf{Sim}		Não	
	n	%	\mathbf{n}	%
Homem*	3285	76,08	1033	23,92
Ensino superior incompleto [†]	697	16,14	3621	83,86
Ensino superior completo [†]	3201	74,13	1117	25,87
Pós graduação [†]	29	0,0067	4289	99,33


^{*} A categoria "Homem" é considerada a categoria base para a variável do modelo "Gênero".

Fonte – Elaboração própria utilizando dados da RAIS de trabalhadores de setores de TI no estado de Santa Catarina para o ano de 2011.

[†] As variáveis de escolaridade representam o grau de escolaridade máximo do indivíduo, isto é, uma pessoa que tenha cursado até o primeiro ano da faculdade terá "Sim" para ensino superior incompleto e "Não" para ensino superior completo e pós graduação. A categoria base da variável escolaridade é "Ensino Médio".

Decrição da amostra


Figura 6 – Boxplot do logaritmo do salário hora estratificado por gênero para trabalhadores de TI no Estado de Santa Catarina no ano de 2011




Fonte – Elaboração própria com base nos dados da RAIS.

Decrição da amostra

Figura 7 - Boxplots do logaritmo do salário hora por escolaridade máxima para trabalhadores de TI no Estado de Santa Catarina no ano de 2011



- (a) Distribuição do logaritmo do salário hora (b) Dist. do log. do salário hora para trabalhapara trabalhadores que cursaram até o ensino médio versus os demais trabalhadores
- dores que cursaram até o ensino superior incompleto versus os demais trabalhadores



- dores que cursaram até o final do ensino superior versus os demais trabalhadores
- para trabalhadores que finalizaram pós graduação versus os demais trabalhadores

Fonte – Elaboração própria com base nos dados da RAIS.

Coeficientes estimados

Tabela 6 – Valores estimados usando MQO e o método bayesiano com priori normal gama conjugada

Parâmetro	Priori	MQO	D.P. MQO	Posteriori	D.P. Posteriori	IC95%	$P(\bar{\beta}_j \ge 0)$
Constante	2.0712	1.49258	0.1238	1.49286	0.1249	[1.2481; 1.7376]	>0.9999
Sup. Inc	0.1227	0.09413	0.0368	0.09411	0.0371	[0.0213; 0.1669]	0.99438
Sup. Comp.	0.4487	0.3738	0.0319	0.37381	0.0321	[0.3108; 0.4368]	> 0.9999
Pós	1.0708	1.07101	0.1124	1.07102	0.1134	[0.8487; 1.2934]	> 0.9999
Idade	0.1285	0.11962	0.0072	0.11961	0.0073	[0.1053 ; 0.1339]	> 0.9999
$Idade^2$	-0.0014	-0.00132	0.0001	-0.00132	0.0001	[-0.0015; -0.0011]	< 0.0001
Temp. Emp.	0.0027	0.00252	0.0002	0.00252	0.0002	[0.0021; 0.0029]	> 0.9999
Gênero	-0.1537	-0.13239	0.0208	-0.13239	0.0210	[-0.1736 ; -0.0912]	< 0.0001

Fonte – Elaboração própria.

Previsão fora da amostra

Tabela 8 – Valores reais e previstos usando os dois métodos de previsão, para os 10 indivíduos fora da amostra

Indivíduo	Valor Real	Est. Bayesiana	Int. Cred. 95%	MQO	$\rm IC95\%$
4010	4.64957	4.30780	[3.6324; 4.9832]	4.30780	[3.1675; 5.4481]
1268	4.72352	4.15277	[3.4773 ; 4.8282]	4.15276	[3.0124 ; 5.2931]
3634	4.77206	4.08010	[3.4045; 4.7557]	4.08009	[2.9397 ; 5.2205]
810	3.89796	3.77543	[3.0990; 4.4519]	3.77539	[2.6343; 4.9165]
3204	3.32079	3.49967	[2.8229; 4.1765]	3.49965	[2.3582; 4.6411]
1	3.46981	3.96341	[3.2863; 4.6405]	3.96341	[2.8217; 5.1051]
662	4.17107	4.18760	[3.5121; 4.8631]	4.18759	[3.0473 ; 5.3279]
2015	3.76843	3.83802	[3.1618; 4.5142]	3.83800	[2.6971; 4.9789]
671	3.29927	3.69954	[3.0228; 4.3763]	3.69949	[2.5581; 4.8409]
2413	6.69687	5.13866	[4.4397 ; 5.8376]	5.13868	[3.9787; 6.2987]

Fonte – Elaboração própria.

Resultados da estimação e previsão

► As estimativas bayesianas se aproximaram das estimativas de MQO (convergência pelo n elevado);

- ► As estimativas bayesianas se aproximaram das estimativas de MQO (convergência pelo n elevado);
- Os testes de hipótese dos coeficientes estimados têm conclusões condizentes com a literatura;

- ► As estimativas bayesianas se aproximaram das estimativas de MQO (convergência pelo n elevado);
- Os testes de hipótese dos coeficientes estimados têm conclusões condizentes com a literatura;
- ► Nas previsões, as estimativas bayesianas apresentaram intervalos de credibilidade mais estreitos que as estimativas de MQO;

- ► As estimativas bayesianas se aproximaram das estimativas de MQO (convergência pelo n elevado);
- Os testes de hipótese dos coeficientes estimados têm conclusões condizentes com a literatura;
- Nas previsões, as estimativas bayesianas apresentaram intervalos de credibilidade mais estreitos que as estimativas de MQO;
- Ambos métodos erraram a previsão para o indivíduo com características muito diferentes do restante da amostra;

- ► As estimativas bayesianas se aproximaram das estimativas de MQO (convergência pelo n elevado);
- Os testes de hipótese dos coeficientes estimados têm conclusões condizentes com a literatura;
- Nas previsões, as estimativas bayesianas apresentaram intervalos de credibilidade mais estreitos que as estimativas de MQO;
- Ambos métodos erraram a previsão para o indivíduo com características muito diferentes do restante da amostra;
- A análise de ajuste do modelo revelou erros com caudas pesadas.

- ► Foi apresentado o modelo de regressão linear normal com priori conjugada natural;
 - Os principais resultados analíticos foram demonstrados;

- Foi apresentado o modelo de regressão linear normal com priori conjugada natural;
 - Os principais resultados analíticos foram demonstrados;
 - Realizaram-se experimentos com valores simulados para verificar a sensibilidade das estimativas frente a mudanças na priori, variáveis explicativas, especificação do modelo e presença de erro de medida, comparando as estimativas bayesianas com o estimador de MQO;

- ► Foi apresentado o modelo de regressão linear normal com priori conjugada natural;
 - Os principais resultados analíticos foram demonstrados;
 - Realizaram-se experimentos com valores simulados para verificar a sensibilidade das estimativas frente a mudanças na priori, variáveis explicativas, especificação do modelo e presença de erro de medida, comparando as estimativas bayesianas com o estimador de MQO;
 - Utilizando dados do trabalho de [Bonini and Pozzobon, 2016], replicou-se o artigo original.

► Métodos bayesianos em economia são uma ferramenta poderosa que possibilitaram avanços importantes em pesquisas acadêmicas, Bancos Centrais, etc;

- Métodos bayesianos em economia são uma ferramenta poderosa que possibilitaram avanços importantes em pesquisas acadêmicas, Bancos Centrais, etc;
- São uma alternativa aos métodos clássicos, especialmente em aplicações de alta dimensão onde o tratamento da função de verossimilhança é difícil (ou impossível);

- Métodos bayesianos em economia são uma ferramenta poderosa que possibilitaram avanços importantes em pesquisas acadêmicas, Bancos Centrais, etc;
- São uma alternativa aos métodos clássicos, especialmente em aplicações de alta dimensão onde o tratamento da função de verossimilhança é difícil (ou impossível);
- ► Possibilitam incorporar conhecimento a priori;

- Métodos bayesianos em economia são uma ferramenta poderosa que possibilitaram avanços importantes em pesquisas acadêmicas, Bancos Centrais, etc;
- São uma alternativa aos métodos clássicos, especialmente em aplicações de alta dimensão onde o tratamento da função de verossimilhança é difícil (ou impossível);
- Possibilitam incorporar conhecimento a priori;
- Não são tão sensíveis ao tamanho da amostra como métodos clássicos;

- Métodos bayesianos em economia são uma ferramenta poderosa que possibilitaram avanços importantes em pesquisas acadêmicas, Bancos Centrais, etc;
- São uma alternativa aos métodos clássicos, especialmente em aplicações de alta dimensão onde o tratamento da função de verossimilhança é difícil (ou impossível);
- ► Possibilitam incorporar conhecimento a priori;
- Não são tão sensíveis ao tamanho da amostra como métodos clássicos;
- ► Permitem atualização dos modelos de forma mais direta e iterativa.

Estimação Bayesiana em Modelos Lineares com Aplicações em Economia

Trabalho de Conclusão de Curso

Aishameriane Schmidt
Orientador Prof. Fernando Pozzobon

UDESC - ESAG Graduação em Ciências Econômicas

Fevereiro de 2018.

aishameriane@gmail.com

Referências



Bonini, P. and Pozzobon, F. (2016). Discriminação salarial feminina e o prêmio salarial de ti na indústria. *Análise Econômica (UFRGS)*, 34:193–223.



Koop, G. (2003). *Bayesian econometrics*. Wiley.