

ДЕКСАЛЕКА – СТЕРОИДНОЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО



COCTAB

4 мг дексаметазона натрия фосфата = 3 мг дексаметазона



ДЕКСАЛЕКА – раствор для инъекций,

в 1 мл которого содержится

3 мг ДЕКСАМЕТАЗОНА




УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН





ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ОБМЕН





БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН




Снижает количество альбуминов в плазме



Повышает синтез альбуминов в печени



Повышает катаболизм белка в мышцах






ПРОТИВОВОСПАИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

УГНЕТАЕТ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ МЕДИАТОРОВ ВОСПАЛЕНИЯ ТУЧНЫМИ КЛЕТКАМИ И ЭОЗИНОФИЛАМИ

ИНГИБИРУЕТ СИНТЕЗ ПРОСТАГЛАНДИНОВ НА УРОВНЕ АРАХИДОНОВОЙ КИСЛОТЫ



ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ КЛЕТОЧНОЙ МЕМБРАНЫ К ДЕЙСТВИЮ ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФАКТОРОВ



ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ


СНИЖЕНИЕ СИНТЕЗА И СЕКРЕЦИИ МЕДИАТОРОВ АЛЛЕРГИИ: гистамин, гепарин, серотонин

СНИЖАЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТОРНЫХ КЛЕТОК К МЕДИАТОРАМ АЛЛЕРГИИ

ИЗМЕНЕНИЯ ИММУННОГО ОТВЕТА ОРГАНИЗМА



ДЕКСАЛЕКА







вид животных	ЗАБОЛЕВАНИЕ	ДОЗЫ ПРЕПАРАТА
Крупный рогатый скот	Родильный парез Кетоз Мастит Ушиб Артрит Бурсит Миозит Лимфоэкстравазат Анафилактический шок Укусы змей	4 – 8,5 мл на 500 кг массы тела





вид животных

ЗАБОЛЕВАНИЕ

ДОЗЫ ПРЕПАРАТА

Лошади

Артрит

Бурсит

Миозит

Ламинит

Анафилактический шок

Ушиб

Укусы змей

4 - 8,5 мл на 500 кг

массы тела





вид животных	ЗАБОЛЕВАНИЕ	дозы препарата
Овцы и козы	Артрит Бурсит Миозит Анафилактический шок Ушиб Мастит Послеродовая токсемия Укусы змей	0,15 – 0,3 мл на 10 кг массы тела





вид животных	ЗАБОЛЕВАНИЕ	дозы препарата
Свиньи	Артрит	
	Бурсит	
	Миозит	
	Анафилактический шок	0,15 – 0,3 мл на 10
	Ушиб	кг массы тела
	Мастит	N Maccol Toria
	Послеродовая токсемия	





вид животных	ЗАБОЛЕВАНИЕ	ДОЗЫ ПРЕПАРАТА
Собаки и кошки	Артрит Бурсит Миозит Анафилактический шок Астма Ушиб Укусы змей	0,15 – 0,4 мл на 5 кг массы тела



ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРОДУКТИВНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ

МОЛОКО – 2 суток или 6 доек

ГОВЯДИНА – 48 суток

СВИНИНА – 48 суток

КОНИНА – 24 суток