

수목 진단서 및 처방전

1. 의뢰인 및 소재지 기본 정보

진단 번호	78a3929d-3932-49e0-ab52-0bf82cacbc07	의뢰인 ID	홍길동
수목 소재지	서울특별시 중구 세종대로 110	진단 일자	2026-06-20

2. 수목 진단서 (수종, 수목의 상태 및 진단 결과)

대상 수종	벼 (Oryza sativa)	진단 결과 (의심 병해충)	도열병 (Rice Blast, Magnaporthe oryzae) (중증도, 정확도: 95.0%)
수목의 상태 (잎)	엽신 및 엽초에 방추형 또는 타원형의 수침상 병반이 다수 관찰되며, 병반은 시간이 경과함에 따라 중앙부는 회백색으로 괴사화되고 가장자리는 적갈색을 띠는 특징적인 병징을 나타냄. 일부 병반 주변에는 황화대가 형성되어 있으며, 다수의 병반이 융합되어 엽 전체의 조기 고사 및 위조 현상이 진행되고 있음.	수목의 상태 (줄기 및 수간)	직접적인 줄기(간) 병반은 명확히 관찰되지 않으나, 엽초 병반이 줄기 기부로 확산될 가능성이 있으며, 이삭 목 부분(수수경)에 감염이 진행될 경우 목도열병으로 이삭의 불완전 성숙 및 고사를 유발할 수 있는 잠재적 위험성이 존재함. 현재 이미지에서는 주로 잎과 엽초에 병징이 집중되어 있음.
수목의 상태 (뿌리)	제공된 이미지에서 뿌리 상태는 직접적으로 확인하기 어려움. 그러나 지상부의 심각한 병해충 감염은 광합성 능력 저하 및 양분 흡수 불균형을 초래하여 뿌리 생육 위축 및 활력 저하를 간접적으로 유발할 수 있음. 배수 및 토양 환경에 대한 추가적인 현장 조사가 필요함.	긴급 조치 사항	- 도열병 전문 살균제를 병 발생 초기에 즉시 살포하여 병원균 확산을 억제. - 감염된 잎 및 잔재물을 제거하여 추가 감염원 제거. - 질소 비료 과용을 피하고, 규산 비료 사용을 고려하여 식물체 저항력 증진.

3. 처방전 (처치 등 치료방법 및 처방 농약 내역)

처치 등 치료방법	[화학적 방제] 병원균 밀도 감소 및 병해 확산 방지를 위해 도열병 전문 살균제를 정량 살포해야 함. 주성분으로 트라이사이클라졸(Tricyclazole), 프로피네브(Propineb), 아зок시스트로빈(Azoxystrobin) 등을 포함하는 약제를 선택하여 작물 생육 단계와 병 발생 정도를 고려하여 살포 횟수 및 농도를 조절함. [물리적/재배적 방제] - 이병 잔재물 제거: 감염된 잎과 이삭 잔재물을 수확 후 철저히 제거하여 월동 포자 밀도를 낮춤. - 저항성 품종 선택: 다음 재배 시 도열병 저항성 품종을 선택하여 예방적 방제 실시. - 적정 시비 관리: 특히 질소 비료의 과도한 사용을 지양하고, 규산 비료 사용을 통해 식물체의 저항력을 증진시킴. - 물 관리: 논물의 깊이를 조절하여 병원균 포자의 확산을 억제하고, 건답 기간을 적절히 유지하여 토양 환경을 개선함.
-----------	---

농약의 명칭 (상표명 / 성분)	용법 (희석 배수)	용량 (사용량 및 세부 방법)	처방일수 (사용 기간/횟수)
등록 농약 없음 농약관리법상 해당 수종 및 병해충에 등록된 합법적 약제가 없습니다.	물리적 방제 요망	해당 없음	해당 없음

4. 발행자 및 서명 날인

상호 (나무병원명)	아시아나무병원	나무의사 성명	홍길동 (서명 또는 직인)
------------	---------	---------	----------------

면허 자격번호	나무의사 제2026-12345호	발행일	2026-06-20
---------	-------------------	-----	------------

위와 같이 「산림보호법」 및 「농약관리법」 규정에 의하여 수목 진단 및 처방 결과를 발행합니다.

AI TreeDoctor AI 기반 수목 정밀 처방전 자동 발급 솔루션