

References

- [1] J. Maldacena, *Adv.Theor.Math.Phys.* **2** (1998) 231-252.
- [2] S. Gubser, I. Klebanov and A. Polyakov, *Phys. Lett.* **B428** (1998) 105, hep-th/9802109; E. Witten, *Adv. Theor. Math. Phys.* **2** (1998) 253, hep-th/9802150.
- [3] P.A.M. Dirac, *J. Math. Phys.* **4**, (1963) 901; C. Fronsdal, *Phys. Rev.* **D26**, (1982) 1988; M. Flato and C. Fronsdal, *J. Math. Phys.* **22**, (1981) 1100; E. Angelopoulos, M. Flato, C. Fronsdal and D. Steinheimer, *Phys. Rev.* **D23**, (1981) 1278.
- [4] M.J. Duff, *Class. Quant. Grav.* **5**, (1988) 189;
M. Blencowe and M.J. Duff, *Nucl. Phys.* **B310**, (1988) 587. M.P. Blencowe and M.J. Duff, *Phys. Lett.* **B203**, (1988) 229; E. Bergshoeff, E. Sezgin and Y. Tanii, trieste preprint, IC/88/5, (1988); E. Bergshoeff, A. Salam, E. Sezgin and Y. Tanii, *Nucl. Phys.* **B305**, (1988) 497; H. Nicolai, E. Sezgin and Y. Tanii, *Nucl. Phys.* **B305** [FS23], (1988) 483.
- [5] G. Dall'Agata, D. Fabbri, C. Fraser, P. Fré, P. Termonia and M. Trigiante, hep-th/9807115.
- [6] B. de Wit, K. Peeters, J. Plefka and A. Sevrin, The M-Theory Two-Brane in $AdS_4 \times S^7$ and $AdS_7 \times S^4$, hep-th/9808052; P. Claus, Super M-brane actions in $adS_4 \times S^7$ and $adS_7 \times S^4$, hep-th/9809045.
- [7] L. Castellani, L. J. Romans and N. P. Warner, *Nucl. Phys.* **B241**, (1984) 429; M.J. Duff, B.E.W. Nilsson and C.N. Pope, *Phys. Rep.* **130**, (1986) 1; F. Englert, *Phys. Lett* **119B**, (1982) 339; L. Castellani, R. D'Auria and P. Fré, *Nucl. Phys.* **239**, (1984) 60;
- [8] B. de Wit and H. Nicolai, *Nucl. Phys.* **B231**, (1984) 506;
B. de Wit and H. Nicolai, *Nucl. Phys.* **B281**, (1987) 211.
- [9] R. D'Auria and P. Fré, *Ann. of Phys.* **157**, (1984) 1; R. D'Auria and P. Fré, *Ann. of Phys* **162**, (1985) 372.
- [10] M. Günaydin and N. P. Warner, *Nucl. Phys.* **B272**, (1986) 99.
- [11] A. Ceresole, P. Fré and H. Nicolai, *Class. Quant. Grav.* **2**, (1985) 133.
- [12] Currently under investigation by L. Castellani, A. Ceresole, G. Dall'Agata, R. D'Auria, D. Fabbri, P. Fré, L. Gualtieri and P. Termonia. Already appeared: D. Fabbri, P. Fré, L. Gualtieri and P. Termonia, M-theory on $AdS_4 \times M^{11}$: the complete $Osp(2|4) \times SU(3) \times SU(2)$ spectrum from harmonic analysis, hep-th/9903036.
- [13] E. Bergshoeff, E. Sezgin and Y. Tanii, trieste preprint, IC/88/5, (1988).
E. Bergshoeff, A. Salam, E. Sezgin and Y. Tanii, *Nucl. Phys.* **B305**, (1988) 497.
- [14] H. Nicolai, E. Sezgin and Y. Tanii, *Nucl. Phys.* **B305** [FS23], (1988) 483.
- [15] G.W. Gibbons and P.K. Townsend, *Phys. Rev. Lett.* **71**, (1993) 3754; G. Gibbons, *Nucl. Phys.* **B207**, (1982) 337; R. Kallosh and A. Peet, *Phys. Rev.* **B46**, (1992) 5223; S. Ferrara, G. Gibbons and R. Kallosh, *Nucl. Phys.* **B500**, (1997) 75; A. Chamseddine, S. Ferrara, G.W. Gibbons and R. Kallosh, *Phys. Rev.* **D55**, (1997) 3647.