



# ***Interpolación***

## Tema 5 (I)





# ***Interpolación***

- Concepto y Teorema de la Aproximación





## ***Interpolación de una función***

Consiste en la obtención de nuevos puntos intermedios para una función a partir de un conjunto limitado de puntos conocidos.

Más allá del concepto puramente analítico, las aplicaciones de la interpolación en informática son inmensas utilizándose por ejemplo en compresión de vídeo, cambio de frecuencia de muestreo en sonido, cambio de tamaño de imágenes, animación de parámetros en realidad virtual, etc.


# ***Interpolación de una función***

A partir de un conjunto de  $n$  puntos  $(x_k, y_k)$  llamamos interpolación  $f(x)$  a la función que verifica:  $f(x_k) = y_k$  para  $k = 1, \dots, n$



## ***Interpolación de una función***

La interpolación más sencilla sería conectar dos puntos con una recta, se trataría de una interpolación lineal y es poco precisa.



La interpolación mediante un polinomio será más precisa al poder ajustar sus curvas a la función que se pretende interpolar.

## ***Teorema de la Aproximación de Weiestrass***

Sea  $f(x)$  definida y continua en  $[a,b]$ . Para todo  $\varepsilon > 0$  existe un polinomio  $P(x)$  tal que

$$|f(x) - P(x)| < \varepsilon \text{ para todo } x \in [a,b]$$

El teorema nos garantiza que siempre existirá un polinomio con el que poder interpolar cualquier función, con la precisión que queramos. El problema es encontrarlo.


# ***Interpolación***

- Concepto y Teorema de la Aproximación
- Interpolación de Lagrange

# ***Polinomios de Lagrange***

Para que un polinomio tenga una raíz en  $x_i$  debe tener un factor  $(x-x_i)$  que se haga 0 al sustituir  $x$  por  $x_i$ .

El polinomio con raíces en  $x_0, x_1, \dots, x_n$  debe tener la forma  $P(x) = (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)$






# Polinomios de Lagrange

Dado los valores  $x_0, x_1, \dots, x_n$  llamamos a  $L_{n,k}(x)$  polinomio de Lagrange de grado  $n$  para  $k$  al polinomio que tiene  $n$  raíces en  $x_0, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n$  y cumple que  $L_{n,k}(x_k) = 1$

$$L_{n,k}(x) = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)}$$



## ***Polinomio de Interpolación de Lagrange***

Se llama polinomio de interpolación de Lagrange de grado  $n$  a

$$P_n(x) = f(x_0)L_{n,0}(x) + \dots + f(x_n)L_{n,n}(x)$$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k)L_{n,k}(x)$$

donde

$$L_{n,k}(x) = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)}$$

## ***Polinomio de Interpolación de Lagrange***

Por ejemplo, conocidos 2 valores:  $x_0$  y  $x_1$ ,

y sus valores en  $f(x)$ :  $f(x_0)$  y  $f(x_1)$

podemos interpolar  $f(x)$  mediante el polinomio de interpolación de Lagrange de grado 1  $P_1(x)$

$$P_1(x) = \sum_{k=0}^1 f(x_k) L_{1,k}(x) = f(x_0) L_{1,0}(x) + f(x_1) L_{1,1}(x)$$

$$L_{1,0}(x) = \frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)} \quad L_{1,1}(x) = \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$$

$$P_1(x) = f(x_0) \frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)} + f(x_1) \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$$

Es una interpolación lineal.

# ***Polinomio de Interpolación de Lagrange***

Con 3 valores:  $x_0, x_1, x_2, f(x_0), f(x_1)$  y  $f(x_2)$

la interpolación de Lagrange de grado 2  $P_2(x)$

$$\sum_{k=0}^2 f(x_k) L_{2,k}(x) = f(x_0) L_{2,0}(x) + f(x_1) L_{2,1}(x) + f(x_2) L_{2,2}(x)$$

$$L_{2,0}(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} \quad L_{2,1}(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}$$

$$L_{2,2}(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

$$P_2(x) = f(x_0) \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + f(x_1) \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} + f(x_2) \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

# ***Polinomio de Interpolación de Lagrange***

Comparación  $P_1(x)$  con  $P_2(x)$ :

Los  $L_{2,k}(x)$  incorporan una raíz más que los  $L_{1,k}(X)$  y el polinomio  $P_2(x)$  suma un término más que  $P_1(x)$

$$P_1(x) = f(x_0) \frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)} + f(x_1) \frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)}$$

$$P_2(x) = f(x_0) \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + f(x_1) \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} + f(x_2) \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

## ***Ejemplo de Interpolación de Lagrange***

Calcula con un polinomio de interpolación de Lagrange de grado 1 (lineal) la función  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$  para  $x=5/2$  conocidos los valores  $f(2)=1$  y  $f(3)=3/2$

$x_i$	$f(x_i)$
$x_0=2$	1
$x_1=3$	$3/2$

$$L_{n,k}(x) = \frac{(x-x_0) \cdots (x-x_{k-1})(x-x_{k+1}) \cdots (x-x_n)}{(x_k-x_0) \cdots (x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1}) \cdots (x_k-x_n)}$$

## Ejemplo de Interpolación de Lagrange

Calcula con un polinomio de interpolación de Lagrange de grado 1 (lineal) la función  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$  para  $x=5/2$  conocidos los valores  $f(2)=1$  y  $f(3)=3/2$

$$L_{1,0}(x) = \frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)} = \frac{(x - 3)}{(2 - 3)} = -(x - 3)$$

$$L_{1,1}(x) = \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)} = \frac{(x - 2)}{(3 - 2)} = (x - 2)$$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) L_{n,k}(x)$$

$$L_{n,k}(x) = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)}$$

$x_i$	$f(x_i)$
$x_0=2$	1
$x_1=3$	$3/2$



## ***Ejemplo de Interpolación de Lagrange***

Calcula con un polinomio de interpolación de Lagrange de grado 1 (lineal) la función  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$  para  $x=5/2$  conocidos los valores  $f(2)=1$  y  $f(3)=3/2$

$$L_{1,0}(x) = \frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)} = \frac{(x - 3)}{(2 - 3)} = -(x - 3)$$

$$L_{1,1}(x) = \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)} = \frac{(x - 2)}{(3 - 2)} = (x - 2)$$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) L_{n,k}(x)$$

$$P_1(x) = f(x_0)L_{1,0}(x) + f(x_1)L_{1,1}(x) =$$

$$P_1(x) = -\frac{2(x-3)}{2} + \frac{3(x-2)}{2} = \frac{x}{2}$$

$x_i$	$f(x_i)$
$x_0=2$	1
$x_1=3$	$3/2$



## ***Ejemplo de Interpolación de Lagrange***

Calcula con un polinomio de interpolación de Lagrange de grado 1 (lineal) la función  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$  para  $x=5/2$  conocidos los valores  $f(2)=1$  y  $f(3)=3/2$

$x_i$	$f(x_i)$
$x_0=2$	1
$x_1=3$	$3/2$


$$f(5/2) = \left(\frac{5/2}{2}\right)^{\left(\frac{5}{2}-2\right)} = \frac{\sqrt{5}}{2} = 1,118$$

$$P_1(x) = -\frac{2(x-3)}{2} + \frac{3(x-2)}{2} = \frac{x}{2}$$

$$P_1(5/2) = \frac{5}{4} = 1,25$$

# Ejemplo de Interpolación de Lagrange

Calcula con un polinomio de interpolación de Lagrange de grado 1 (lineal) la función  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$  para  $x=5/2$



$x_i$	$f(x_i)$
$x_0=2$	1
$x_1=3$	$3/2$

$$f(5/2) = \left(\frac{5/2}{2}\right)^{\left(\frac{5}{2}-2\right)} = \frac{\sqrt{5}}{2} = 1,118 \quad \Delta P_1(5/2) = 0,148$$

$$P_1(x) = -\frac{2(x-3)}{2} + \frac{3(x-2)}{2} = \frac{x}{2} \quad P_1(5/2) = \frac{5}{4} = 1,25$$

## ***Ejemplo de Interpolación de Lagrange***

Añade el valor  $f(1)=2$  y recalcula con el polinomio de grado 2

$x_i$	$f(x_i)$
$x_0=1$	2
$x_1=2$	1
$x_2=3$	$3/2$

$$L_{n,k}(x) = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)}$$

## Ejemplo de Interpolación de Lagrange

Añade el valor  $f(1)=2$  y recalcula con el polinomio de grado 2

$$L_{2,0}(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} = \frac{(x-2)(x-3)}{(1-2)(1-3)}$$

$$L_{2,1}(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} = \frac{(x-1)(x-3)}{(2-1)(2-3)}$$

$$L_{2,2}(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} = \frac{(x-1)(x-2)}{(3-1)(3-2)}$$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) L_{n,k}(x)$$

$$L_{n,k}(x) = \frac{(x-x_0) \cdots (x-x_{k-1})(x-x_{k+1}) \cdots (x-x_n)}{(x_k-x_0) \cdots (x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1}) \cdots (x_k-x_n)}$$

$x_i$	$f(x_i)$
$x_0=1$	2
$x_1=2$	1
$x_2=3$	3/2

## ***Ejemplo de Interpolación de Lagrange***

Añade el valor  $f(1)=2$  y recalcula con el polinomio de grado 2

$$L_{2,0}(x) = \frac{(x-2)(x-3)}{(1-2)(1-3)}$$

$$L_{2,1}(x) = \frac{(x-1)(x-3)}{(2-1)(2-3)}$$

$$L_{2,2}(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{(3-1)(3-2)}$$

$x_i$	$f(x_i)$
$x_0=1$	2
$x_1=2$	1
$x_2=3$	3/2

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) L_{n,k}(x)$$

$$P_2(x) = f(x_0)L_{2,0}(x) + f(x_1)L_{2,1}(x) + f(x_2)L_{2,2}(x)$$

## ***Ejemplo de Interpolación de Lagrange***

Añade el valor  $f(1)=2$  y recalcula con el polinomio de grado 2

$$\begin{aligned} P_2(x) = & f(x_0) \frac{(x-2)(x-3)}{(1-2)(1-3)} + \\ & + f(x_1) \frac{(x-1)(x-3)}{(2-1)(2-3)} + \\ & + f(x_2) \frac{(x-1)(x-2)}{(3-1)(3-2)} \end{aligned}$$

$x_i$	$f(x_i)$
$x_0=1$	2
$x_1=2$	1
$x_2=3$	3/2

$$P_2(x) = f(x_0)L_{2,0}(x) + f(x_1)L_{2,1}(x) + f(x_2)L_{2,2}(x)$$

## Ejemplo de Interpolación de Lagrange

Añade el valor  $f(1)=2$  y recalcula con el polinomio de grado 2

$$P_2(x) = f(x_0) \frac{(x-2)(x-3)}{(1-2)(1-3)} + f(x_1) \frac{(x-1)(x-3)}{(2-1)(2-3)} + f(x_2) \frac{(x-1)(x-2)}{(3-1)(3-2)}$$

$x_i$	$f(x_i)$
$x_0=1$	2
$x_1=2$	1
$x_2=3$	3/2


$$P_2(5/2) = 2 \frac{(1/2)(-1/2)}{2} + \frac{(3/2)(-1/2)}{-1} + \frac{3}{2} \frac{(3/2)(1/2)}{2}$$

$$P_2(5/2) = -\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{9}{16} = \frac{8}{16} + \frac{9}{16} = 17/16 = 1,0625$$



# Ejemplo de Interpolación de Lagrange

Añade el valor  $f(1)=2$  y recalcula con el polinomio de grado 2



$x_i$	$f(x_i)$
$x_0=1$	2
$x_1=2$	1
$x_2=3$	$3/2$

$$f(5/2) = \left(\frac{5/2}{2}\right)^{\left(\frac{5}{2}-2\right)} = \frac{\sqrt{5}}{2} = 1,118 \quad \Delta P_2(5/2) = 0,0555$$

$$P_2(5/2) = -\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{9}{16} = \frac{8}{16} + \frac{9}{16} = 17/16 = 1,0625$$



## ***Ejemplo de Interpolación de Lagrange***

Añade el valor  $f(4)=4$  y recalcula  $f(x)$  en  $x=5/2$  con grado 3

$x_i$	$f(x_i)$
$x_0=1$	2
$x_1=2$	1
$x_2=3$	$3/2$
$x_3=4$	4

$$L_{n,k}(x) = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)}$$

## ***Ejemplo de Interpolación de Lagrange***

Añade el valor  $f(4)=4$  y recalcula  $f(x)$  en  $x=5/2$  con grado 3

$$L_{3,0}(x) = \frac{(x-2)(x-3)(x-4)}{(1-2)(1-3)(1-4)}$$

$$L_{3,1}(x) = \frac{(x-1)(x-3)(x-4)}{(2-1)(2-3)(2-4)}$$

$$L_{3,2}(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-4)}{(3-1)(3-2)(3-4)}$$

$$L_{3,3}(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(4-1)(4-2)(4-3)}$$

$x_i$	$f(x_i)$
$x_0=1$	2
$x_1=2$	1
$x_2=3$	$3/2$
$x_3=4$	4

$$L_{n,k}(x) = \frac{(x-x_0) \cdots (x-x_{k-1})(x-x_{k+1}) \cdots (x-x_n)}{(x_k-x_0) \cdots (x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1}) \cdots (x_k-x_n)}$$

## ***Ejemplo de Interpolación de Lagrange***

Añade el valor  $f(4)=4$  y recalcula  $f(x)$  en  $x=5/2$  con grado 3

$$L_{3,0}(x) = \frac{(x-2)(x-3)(x-4)}{(1-2)(1-3)(1-4)}$$

$$L_{3,1}(x) = \frac{(x-1)(x-3)(x-4)}{(2-1)(2-3)(2-4)}$$

$$L_{3,2}(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-4)}{(3-1)(3-2)(3-4)}$$

$$L_{3,3}(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(4-1)(4-2)(4-3)}$$

$x_i$	$f(x_i)$
$x_0=1$	2
$x_1=2$	1
$x_2=3$	$3/2$
$x_3=4$	4

Si sólo queremos aproximar un valor, lo mejor es, en vez de obtener el polinomio, establecer una matriz del cálculo.

## Ejemplo de Interpolación de Lagrange

Añade el valor  $f(4)=4$  y recalcula  $f(x)$  en  $x=5/2$  con grado 3

$x_i$	$f(x_i)$	$L_{3,i}(x)$
$x_0 = 1$	2	$\frac{(x-2)(x-3)(x-4)}{(1-2)(1-3)(1-4)}$
$x_1 = 2$	1	$\frac{(x-1)(x-3)(x-4)}{(2-1)(2-3)(2-4)}$
$x_2 = 3$	$3/2$	$\frac{(x-1)(x-2)(x-4)}{(3-1)(3-2)(3-4)}$
$x_3 = 4$	4	$\frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(4-1)(4-2)(4-3)}$

$x_i$	$f(x_i)$
$x_0=1$	2
$x_1=2$	1
$x_2=3$	$3/2$
$x_3=4$	4

$$P_3(x) = \sum_{i=0}^3 f(x_k) L_{3,i}(x)$$

$$= f(x_0)L_{3,0}(x) + f(x_1)L_{3,1}(x) + f(x_2)L_{3,2}(x) + f(x_3)L_{3,3}(x)$$


## Ejemplo de Interpolación de Lagrange

$x_i$	$f(x_i)$	$L_{3,i}(x)$	$f(x_i)L_{3,i}(5/2)$
$x_0 = 1$	2	$\frac{(x-2)(x-3)(x-4)}{(1-2)(1-3)(1-4)}$	$2 \cdot \frac{3/8}{-6} = -\frac{3}{24}$
$x_1 = 2$	1	$\frac{(x-1)(x-3)(x-4)}{(2-1)(2-3)(2-4)}$	$1 \cdot \frac{9/8}{2} = \frac{9}{16}$
$x_2 = 3$	$3/2$	$\frac{(x-1)(x-2)(x-4)}{(3-1)(3-2)(3-4)}$	$\frac{3}{2} \cdot \frac{-9/8}{-2} = \frac{27}{32}$
$x_3 = 4$	4	$\frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(4-1)(4-2)(4-3)}$	$4 \cdot \frac{-3/8}{6} = -\frac{3}{12}$

$$P_3(5/2) = \sum_{i=0}^3 f(x_i)L_{3,i}(5/2) = -\frac{12}{96} + \frac{54}{96} + \frac{81}{96} - \frac{24}{96} = \frac{33}{32}$$

# Ejemplo de Interpolación de Lagrange

Añade el valor  $f(4)=4$  y recalcula  $f(x)$  en  $x=5/2$  con grado 3



$x_i$	$f(x_i)$
$x_0=1$	2
$x_1=2$	1
$x_2=3$	$3/2$
$x_3=4$	4

$$f(5/2) = \frac{\sqrt{5}}{2} = 1,118$$

$$\Delta P_3(5/2) = 0,0868$$

$$P_3(5/2) = \sum_{i=0}^3 f(x_i) L_{3,i}(5/2) = \frac{33}{32} = 1,03125$$

## ***Ejemplo de Interpolación de Lagrange***

... con grado 4

$x_i$	$f(x_i)$
$x_0=1$	2
$x_1=2$	1
$x_2=3$	$3/2$
$x_3=4$	4
$x_4=5$	$\frac{125}{8}$



## Ejemplo de Interpolación de Lagrange

$x_i$	$f(x_i)$	$L_{4,i}(x)$
$x_0 = 1$	2	$\frac{(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{(1-2)(1-3)(1-4)(1-5)}$
$x_1 = 2$	1	$\frac{(x-1)(x-3)(x-4)(x-5)}{(2-1)(2-3)(2-4)(2-5)}$
$x_2 = 3$	$3/2$	$\frac{(x-1)(x-2)(x-4)(x-5)}{(3-1)(3-2)(3-4)(3-5)}$
$x_3 = 4$	4	$\frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-5)}{(4-1)(4-2)(4-3)(4-5)}$
$x_4 = 5$	$\frac{125}{8}$	$\frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)}{(5-1)(5-2)(5-3)(5-4)}$

... con grado 4


$x_i$	$f(x_i)$
$x_0=1$	2
$x_1=2$	1
$x_2=3$	$3/2$
$x_3=4$	4
$x_4=5$	$\frac{125}{8}$



## ***Ejemplo de Interpolación de Lagrange***

$x_i$	$f(x_i)$	$L_{4,i}(x)$	$f(x_i)L_{4,i}(5/2)$
1	2	$\frac{(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{(1-2)(1-3)(1-4)(1-5)}$	$2 \cdot \frac{-15/16}{24} = -\frac{15}{192}$
2	1	$\frac{(x-1)(x-3)(x-4)(x-5)}{(2-1)(2-3)(2-4)(2-5)}$	$1 \cdot \frac{-45/16}{-6} = \frac{15}{32}$
3	$3/2$	$\frac{(x-1)(x-2)(x-4)(x-5)}{(3-1)(3-2)(3-4)(3-5)}$	$\frac{3}{2} \cdot \frac{45/16}{4} = \frac{135}{128}$
4	4	$\frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-5)}{(4-1)(4-2)(4-3)(4-5)}$	$4 \cdot \frac{15/16}{-6} = -\frac{5}{8}$
5	$\frac{125}{8}$	$\frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)}{(5-1)(5-2)(5-3)(5-4)}$	$\frac{125}{8} \cdot \frac{9/16}{24} = \frac{375}{1024}$

# Ejemplo de Interpolación de Lagrange



... con grado 4

$x_i$	$f(x_i)$
$x_0=1$	2
$x_1=2$	1
$x_2=3$	$3/2$
$x_3=4$	4
$x_4=5$	$\frac{125}{8}$





$$f(5/2) = 1,118 \quad \Delta P_3(5/2) = 0,0684$$

$$P_4(5/2) = -\frac{15}{192} + \frac{15}{32} + \frac{135}{128} - \frac{5}{8} + \frac{375}{1024} =$$

$$\frac{-240 + 1440 + 3240 - 1920 + 1125}{3072} = \frac{3645}{3072} = 1,1865$$

# Ejemplo de Interpolación de Lagrange

Los grados 3 y 4 no mejoran el error del grado 2 en  $x=5/2$ :



# ***Error de Interpolación de Lagrange***

Si  $f(x)$  es una función interpolada  
con un polinomio  $P_n(x)$  de Lagrange,  
entonces:

$$f(x) = P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\varepsilon)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

donde  $\varepsilon$  es un número desconocido  
perteneciente al menor intervalo que  
contenga a  $x_0, x_1, \dots, x_n$  y  $x$   
es decir,  $\varepsilon \in [\text{mín}(x_i, x), \text{máx}(x_i, x)]$

# ***Interpolación de Lagrange***

## **Problemas:**

- No necesariamente gana precisión aumentando de orden.
- Es complicado su cálculo manual.

# ***Interpolación***

- Concepto y Teorema de la Aproximación
- Interpolación de Lagrange
- Tablas de interpolación

## ***Tablas de Interpolación***

En el ejemplo hemos visto ,  
calculando  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$ ,  
que podemos aplicar tablas para calcular  
el valor de la interpolación en un  $x$   
concreto, en el ejemplo  $x=5/2$ .

Cada vez que añadimos un punto (un grado  
más al polinomio de interpolación)  
podemos crear una nueva columna en la  
tabla a partir de la columna anterior, salvo  
el último elemento de la columna, el de la  
nueva fila, que se calcula completamente.

## ***Tablas de Interpolación***

Crear la columna  $L_{2,i}(x)$  para el polinomio  $P_2(x)$   
a partir de la columna  $L_{1,i}(x)$  del polinomio  $P_1(x)$ :

$x_i$	$f(x_i)$	$L_{1,i}(x)$
$x_0$	$f(x_0)$	$\frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)}$
$x_1$	$f(x_1)$	$\frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$

$$P_1(x) =$$

$$= f(x_0) \frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)} + f(x_1) \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$$



# Tablas de Interpolación

Crear la columna  $L_{2,i}(x)$  para el polinomio  $P_2(x)$   
a partir de la columna  $L_{1,i}(x)$  del polinomio  $P_1(x)$ :

$x_i$	$f(x_i)$	$L_{1,i}(x)$
$x_0$	$f(x_0)$	$\frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)}$
$x_1$	$f(x_1)$	$\frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$

$$P_1(x) = f(x_0) \frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)} + f(x_1) \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$$

$$P_2(x) = f(x_0) \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + f(x_1) \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + f(x_2) \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

## ***Tablas de Interpolación***

Crear la columna  $L_{2,i}(x)$  para el polinomio  $P_2(x)$   
a partir de la columna  $L_{1,i}(x)$  del polinomio  $P_1(x)$ :

$x_i$	$f(x_i)$	$L_{1,i}(x)$	$L_{2,i}(x)$
$x_0$	$f(x_0)$	$\frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)}$	$L_{1,0}(x) \frac{(x - x_2)}{(x_0 - x_2)}$
$x_1$	$f(x_1)$	$\frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$	$L_{1,1}(x) \frac{(x - x_2)}{(x_1 - x_2)}$
$x_2$	$f(x_2)$		$\frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$

# Tablas de Interpolación

Calcular los  $L_{3,i}(x)$  para el polinomio  $P_3(x)$ :

$x_i$	$f(x_i)$	$L_{1,i}(x)$	$L_{2,i}(x)$
$x_0$	$f(x_0)$	$\frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)}$	$L_{1,0}(x) \frac{(x - x_2)}{(x_0 - x_2)}$
$x_1$	$f(x_1)$	$\frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$	$L_{1,1}(x) \frac{(x - x_2)}{(x_1 - x_2)}$
$x_2$	$f(x_2)$		$\frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$

Si el calculo lo hacemos para un  $x$  en concreto, los  $L_{n,i}$  se pueden calcular de los anteriores sin arrastrar la variable  $x$ , y el calculo se simplifica.

# Tablas de Interpolación

Calcular los  $L_{3,i}(x)$  para el polinomio  $P_3(x)$ ..

$x_i$	$f(x_i)$	$L_{1,i}(x)$	$L_{2,i}(x)$	$L_{3,i}(x)$
$x_0$	$f(x_0)$	$\frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)}$	$L_{1,0}(x) \frac{(x - x_2)}{(x_0 - x_2)}$	$L_{2,0}(x) \frac{(x - x_3)}{(x_0 - x_3)}$
$x_1$	$f(x_1)$	$\frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$	$L_{1,1}(x) \frac{(x - x_2)}{(x_1 - x_2)}$	$L_{2,1}(x) \frac{(x - x_3)}{(x_1 - x_3)}$
$x_2$	$f(x_2)$		$\frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$	$L_{2,2}(x) \frac{(x - x_3)}{(x_2 - x_3)}$
$x_3$	$f(x_3)$			$\frac{(x - x_0) \cdots (x - x_2)}{(x_3 - x_0) \cdots (x_3 - x_2)}$

$$P_3(x) = f(x_0)L_{3,0}(x) + f(x_1)L_{3,1}(x) + f(x_2)L_{3,2}(x) + f(x_3)L_{3,3}(x)$$

# Ejemplo de Tabla de Interpolación

Calcula  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$  en  $x=5/2$  a partir del polinomio de interpolación de grado 1 para  $x_0=1$  y  $x_1=2$

$x_i$	$f(x_i)$	$L_{1,i}(x)$	$L_{2,i}(x)$	$L_{3,i}(x)$
$x_0$	$f(x_0)$	$\frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)}$	$L_{1,0}(x) \frac{(x-x_2)}{(x_0-x_2)}$	$L_{2,0}(x) \frac{(x-x_3)}{(x_0-x_3)}$
$x_1$	$f(x_1)$	$\frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)}$	$L_{1,1}(x) \frac{(x-x_2)}{(x_1-x_2)}$	$L_{2,1}(x) \frac{(x-x_3)}{(x_1-x_3)}$
$x_2$	$f(x_2)$		$\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$	$L_{2,2}(x) \frac{(x-x_3)}{(x_2-x_3)}$
$x_3$	$f(x_3)$			$\frac{(x-x_0) \cdots (x-x_2)}{(x_3-x_0) \cdots (x_3-x_2)}$

$$P_1(x) = f(x_0)L_{1,0}(x) + f(x_1)L_{1,1}(x)$$

## Ejemplo de Tabla de Interpolación

Calcula  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$  en  $x=5/2$  a partir del polinomio de interpolación de grado 1 para  $x_0=1$  y  $x_1=2$

$x_i$	$f(x_i)$	$L_{1,i}(5/2)$	$L_{2,i}(x)$	$L_{3,i}(x)$
1	2	$-\frac{1}{2}$	$L_{1,0}(x) \frac{(x-x_2)}{(x_0-x_2)}$	$L_{2,0}(x) \frac{(x-x_3)}{(x_0-x_3)}$
2	1	$\frac{3}{2}$	$L_{1,1}(x) \frac{(x-x_2)}{(x_1-x_2)}$	$L_{2,1}(x) \frac{(x-x_3)}{(x_1-x_3)}$
$x_2$	$f(x_2)$		$\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$	$L_{2,2}(x) \frac{(x-x_3)}{(x_2-x_3)}$
$x_3$	$f(x_3)$			$\frac{(x-x_0) \cdots (x-x_2)}{(x_3-x_0) \cdots (x_3-x_2)}$

$$P_1(x) = 2(-1/2) + 1(3/2) = 1/2$$

## Ejemplo de Tabla de Interpolación

Calcula  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$  en  $x=5/2$  a partir de los valores para  $x_0=1$ ,  $x_1=2$  y  $x_2=3$

$x_i$	$f(x_i)$	$L_{1,i}(5/2)$	$L_{2,i}(x)$	$L_{3,i}(x)$
1	2	$-\frac{1}{2}$	$L_{1,0}(x) \frac{(x-x_2)}{(x_0-x_2)}$	$L_{2,0}(x) \frac{(x-x_3)}{(x_0-x_3)}$
2	1	$\frac{3}{2}$	$L_{1,1}(x) \frac{(x-x_2)}{(x_1-x_2)}$	$L_{2,1}(x) \frac{(x-x_3)}{(x_1-x_3)}$
$x_2$	$f(x_2)$		$\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$	$L_{2,2}(x) \frac{(x-x_3)}{(x_2-x_3)}$
$x_3$	$f(x_3)$			$\frac{(x-x_0) \cdots (x-x_2)}{(x_3-x_0) \cdots (x_3-x_2)}$

$$P_1(x) = 1/2 \quad P_2(x) = f(x_0)L_{2,0} + f(x_1)L_{2,1} + f(x_2)L_{2,2}$$



## Ejemplo de Tabla de Interpolación

Calcula  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$  en  $x=5/2$  a partir de los valores para  $x_0=1$ ,  $x_1=2$  y  $x_2=3$

$x_i$	$f(x_i)$	$L_{1,i}(5/2)$	$L_{2,i}(5/2)$	$L_{3,i}(x)$
1	2	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	$L_{2,0}(x) \frac{(x-x_3)}{(x_0-x_3)}$
2	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{4}$	$L_{2,1}(x) \frac{(x-x_3)}{(x_1-x_3)}$
3	$\frac{3}{2}$		$\frac{3}{8}$	$L_{2,2}(x) \frac{(x-x_3)}{(x_2-x_3)}$
$x_3$	$f(x_3)$			$\frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x-x_1)(x_3-x_2)}$

$$P_1(x) = 1/2 \quad P_2(x) = 2(-1/8) + 1(3/4) + (3/2)(3/8) = 17/16$$



## Ejemplo de Tabla de Interpolación

Calcula  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$  en  $x=5/2$  a partir de los valores para  $x_0=1$ ,  $x_1=2$ ,  $x_2=3$  y  $x_3=4$

$x_i$	$f(x_i)$	$L_{1,i}(5/2)$	$L_{2,i}(5/2)$	$L_{3,i}(x)$
1	2	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	$L_{2,0}(x) \frac{(x-x_3)}{(x_0-x_3)}$
2	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{4}$	$L_{2,1}(x) \frac{(x-x_3)}{(x_1-x_3)}$
3	$\frac{3}{2}$		$\frac{3}{8}$	$L_{2,2}(x) \frac{(x-x_3)}{(x_2-x_3)}$
$x_3$	$f(x_3)$			$\frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x-x_1)(x_3-x_2)}$

$$P_3(x) = f(x_0)L_{3,0}(x) + f(x_1)L_{3,1}(x) + f(x_2)L_{3,2}(x) + f(x_3)L_{3,3}(x)$$

## ***Ejemplo de Tabla de Interpolación***

Calcula  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$  en  $x=5/2$  a partir de los valores para  $x_0=1$ ,  $x_1=2$ ,  $x_2=3$  y  $x_3=4$

$x_i$	$f(x_i)$	$L_{1,i}(5/2)$	$L_{2,i}(5/2)$	$L_{3,i}(5/2)$
1	2	$-1/2$	$-1/8$	$-1/16$
2	1	$3/2$	$3/4$	$9/16$
3	$3/2$		$3/8$	$9/16$
$x_3$	4			$-1/16$

$$P_1(x) = 2(-1/2) + 1(3/2) = 1/2$$

$$P_2(x) = 2(-1/8) + 1(3/4) + (3/2)(3/8) = 17/16$$

$$P_3(x) = 2(-1/16) + 1(9/16) + (3/2)(9/16) + 4(-1/16) = 33/32$$

## ***Tablas de Interpolación***

Otras construcciones de tablas son posibles  
(Neville, Aitken, etc.)

A veces no es necesario obtener la forma explícita del polinomio interpolador y basta con obtener su valor numérico en un punto dado. Además en este caso nos gustaría el poder aumentar el orden del polinomio interpolador a voluntad y parar cuando el error sea suficientemente pequeño. Para estos propósitos el algoritmo de Neville está especialmente indicado.

# ***Tablas de Interpolación***

## **Algoritmo de Neville:**

Sea  $p_{i,j}(x)$  el valor en  $x$  del polinomio de grado  $j-i$  que pasa por los puntos  $(x_k, y_k)$  con  $k=i, i+1, \dots, j$   
 $p_{i,j}(x)$  satisface la siguiente relación de recurrencia:

$$p_{i,i}(x) = y_i \quad 0 \leq i \leq j \leq n$$

$$p_{i,j}(x) = \frac{(x - x_j) p_{i,j-1}(x) + (x_i - x) p_{i+1,j}(x)}{x_i - x_j}$$

de forma que  $p_{0,n}(x)$  es el valor del polinomio de Lagrange  $P_n(x)$  en  $x$ .

# ***Tabla de Interpolación de Neville***

Por ejemplo,  $p_{1,2}(x)$  será

$$p_{i,i}(x) = y_i \quad 0 \leq i \leq n$$

$$p_{i,j}(x) = \frac{(x - x_j)p_{i,j-1}(x) + (x_i - x)p_{i+1,j}(x)}{x_i - x_j}$$

# ***Tabla de Interpolación de Neville***

Por ejemplo,  $p_{1,2}(x)$  será

$$p_{1,2}(x) = \frac{(x - x_2)p_{1,1}(x) + (x_1 - x)p_{2,2}(x)}{x_1 - x_2}$$

$$p_{i,i}(x) = y_i \quad 0 \leq i \leq n$$

$$p_{i,j}(x) = \frac{(x - x_j)p_{i,j-1}(x) + (x_i - x)p_{i+1,j}(x)}{x_i - x_j}$$

# ***Tabla de Interpolación de Neville***

Por ejemplo,  $p_{1,2}(x)$  será

$$\begin{aligned} p_{1,2}(x) &= \frac{(x - x_2)p_{1,1}(x) + (x_1 - x)p_{2,2}(x)}{x_1 - x_2} = \\ &= \frac{(x - x_2)y_1 + (x_1 - x)y_2}{x_1 - x_2} \end{aligned}$$

$$p_{i,i}(x) = y_i \quad 0 \leq i \leq n$$

$$p_{i,j}(x) = \frac{(x - x_j)p_{i,j-1}(x) + (x_i - x)p_{i+1,j}(x)}{x_i - x_j}$$

# ***Tabla de Interpolación de Neville***

Por ejemplo,  $p_{1,2}(x)$  será

$$\begin{aligned} p_{1,2}(x) &= \frac{(x - x_2)p_{1,1}(x) + (x_1 - x)p_{2,2}(x)}{x_1 - x_2} = \\ &= \frac{(x - x_2)y_1 + (x_1 - x)y_2}{x_1 - x_2} \end{aligned}$$

Como se puede ver,  
se trata de una recta pasa por los puntos  
 $(x_1, y_1)$  y  $(x_2, y_2)$



# Pirámide de Neville

Los valores de  $P_n(x)$  están en la diagonal superior:

$x_i$	$y_i = f(x_i)$			
$x_0$	$p_{0,0}(x) = y_0$			
$x_1$	$p_{1,1}(x) = y_1$	$p_{0,1}(x)$		
$x_2$	$p_{2,2}(x) = y_2$	$p_{1,2}(x)$	$p_{0,2}(x)$	
$x_3$	$p_{3,3}(x) = y_3$	$p_{2,3}(x)$	$p_{1,3}(x)$	$p_{0,3}(x)$

$$p_{i,j}(x) = \frac{(x - x_j)p_{i,j-1}(x) + (x_i - x)p_{i+1,j}(x)}{x_i - x_j}$$

# Pirámide de Neville

Para  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$  en  $x=5/2$  con  $x_0=1$  y  $x_1=2$

$x_i$	$y_i = f(x_i)$			
$x_0$	$p_{0,0}(x) = y_0$			
$x_1$	$p_{1,1}(x) = y_1$	$p_{0,1}(x)$	$p_{0,2}(x)$	
$x_2$	$p_{2,2}(x) = y_2$	$p_{1,2}(x)$	$p_{1,3}(x)$	$p_{0,3}(x)$
$x_3$	$p_{3,3}(x) = y_3$	$p_{2,3}(x)$		

$$p_{i,j}(x) = \frac{(x - x_j)p_{i,j-1}(x) + (x_i - x)p_{i+1,j}(x)}{x_i - x_j}$$

# Pirámide de Neville

Para  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$  en  $x=5/2$  con  $x_0=1$  y  $x_1=2$

$x_i$	$y_i = f(x_i)$	$P_1(x) = \frac{1}{2}$		
$x_0 = 1$	$p_{0,0}(x) = 2$	$p_{0,1}(x) = \frac{1}{2}$	$p_{0,2}(x)$	$p_{0,3}(x)$
$x_1 = 2$	$p_{1,1}(x) = 1$			
		$p_{1,2}(x)$	$p_{1,3}(x)$	
$x_2$	$p_{2,2}(x) = y_2$	$p_{2,3}(x)$		
$x_3$	$p_{3,3}(x) = y_3$			

$$p_{i,j}(x) = \frac{(x - x_j) p_{i,j-1}(x) + (x_i - x) p_{i+1,j}(x)}{x_i - x_j}$$

# Pirámide de Neville

Para  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$ ,  $x=5/2$ ,  $x_0=1$ ,  $x_1=2$  y  $x_2=3$

$x_i$	$y_i = f(x_i)$	$P_1(x) = \frac{1}{2}$ $P_2(x) = \frac{17}{16}$	
$x_0 = 1$	$p_{0,0}(x) = 2$	$p_{0,1}(x) = \frac{1}{2}$	$p_{0,2}(x) = \frac{17}{16}$
$x_1 = 2$	$p_{1,1}(x) = 1$	$p_{1,2}(x) = \frac{5}{4}$	
$x_2 = 3$	$p_{2,2}(x) = \frac{3}{2}$	$p_{2,3}(x)$	
$x_3$	$p_{3,3}(x)$		$p_{0,3}(x)$

$$p_{i,j}(x) = \frac{(x - x_j) p_{i,j-1}(x) + (x_i - x) p_{i+1,j}(x)}{x_i - x_j}$$

## Pirámide de Neville

Para  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$ ,  $x=5/2$ ,  $x_0=1$ ,  $x_1=2$ ,  $x_2=3$  y  $x_3=4$

$x_i$	$y_i = f(x_i)$	$P_1(x) = \frac{1}{2} \quad P_2(x) = \frac{17}{16} \quad P_3(x) = \frac{33}{32}$		
$x_0 = 1$	$p_{0,0}(x) = 2$	$p_{0,1}(x) = \frac{1}{2}$	$p_{0,2}(x) = \frac{17}{16}$	$p_{0,3}(x) = \frac{33}{32}$
$x_1 = 2$	$p_{1,1}(x) = 1$			
$x_2 = 3$	$p_{2,2}(x) = \frac{3}{2}$	$p_{1,2}(x) = \frac{5}{4}$		
$x_3 = 4$	$p_{3,3}(x) = 4$	$p_{2,3}(x) = \frac{1}{4}$	$p_{1,3}(x) = 1$	

$$p_{i,j}(x) = \frac{(x - x_j)p_{i,j-1}(x) + (x_i - x)p_{i+1,j}(x)}{x_i - x_j}$$

# ***Interpolación***

- Concepto y Teorema de la Aproximación
- Interpolación de Lagrange
- Tablas de interpolación
- Diferencias divididas

## ***Diferencias divididas***

Si con las tablas de los métodos anteriores intentamos obtener una expresión genérica del polinomio  $P_n(x)$ , es decir, en función de  $x$ , esta nos va a resultar compleja y difícil de manejar.

El siguiente método permite obtener la expresión explícita del polinomio de interpolación, y por eso resulta el más útil cuando luego se pretende derivar, integrar u operar en general con el polinomio.

## ***Diferencias divididas***

En el método de Diferencias divididas, el polinomio se obtiene mediante la siguiente expresión:

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k](x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})$$

donde

$$\begin{aligned} f[x_i] &= f(x_i) \\ f[x_i, x_{i+1}] &= \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i} \\ &\vdots \\ f[x_i, \dots, x_{i+k}] &= \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i} \end{aligned}$$



# ***Pirámide de Diferencias divididas***

Pirámide para calcular  $P_n(x)$  para  $n=3$ :

$x_i$	$f[x_i]$
$x_0$	$f(x_0)$
$x_1$	$f(x_1)$
$x_2$	$f(x_2)$
$x_3$	$f(x_3)$

$$f[x_i] = f(x_i)$$

# ***Pirámide de Diferencias divididas***

Pirámide para calcular  $P_n(x)$  para  $n=3$ :

$x_i$	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$
$x_0$	$f(x_0)$	
$x_1$	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$
$x_2$	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$
$x_3$	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}$$

# Pirámide de Diferencias divididas

Pirámide para calcular  $P_n(x)$  para  $n=3$ :

$x_i$	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$
$x_0$	$f(x_0)$	
$x_1$	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$
$x_2$	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$
$x_3$	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}$$

# Pirámide de Diferencias divididas

Pirámide para calcular  $P_n(x)$  para  $n=3$ :

$x_i$	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$
$x_0$	$f(x_0)$	
$x_1$	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$
$x_2$	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$
$x_3$	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$f[x_1, x_2] = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}$$

# Pirámide de Diferencias divididas

Pirámide para calcular  $P_n(x)$  para  $n=3$ :

$x_i$	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$
$x_0$	$f(x_0)$	
$x_1$	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$
$x_2$	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$
$x_3$	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$f[x_1, x_2] = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

$$f[x_2, x_3] = \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}$$

# Pirámide de Diferencias divididas

Pirámide para calcular  $P_n(x)$  para  $n=3$ :

$x_i$	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$	...	$f[x_{i-3}, \dots, x_i]$
$x_0$	$f(x_0)$				
$x_1$	$f(x_1)$				
$x_2$	$f(x_2)$				
$x_3$	$f(x_3)$				

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$$

# Pirámide de Diferencias divididas

Pirámide para calcular  $P_n(x)$  para  $n=3$ :

$x_i$	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$	...	$f[x_{i-3}, \dots, x_i]$
$x_0$	$f(x_0)$	$f[x_0, x_1]$	$f[x_0, x_1, x_2]$ $f[x_1, x_2, x_3]$		
$x_1$	$f(x_1)$	$f[x_1, x_2]$			
$x_2$	$f(x_2)$	$f[x_2, x_3]$			
$x_3$	$f(x_3)$				

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$$

# Pirámide de Diferencias divididas

Pirámide para calcular  $P_n(x)$  para  $n=3$ :

$x_i$	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$	...	$f[x_{i-3}, \dots, x_i]$
$x_0$	$f(x_0)$				
$x_1$	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$			
$x_2$	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$		
$x_3$	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$	$f[x_1, x_2, x_3]$		

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} \quad f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1}$$



# Pirámide de Diferencias divididas

Pirámide para calcular  $P_n(x)$  para  $n=3$ :

$x_i$	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$	...	$f[x_{i-3}, \dots, x_i]$
$x_0$	$f(x_0)$				
		$f[x_0, x_1]$			
$x_1$	$f(x_1)$		$f[x_0, x_1, x_2]$		
		$f[x_1, x_2]$			$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
$x_2$	$f(x_2)$		$f[x_1, x_2, x_3]$		
		$f[x_2, x_3]$			
$x_3$	$f(x_3)$				

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} \quad f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1}$$

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0}$$

# Pirámide de Diferencias divididas

Pirámide para calcular  $P_n(x)$  para  $n=3$ :

$x_i$	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$	...	$f[x_{i-3}, \dots, x_i]$
$x_0$	$f(x_0)$				
$x_1$	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$			
$x_2$	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$		
$x_3$	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$	

Los valores para calcular  $P_n(x)$  son los de la diagonal superior:

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k](x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})$$

# Pirámide de Diferencias divididas

Pirámide para calcular  $P_n(x)$  para  $n=3$ :

$x_i$	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$	...	$f[x_{i-3}, \dots, x_i]$
$x_0$	$f(x_0)$				
$x_1$	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$			
$x_2$	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$		
$x_3$	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$	

Los valores para calcular  $P_n(x)$  son los de la diagonal superior:

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k](x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})$$

$$P_3(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

# ***Ejemplo 1 de Diferencias divididas***

Para  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$ ,  $x=5/2$ ,  $x_0=1$ ,  $x_1=2$ ,  $x_2=3$  y  $x_3=4$

$x_i$	$f[x_i]$
$x_0 = 1$	
$x_1 = 2$	
$x_2 = 3$	
$x_3 = 4$	

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$$

# ***Ejemplo 1 de Diferencias divididas***

Para  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$ ,  $x=5/2$ ,  $x_0=1$ ,  $x_1=2$ ,  $x_2=3$  y  $x_3=4$

$x_i$	$f[x_i]$	
$x_0 = 1$	2	$\left( \frac{1-2}{2-1} \right) = -1$ $\left( \frac{3/2-1}{3-2} \right) = \frac{1}{2}$ $\left( \frac{4-3/2}{4-3} \right) = \frac{5}{2}$
$x_1 = 2$	1	
$x_2 = 3$	$\frac{3}{2}$	
$x_3 = 4$	4	

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$$

## Ejemplo 1 de Diferencias divididas

Para  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$ ,  $x=5/2$ ,  $x_0=1$ ,  $x_1=2$ ,  $x_2=3$  y  $x_3=4$

$x_i$	$f[x_i]$		
$x_0 = 1$	2	$\left(\frac{1-2}{2-1}\right) = -1$ $\left(\frac{3/2-1}{3-2}\right) = \frac{1}{2}$ $\left(\frac{4-3/2}{4-3}\right) = \frac{5}{2}$	$\left(\frac{1/2+1}{3-1}\right) = \frac{3}{4}$ $\left(\frac{5/2-1/2}{4-2}\right) = 1$
$x_1 = 2$	1		
$x_2 = 3$	$\frac{3}{2}$		
$x_3 = 4$	4		

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$$

# Ejemplo 1 de Diferencias divididas

Para  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$ ,  $x=5/2$ ,  $x_0=1$ ,  $x_1=2$ ,  $x_2=3$  y  $x_3=4$

$x_i$	$f[x_i]$			
$x_0 = 1$	2	$\left(\frac{1-2}{2-1}\right) = -1$	$\left(\frac{1/2+1}{3-1}\right) = \frac{3}{4}$	$\left(\frac{1-3/4}{4-1}\right) = \frac{1}{12}$
$x_1 = 2$	1			
$x_2 = 3$	$\frac{3}{2}$	$\left(\frac{3/2-1}{3-2}\right) = \frac{1}{2}$	$\left(\frac{5/2-1/2}{4-2}\right) = 1$	
$x_3 = 4$	4	$\left(\frac{4-3/2}{4-3}\right) = \frac{5}{2}$		

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$$

## Ejemplo 1 de Diferencias divididas

Para  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$ ,  $x=5/2$ ,  $x_0=1$ ,  $x_1=2$ ,  $x_2=3$  y  $x_3=4$

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k](x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})$$

$x_i$	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-3}, \dots, x_i]$
$x_0 = 1$	2			
$x_1 = 2$	1	-1		
$x_2 = 3$	$3/2$	$1/2$	$3/4$	
$x_3 = 4$	4	$5/2$	1	$1/12$

$$P_1(x) = 2 - 1(x - 1)$$

$$P_1(5/2) = 2 - (5/2 - 1) = 1/2$$



## Ejemplo 1 de Diferencias divididas

Para  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$ ,  $x=5/2$ ,  $x_0=1$ ,  $x_1=2$ ,  $x_2=3$  y  $x_3=4$

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k](x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})$$

$x_i$	$f[x_i]$			
$x_0 = 1$	2	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-3}, \dots, x_i]$
$x_1 = 2$	1	-1	3/4	1/12
$x_2 = 3$	3/2	1/2	1	
$x_3 = 4$	4	5/2		

$$P_2(x) = \boxed{2 - 1(x-1)} + (3/4)(x-1)(x-2)$$

$$P_2(x) = \boxed{P_1(x)} + (3/4)(x-1)(x-2)$$

$$P_2(5/2) = 1/2 + (3/4)(3/2)(1/2) = 8/16 + 9/16 = 17/16$$

# Ejemplo 1 de Diferencias divididas

Para  $f(x)=(x/2)^{(x-2)}$ ,  $x=5/2$ ,  $x_0=1$ ,  $x_1=2$ ,  $x_2=3$  y  $x_3=4$

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k](x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})$$

$x_i$	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-3}, \dots, x_i]$
$x_0 = 1$	2			
$x_1 = 2$	1	-1		
$x_2 = 3$	$3/2$	$1/2$	$3/4$	
$x_3 = 4$	4	$5/2$	1	$1/12$

$$P_3(x) = 2 - 1(x-1) + (3/4)(x-1)(x-2) + (1/12)(x-1)(x-2)(x-3)$$

$$P_3(x) = P_2(x) + (1/12)(x-1)(x-2)(x-3)$$

$$P_3(5/2) = 17/16 + (1/12)(3/2)(1/2)(-1/2) = 17/16 - 1/32 = 33/32$$

## ***Ejemplo 2 de Diferencias divididas***

Obtén el polinomio de interpolación de una función de la que se sabe la siguiente tabla de valores:

$x$	$f(x)$
-1	15
0	8
3	-1

## ***Ejemplo 2 de Diferencias divididas***

Obtén el polinomio de interpolación de una función de la que se sabe la siguiente tabla de valores:

$x_i$	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$
-1	15	
0	8	-7
3	-1	-3

$$f[x_0, x_1] = \frac{8 - 15}{0 - (-1)}$$

$$f[x_1, x_2] = \frac{-1 - 8}{3 - 0}$$

## ***Ejemplo 2 de Diferencias divididas***

Obtén el polinomio de interpolación de una función de la que se sabe la siguiente tabla de valores:

$x_i$	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$
-1	15		
0	8	-7	
3	-1	-3	1

$$f[x_0, x_1] = \frac{8 - 15}{0 - (-1)}$$

$$f[x_1, x_2] = \frac{-1 - 8}{3 - 0}$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{-3 - (-7)}{-1 - 3}$$

## Ejemplo 2 de Diferencias divididas

Obtén el polinomio de interpolación de una función de la que se sabe la siguiente tabla de valores:

$x_i$	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$
-1	15		
0	8	-7	
3	-1	-3	1

$$f[x_0, x_1] = \frac{8 - 15}{0 - (-1)}$$

$$f[x_1, x_2] = \frac{-1 - 8}{3 - 0}$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{-3 - 7}{3 - (-1)}$$

$$P_2(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1)$$

$$P_2(x) = 15 - 7(x + 1) + 1(x + 1)(x - 0) = x^2 - 6x + 8$$

## Ejemplo 2 de Diferencias divididas

Amplía el polinomio de interpolación un grado con un nuevo valor para  $x_3$  y  $f(x_3)$ :

$$P_2(x) = x^2 - 6x + 8$$

$x_i$	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-3}, x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$
-1	15	-7	1	
0	8	-3		
3	-1			
5	-5			

## Ejemplo 2 de Diferencias divididas

Amplía el polinomio de interpolación un grado con un nuevo valor para  $x_3$  y  $f(x_3)$ :

$$P_2(x) = x^2 - 6x + 8$$

$x_i$	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-3}, x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$
-1	15	-7	1	
0	8	-3		
3	-1	-2		
5	-5			

$$f[x_2, x_3] = \frac{-5 + 1}{5 - 3}$$



## Ejemplo 2 de Diferencias divididas

Amplía el polinomio de interpolación un grado con un nuevo valor para  $x_3$  y  $f(x_3)$ :

$$P_2(x) = x^2 - 6x + 8$$

$x_i$	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-3}, x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$
-1	15	-7	1	
0	8	-3	1/5	
3	-1	-2		
5	-5			

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{-2+3}{5-0}$$

## Ejemplo 2 de Diferencias divididas

Amplía el polinomio de interpolación un grado con un nuevo valor para  $x_3$  y  $f(x_3)$ :

$$P_2(x) = x^2 - 6x + 8$$

$x_i$	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-3}, x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$
-1	15	-7	1	-2/15
0	8	-3	1/5	
3	-1	-2		
5	-5			

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{1/5 - 1}{5 + 1}$$

## Ejemplo 2 de Diferencias divididas

Amplía el polinomio de interpolación un grado con un nuevo valor para  $x_3$  y  $f(x_3)$ :

$$P_2(x) = x^2 - 6x + 8$$

$x_i$	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-3}, x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$
-1	15	-7	1	-2/15
0	8	-3	1/5	
3	-1	-2		
5	-5			

$$P_3(x) = P_2(x) + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

$$\begin{aligned} P_3(x) &= x^2 - 6x + 8 - 2/15(x+1)x(x-3) = \\ &= x^2 - 6x + 8 - 2/15(x^3 + 2x^2 - 3x) \end{aligned}$$

## Ejemplo 2 de Diferencias divididas

Amplía el polinomio de interpolación un grado con un nuevo valor para  $x_3$  y  $f(x_3)$ :

$$P_2(x) = x^2 - 6x + 8$$

$x_i$	$f[x_i]$	$f[x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$	$f[x_{i-3}, x_{i-2}, x_{i-1}, x_i]$
-1	15	-7	1	-2/15
0	8	-3	1/5	
3	-1	-2		
5	-5			

$$P_3(x) = P_2(x) + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

$$P_3(x) = \frac{-2x^3}{15} + \frac{3x^2}{5} - \frac{28x}{5} + 8$$