

El ciclo de materia bariónica en las galaxias

Alfredo J. Mejía^{1,2}

¹Posgrado de Física Fundamental
Universidad de Los Andes

²Centro de Investigaciones de Astronomía

14 de agosto de 2017

MOTIVACIÓN I

Los estudios del contenido estelar en las galaxias distantes ($z \sim 3$) solo tienen sentido en el límite de un número significativo de observaciones, pues debido a la gran variedad de fenómenos físicos que tienen lugar en estos sistemas (muchos aún en discusión) y distintas a las escalas temporales y espaciales en que estos ocurren, no es posible resolver las propiedades físicas de galaxias individuales de manera robusta. Por supuesto, las incertidumbres en los ingredientes de los modelos también juegan un papel importante. Aunque en principio en el universo local las galaxias se pueden resolver como imágenes extendidas en una exposición astronómica usando la técnica de la fotometría, la resolución espectral provista por esta clase de sondeos aunada al carácter degenerado del problema limitan considerablemente la información que se puede extraer de estos sondeos. Hoy en día existen sondeos espectroscópicos que proporcionan información espectral mucho más detallada y que permiten resolver espacialmente a las galaxias en el universo local. La disponibilidad de estos datos en efecto nos ha

MOTIVACIÓN II

permitido estudiar en un nivel de detalle sin precedentes las escalas temporales y espaciales de los fenómenos físicos que ocurren en las galaxias a lo largo de la secuencia de Hubble. En este seminario les hablaré en particular de la relación entre la masa estelar, la tasa de formación estelar y la metalicidad estelar (esencialmente el ciclo de la materia bariónica en las galaxias) en la era dorada de sondeos con unidades de campo integral.

EXPECTATIVAS TEÓRICAS I

Simplemente considerando el tiempo de vida de aquellas estrellas que contribuyen al enriquecimiento del medio interestelar, en el cual se formará la siguiente generación de estrellas, uno puede tener una idea de la escala típica de enriquecimiento químico en una galaxia.

Una supernova tipo II retorna especies químicas más pesadas que el O (e.g. Mg, Ca, Ti y Si) en cuestión de unos 10^7 años. Las supernovas tipo Ia enriquecen el medio en una escala que puede ir desde 10^7 años hasta $\sim 10^9$ años. En las estrellas de baja masa, que pueden vivir por $> 3 \times 10^9$ años muestran evidencia de esta evolución química en sus distribuciones espectrales de energía. En galaxias tempranas estas son las estrellas que dominan su distribución espectral de energía, por lo tanto no es sorprendente que la primera evidencia de una relación entre la edad y la metalicidad de una galaxia se encontrara en estos sistemas.

En galaxias tardías, los rasgos de metalicidad *estelar* en el óptico son débiles, mientras que la emisión del MIE difuso permite estimar la metalicidad en fase de

EXPECTATIVAS TEÓRICAS II

gas. En estas galaxias es relativamente fácil estimar la TFE mediante la emisión de $H\alpha$, por ejemplo, de manera que se puede estudiar la primera relación fundamental del ciclo de masa bariónica.

Relaciones clásicas

RELACIÓN MASA-TFE. La relación entre la masa y la TFE es probablemente la relación más estudiada del ciclo de masa bariónica (**Schmidt1959**; **Kennicutt1998**). Por ejemplo **Brinchmann2004** estimó la TFE de las galaxias con formación estelar reciente del universo local muestreado por el SDSS. Ellos encuentran una correlación directa entre la masa estelar y la TFE. Ahora la masa por sí sola dice simplemente cuánto material bariónico existe en estrellas, pero no dice nada de como está distribuido el material que es, según la ley de Kennicutt-Schmidt, la relación fundamental entre la masa y la TFE. En este sentido, es interesante ver que la relación entre la TFE específica y la masa no es tan estrecha como la relación entre la TFE específica y la densidad superficial de masa. Un resultado que apunta a una relación con fenómenos del tipo local.

RELACIÓN MASA-METALICIDAD. En los sistemas con formación estelar reciente, es particularmente sencillo estimar la metalicidad del MIE en fase de gas debido a la presencia de la emisión del gas. Tremonti y col. (2004) estimaron

RELACIONES VISTAS POR CALIFA I

La madurez alcanzada por los sondeos con IFU en la última década ha permitido la construcción de muestras de galaxias de todas las clases espectrales. La culminación del sondeo CALIFA (Sánchez y col., [2012](#), [2016](#)) ha significado un hito en este sentido, pues con el tercer *public data release* se ha puesto a la disposición de la comunidad astronómica $\sim 600 \times 1000$ espectros en el rango $\sim 3000\text{—}7000\text{ \AA}$ para ~ 600 galaxias en el universo local. Ante las incertidumbres y las preguntas que quedaban abiertas respecto a la relación entre la edad, la masa y la metalicidad, sobre todo en sistemas con formación estelar, CALIFA presenta una oportunidad inigualable. Los estudios que buscaban desentrañar el carácter local de las relaciones de escala no tardaron en aparecer:

RELACIONES VISTAS POR CALIFA II

RELACIÓN MASA-METALICIDAD. Rosales-Ortega y col. (2012) estudia por primera vez la relación entre la masa, la metalicidad y la tasa de TFE específica en $\sim 2\text{ k}$ regiones HII segregadas en una muestra de galaxias tardías sondeadas por CALIFA. Encontraron que la densidad superficial de masa y la metalicidad en las regiones HII están directamente correlacionadas y ambas propiedades inversamente correlacionadas con la TFE específica. Rosales-Ortega y col. demostraron que la relación masa-metalicidad encontrada en estudios usando datos integrados (con efectos de apertura incluidos) puede explicarse como la suma de dos efectos: un crecimiento tipo *inside-out*, en el que la región central de las galaxias se forma primero y luego la formación estelar se extiende sobre el disco; y un efecto de *downsizing* local, donde las regiones más masivas forman estrellas más rápido y por lo tanto en una escala temporal más corta. Ambos fenómenos a su vez explican los gradientes radiales observados en galaxias con discos.

RELACIONES VISTAS POR CALIFA III

Es interesante notar también que el hecho de que la relación masa-metalicidad tenga un origen local sugiere que esta es en realidad una secuencia en astración, i. e., en las zonas de mayor formación estelar el enriquecimiento químico ocurre en una escala temporal más corta, mientras que en las de menor formación estelar los metales quedan atrapados en el interior de las estrellas de baja masa por más tiempo.

FENÓMENOS LOCALES *versus* GLOBALES. Comparar el rol de los fenómenos locales y globales resulta entonces muy interesante de cara a un mejor entendimiento del ciclo de masa bariónica. González Delgado y col. (2014) estudió el rol de los efectos locales en la relación masa-metalicidad estelar. Ellos lograron recuperar las mismas tendencias en la relación masa-metalicidad (en fase de gas y estelar). Mostraron que la metalicidad en fase de gas, es trazador de la metalicidad en las poblaciones jóvenes, como es de esperarse en sistemas con formación estelar reciente donde el reciclaje ocurre en una escala de

RELACIONES VISTAS POR CALIFA IV

tiempo muy corta. La relación masa-metalicidad como función de la distancia al centro de las galaxias mostraba una dispersión en metalicidad que era claramente modulada por los efectos globales medidos por la masa estelar integrada de las galaxias. En las regiones menos densas (externas), por otro lado la densidad superficial de masa estelar correlaciona con la metalicidad estelar, como encontró Sánchez y col. ([2013](#)). Más interesante aún, la relación masa-metalicidad depende del radio dentro de la galaxia donde, en acuerdo con los resultados en González Delgado y col. ([2014](#)), la densidad de masa regula la metalicidad estelar, mientras que en las regiones más internas y por lo tanto más densas, la masa global regula la metalicidad.

RELACIONES VISTAS POR CALIFA V

RELACIÓN MASA-METALICIDAD-TFE. Esta relación, también llamada relación fundamental (o plano fundamental) de masa-metalicidad ya había sido estudiada (**Mannucci2010**; Lara-López y col., [2010](#)) y tiene la siguiente forma: a una masa fija, las galaxias con mayor TFE tienen menor metalicidad y para galaxias de baja masa esta dependencia con la TFE es más fuerte. Existen varios fenómenos que pueden alterar la abundancia química presente en una galaxia: el enriquecimiento es producido en primer lugar por la formación y la evolución estelar, la acreción de material pristino del medio intergaláctico que diluye y disminuye la metalicidad, y las corrientes de salida que eyectan material enriquecido al medio intergaláctico. Sin embargo, Sánchez y col. ([2013](#)) mostró que la correlación entre la TFE y la metalicidad (local e integrada) es producto de ambos, el sesgo de apertura introducido por los sondeos espectroscópicos tradicionales y porque la relación entre la metalicidad y la TFE es inducida a través de

RELACIONES VISTAS POR CALIFA VI

la relación de estas dos propiedades con la masa estelar. Las relaciones masa-TFE y masa-metalicidad han sido conocidas desde hace mucho tiempo y a estas alturas ya no se discuten. La primera es entendida en el marco del fenómeno de acreción de gas del medio intergaláctico, mientras que la segunda es entendida en la capacidad de las galaxias por retener los metales que producen.

Los resultados de Sánchez y col. de nuevo ponen en el tapete la necesidad de introducir fenómenos reguladores para explicar de manera convincente la ausencia de una relación TFE-metalicidad.

Prólogo — una visión teórica del ciclo de masa I

FENÓMENOS RELEVANTES Y SUS ESCALAS. Los fenómenos dinámicos son los más fundamentales, así que la masa estelar (como aproximación de la masa bariónica) y su densidad superficial serán consideradas cantidades importantes en el ciclo de masa. La masa sola contiene información global sobre la dinámica de la galaxia, mientras que la densidad superficial contiene información local.

La capacidad del material bariónico en fase de gas para radiar su energía interna, define la escala temporal termodinámica en el que material del reservorio caliente se mueve al frío. La formación estelar define la escala típica en que el material del reservorio frío se mueve al reservorio estelar. Ahora, dos preguntas interesantes después de haber visto lo que las observaciones indican y en el marco de estos procesos físicos son: ¿en qué escala temporal ocurre el enriquecimiento químico? y más importante aún ¿por qué este parece ser independiente de la TFE? En la siguiente figura

Prólogo — una visión teórica del ciclo de masa II

está representado esquemáticamente el ciclo de masa bariónica en una galaxia. Tres reservorios son importantes: el estelar y los de gas caliente y frío. Por supuesto entre los tres habrá intercambio de materia debido a los procesos de enfriamiento del gas caliente, la formación estelar y el *feedback* debido a vientos estelares y explosiones de supernova. Dependiendo de las propiedades dinámicas de la galaxias, una fracción del material expulsado por las estrellas puede ir directo al reservorio de gas caliente.

Debido a la evolución estelar, parte del material devuelto al MIE está enriquecido químicamente, de manera que las siguientes generaciones de estrellas tendrán una metalicidad cada vez más alta. Suponiendo

Prólogo — una visión teórica del ciclo de masa III

conservación de la masa, el transporte de material de un reservorio a otro puede describirse mediante las ecuaciones de continuidad:

$$\dot{M}_{\star} = (1 - R)\psi \quad (1a)$$

$$\dot{M}_{\text{hot}} = -\dot{M}_{\text{cool}} + \beta\psi \quad (1b)$$

$$\dot{M}_{\text{cold}} = \dot{M}_{\text{cool}} - (1 - R + \beta)\psi \quad (1c)$$

$$\dot{M}_{\star}^Z = (1 - R)Z_{\text{cold}}\psi \quad (1d)$$

$$\dot{M}_{\text{hot}}^Z = -\dot{M}_{\text{cool}}Z_{\text{hot}} + (pe + \beta Z_{\text{cold}})\psi \quad (1e)$$

$$\dot{M}_{\text{cold}}^Z = \dot{M}_{\text{cool}}Z_{\text{hot}} + [p(1 - e) - (1 + \beta - R)Z_{\text{cold}}]\psi \quad (1f)$$

Ahora, estamos particularmente interesados en calcular la TEQ estelar y en fase de gas (frío), porque son las que podemos estimar a partir de las

Prólogo — una visión teórica del ciclo de masa IV

observaciones con relativa facilidad. Usando la relación $Z \equiv M^Z/M$ y las ecuaciones del ciclo de masa tenemos que:

$$\dot{Z}_\star = (1 - R) \frac{\psi}{M_\star} (Z_{\text{cold}} - Z_\star) \quad (2a)$$

$$\dot{Z}_{\text{cold}} = (Z_{\text{hot}} - Z_{\text{cold}}) \frac{\dot{M}_{\text{cool}}}{M_{\text{cold}}} + p(1 - e) \frac{\psi}{M_{\text{cold}}} \quad (2b)$$

Es interesante notar que el enriquecimiento químico estelar ocurre en la misma escala temporal en que ocurre la formación estelar. En este caso, la dependencia con la densidad de masa se puede justificar directamente de la ley de KS, que supone que:

$$\tau_\star \equiv \frac{\Sigma_{\text{cold}}}{\Sigma_\psi} = (4 \pm 1) \times 10^9 \text{ años} \left(\frac{\Sigma_{\text{cold}}}{1 \text{ M}_\odot \text{ pc}^{-2}} \right)^{-(0,4 \pm 0,15)} \quad (3)$$

Prólogo — una visión teórica del ciclo de masa V

De manera que las conclusiones de González Delgado y col. (2014) cobran sentido en el terreno teórico: el enriquecimiento químico estelar depende de ambos, fenómenos locales ($\mu_{\star} \sim \Sigma_{\text{cold}}$) que regulan la evolución química y globales (M_{\star}) que modulan la amplitud de esta.

La TEQ del gas en el reservorio frío depende de la tasa de enfriamiento y de la TFE. Intuitivamente se espera que la escala temporal dinámica sea más corta que la escala térmica. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias (densidad, temperatura y metalicidad) la escala temporal de enfriamiento puede ser más corta. De hecho la dependencia de la escala temporal de enfriamiento con la densidad, la temperatura y la metalicidad del gas caliente es:

$$\tau_{\text{cool}} \approx 10 \times 10^9 \text{ años} \left(\frac{T_{\text{hot}}}{10^7 \text{ K}} \right) \left(\frac{10^{-3} \text{ cm}^{-3}}{\rho_{\text{hot}}} \right) \left(\frac{10^{-23} \text{ erg cm}^{-3} \text{ s}^{-1}}{\Lambda(T_{\text{hot}}, Z_{\text{hot}})} \right) \quad (4)$$

¿CAJA CERRADA?

Prólogo — expectativas para el futuro I

Los procesos locales responsables de regular la formación estelar y el enriquecimiento químico, son probablemente los tópicos más relevantes en la literatura extragaláctica en la actualidad. Mucho se ha avanzado desde el punto de vista observacional con los sondeos de IFS. En este sentido, CALIFA ha marcado un hito, pues ha puesto a la disposición de la comunidad científica espectroscopía de campo integrado de una muestra de ~ 600 galaxias distribuidas a lo largo de la clasificación de Hubble. Ahora podemos decir con seguridad que ambos, los efectos globales y los locales determinan la HFE en las galaxias y que el paradigma de caja cerrada comunmente adoptado para decir algo respecto al enriquecimiento químico, no tiene cabida de manera universal, no entre galaxias ni dentro de una misma galaxia. Quedan aún incertidumbres sobre el rol relativo que juegan la TFE, los vientos galácticos y el acrecimiento de material enriquecido presente en el medio intergaláctico. El *feedback* estelar se ha invocado para explicar la ausencia de metales en el medio interestelar (Tremonti y col., [2004](#); Kobayashi, Springel

Prólogo — expectativas para el futuro II

y White, [2007](#)). Las variaciones en la función inicial de masa se han invocado como un mecanismo adicional para explicar la ausencia de metales en las galaxias menos masivas (Köppen, Weidner y Kroupa, [2007](#)). Todos estos mecanismos se ha medido tanto en observaciones como en simulaciones en estudios independientes, mas aún no son mutuamente excluyentes. Determinar cual(es) y bajo que circunstancias actúan para regular la HFE en las galaxias, será tópico de investigación por los próximos años.

ANTECEDENTES DE SONDEOS CON IFU I

El problema de adquisición de imágenes astronómicas es, en el sentido general, un problema de dos dimensiones espaciales y una dimensión espectral $(x, y; \lambda)$. Desafortunadamente, debido a limitaciones de ingeniería, la mayoría de los esfuerzos que ofrecen una resolución espectral $R \sim 1000$, están limitados a una dimensión espacial, i. e. $(x; \lambda)$. El uso del formato *long-slit* (rendija) resuelve parcialmente el problema de la dimensión perdida por espectrógrafos convencionales: si la dispersión de la luz proveniente de las fuentes se hace perpendicular al largo de la rendija, es posible en principio obtener espectros de distintas regiones de un mismo objeto extendido (e. g. una galaxia en el Universo local) o de varios objetos adyacentes en su proyección en el cielo. Existen sin embargo varias limitaciones que complican la adquisición efectiva de la segunda dimensión usando este formato, todas relacionadas con el hecho de que las componentes espaciales y la espectral están correlacionadas.

ANTECEDENTES DE SONDEOS CON IFU II

Las unidades de campo integrado (IFU en inglés Vanderriest, [1980](#)) aparecieron en escena para resolver las limitaciones de resolución espacial de los previos intentos por registrar espectros de los objetos celestes. Vanderriest presentó un primer prototipo de IFU que consistía en un arreglo de fibras ópticas con forma hexagonal capaz de resolver espacialmente objetos en un campo de unas pocas decenas de segundos de arco ($\sim 20''$) y bajo brillo superficial. Tal dispositivo permitiría estudios de objetos cercanos siempre que la resolución espectral no fuera un factor importante para su desarrollo.

A mediados de los 90s aparecieron los primeros resultados obtenidos a partir del análisis de datos de IFU como fuera concebida por Courtes ([1982](#)) (véase Bacon y col., [1995](#), para un resumen de los hallazgos con el dispositivo TIGER).

- Primera medida de campos de velocidad estelar en la región central de galaxias cercanas (Bacon y col., [1995](#)).

ANTECEDENTES DE SONDEOS CON IFU III

- Prueba de que las componentes de la cruz de Einstein (2237+0305) son en realidad imágenes múltiples del mismo objeto (Fitte y Adam, [1994](#)).
- Se logró resolver y mapear fuentes de emisión y continuo en NGC 1275 (Ferruit y Pecontal, [1994](#)).
- etc.

Las principales limitaciones eran el campo de visión, que seguía siendo demasiado pequeño para un estudio sistemático de una fuente extendida y la resolución espectral.

En los últimos 20 años las IFU han alcanzado madurez y han permitido estudios sistemáticos de muestras completas de galaxias en el universo local, abarcando en la mayoría de los casos la totalidad de la imagen proyectada de los objetos. En buena parte de lo que resta de este seminario hablaré de los resultados más importantes que estos sondeos han permitido y en qué sentido han cambiado los paradigmas en el contexto de la formación y la evolución de las galaxias.

SONDEOS CON IFU EN LA ACTUALIDAD I

Las IFU de la actualidad (< 2012) presentan las siguientes ventajas frente a la primera generación de IFUs:

- Tienen grandes campos de visión, usualmente permitiendo abarcar la imagen proyectada de galaxias a $z \sim 0,05$
- Tienen una mejor función de respuesta que permite integrar espectros de fuentes más débiles en exposiciones cortas ~ 30 min.

. Aún así, dos principales desventajas permanecen: la limitada resolución espectral y solo una fuente por exposición puede observarse.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DATOS I

Los datos que se obtienen viven en el espacio (x, y, λ) , por lo tanto la información que permitiría construir mapas de determinada información espectral, a una resolución espacial fija, depende del rango y de la resolución espectral. Desde el punto de vista poblacional, probablemente los estudios más atractivos tienen que ver con la dependencia ambiental de las propiedades físicas de las galaxias, i. e., cómo cambian los promedios en la edad, la composición química, las propiedades del polvo, tasa de formación estelar (TFE), como función de la densidad bariónica, por ejemplo y a su vez como cambian estas propiedades de una galaxia a otra. Por supuesto, como mostré en el seminario anterior, los resultados de sondeos con IFU han permitido el refinamiento de los modelos dinámicos de galaxias y una clasificación morfológica basada en las propiedades físicas de las galaxias. El seminario anterior fue intencionalmente sesgado a galaxias tempranas porque la mayoría de los esfuerzos de los sondeos con IFU están también sesgados de la misma manera. Construir muestras de galaxias que permitan estudios cinemáticos

CARACTERÍSTICAS DE LOS DATOS II

sistemáticos necesariamente impondrá un sesgo hacia galaxias tempranas. Ahora mostraré los resultados de los estudios poblacionales, en los que la secuencia de Hubble se abarca en completitud. Por lo tanto los resultados que mostraré estarán claramente sesgados hacia los de CALIFA, que ya ha completado el sondeo de la muestra







Referencias I

- 📄 Vanderriest, C. (1980). "A fiber-optics dissector for spectroscopy of nebulosities around quasars and similar objects". En: *PASP* 92, págs. 858–862.
- 📄 Courtes, G. (1982). "An Integral Field Spectrograph (IFS) for Large Telescopes". En: *IAU Colloq. 67: Instrumentation for Astronomy with Large Optical Telescopes*. Ed. por C. M. Humphries. Vol. 92. Astrophysics and Space Science Library, pág. 123.
- 📄 Ferruit, P. y E. Pecontal (1994). "Sub-arcsecond resolution 2D spectrography of the central regions of NGC 1275 with TIGER". En: *A&A* 288, págs. 65–76.
- 📄 Fitte, C. y G. Adam (1994). "Sub-arcsecond integral field spectroscopy of the Einstein Cross 2237+0305: Lensing and microlensing effects". En: *A&A* 282, págs. 11–18.
- 📄 Worthey, G. (1994). "Comprehensive stellar population models and the disentanglement of age and metallicity effects". En: *ApJS* 95, págs. 107–149.

Referencias II

- 📄 Bacon, R. y col. (1995). "3D spectrography at high spatial resolution. I. Concept and realization of the integral field spectrograph TIGER." En: *A&AS* 113, pág. 347.
- 📄 Bell, E. F. y R. S. de Jong (2000). "The stellar populations of spiral galaxies". En: *MNRAS* 312, págs. 497-520.
- 📄 Proctor, R. N. y A. E. Sansom (2002). "A comparison of stellar populations in galaxy spheroids across a wide range of Hubble types". En: *MNRAS* 333, págs. 517-543.
- 📄 Terlevich, A. I. y D. A. Forbes (2002). "A catalogue and analysis of local galaxy ages and metallicities". En: *MNRAS* 330, págs. 547-562.
- 📄 Tremonti, C. A. y col. (2004). "The Origin of the Mass-Metallicity Relation: Insights from 53,000 Star-forming Galaxies in the Sloan Digital Sky Survey". En: *ApJ* 613, págs. 898-913.
- 📄 Gallazzi, A. y col. (2005). "The ages and metallicities of galaxies in the local universe". En: *MNRAS* 362, págs. 41-58.

Referencias III

-  Kobayashi, C., V. Springel y S. D. M. White (2007). "Simulations of Cosmic Chemical Enrichment". En: *MNRAS* 376, págs. 1465–1479.
-  Köppen, J., C. Weidner y P. Kroupa (2007). "A possible origin of the mass-metallicity relation of galaxies". En: *MNRAS* 375, págs. 673–684.
-  Eminian, C. y col. (2008). "Physical interpretation of the near-infrared colours of low-redshift galaxies". En: *MNRAS* 384, págs. 930–942.
-  Lara-López, M. A. y col. (2010). "A fundamental plane for field star-forming galaxies". En: *A&A* 521, L53, pág. L53.
-  Rosales-Ortega, F. F. y col. (2012). "A New Scaling Relation for H II Regions in Spiral Galaxies: Unveiling the True Nature of the Mass–Metallicity Relation". En: *ApJ* 756, L31, pág. L31.
-  Sánchez, S. F. y col. (2012). "CALIFA, the Calar Alto Legacy Integral Field Area survey. I. Survey presentation". En: *A&A* 538, A8, A8.

Referencias IV

- Conroy, C. (2013). "Modeling the Panchromatic Spectral Energy Distributions of Galaxies". En: *ARA&A* 51, págs. 393–455.
- Sánchez, S. F. y col. (2013). "Mass-metallicity relation explored with CALIFA. I. Is there a dependence on the star-formation rate?" En: *A&A* 554, A58, A58.
- Zibetti, S. y col. (2013). "Near-infrared spectroscopy of post-starburst galaxies: a limited impact of TP-AGB stars on galaxy spectral energy distributions". En: *MNRAS* 428, págs. 1479–1497.
- González Delgado, R. M. y col. (2014). "Insights on the Stellar Mass–Metallicity Relation from the CALIFA Survey". En: *ApJ* 791, L16, pág. L16.
- González Delgado, R. M. y col. (2014). "The star formation history of CALIFA galaxies: Radial structures". En: *A&A* 562, A47, A47.
- Sorba, R. y M. Sawicki (2015). "Missing stellar mass in SED fitting: spatially unresolved photometry can underestimate galaxy masses". En: *MNRAS* 452, págs. 235–245.

Referencias V

- 📄 Sánchez, S. F. y col. (2016). "CALIFA, the Calar Alto Legacy Integral Field Area survey. IV. Third public data release". En: *A&A* 594, A36, A36.