Resiliencia de *Quercus pyrenaica* a dos eventos de sequía

Perez-Luque AJ; Gea-Izquierdo G; Zamora R; Bonet FJ

Introduccion

Sequía

- Aumento en la severidad y frecuencia de los eventos de sequías en las últimas décadas, especialmente para el sur de Europa¹⁻³
- Eventos extremos P. Ibérica: 1981, 1995, 2000, 2005, 2012⁴⁻⁶

Análisis adicionales

- SPEI (Standardised Precipitation-Evapotranspiration Index) para datos regionales y locales
- Precipitación acumulada del año hidrológico en curso
- ► Long term (>1950) y short-term (>2000)

Sequía (análisis adicionales): SPEI

- Escala regional:
 - ► Datos de SPEI Global Drought Monitor para Sierra Nevada (spatial resolution of 0.5°) Ver esto
- Escala local:
 - ► Calcular datos SPEI para tres estaciones de la red RIA durante el periodo 2000 2016: Cadiar, Padul y Jerez del Marquesado
 - Curvas de precipitación acumulada RIA y datos base Aérea (obtenidos de la REDIAM) (desde 1950)
 - Ver flexdashboard drought

Drought evolution for Sierra Nevada (From year 1970) 3-month 0 --1 --2 -6-month 0 --1 -

SPEI

-2 -

Figure 1:

1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017


Para la caracterización de los dos periodos de sequía ¿Incluir alguna referencia a estos análisis (quizá como supplementary materials) o solamente referencias bibliofrágicas?

Aquí deberíamos incluir los objetivos del paper y las preguntas
 Utilizar RS information and tree ring to evaluate el efecto de
sequía

► Resiliencia ..

la

Species study



Eigura 2.

Greenness data

Para caracterizar el verdor de la vegetación utilizamos *Enhanced* $Vegetation\ Index\ (EVI)^{7-9}$:

- Mas sensible que NDVI en áreas con mucha biomasa
- La influencia de las condiciones atmosféricas en el cálculo del índice de vegetación es menor en EVI que en NDVI
- EVI corrige las señales de fondo del dosel

Dataset

- 2000-2016: Una imagen cada 16 días (23 imágenes por año)
- ▶ 250 x 250 m
- Pixels cubriendo la distribución de los robledales en Sierra Nevada (n = 928 pixels)
- MODIS MOD13Q1 Collection 6

Filtrado de datos EVI

Quality Assessment (QA band) & VI Usefulness Indices $928 \times 20 \times 1 + 928 \times 23 \times 16 = 360064$


- ▶ 208437 (57.89 %) Good Data
- ► Filter out: snow/ice (9268) + cloudy (25504) + NA (44) = 35176 (9.77 %)
- Marginal Data (32.33 %)
 - ► Explorar distribución temporal y analizar banda QA Detailed¹⁰
 - En zonas montañosas poner especial atención a datos de sombras¹⁰

Mas info del filtrado de datos

Tras el filtrado, nos quedamos con 286825 (79.65 %)

EVI anual medio

 Además del filtrado, EVI medio es estable frente a la pérdida de datos¹⁰



Anomalías estandarizadas EVI

- Computo pixel a pixel
- Proporcionan mas información sobre la magnitud de la anomalía¹¹

$$\mathrm{EVI}_{\mathrm{sa},i} = \frac{\mathrm{EVI}_{\mathrm{mean},i} - \mathrm{EVI}_{\mathrm{mean},\mathrm{ref}}}{\sigma_{\mathrm{ref}}}$$

Dendrochronological methods

- 2 localidades: SJ (norte) y CA (sur)
- 2 elevaciones por sitio (High-Low)
- Focal tree:
 - ▶ 10 15 árboles dominantes por cada sitio
 - 2 cores 5mm
 - ▶ dbh, altura
- Competencia:
 - Recuento todos los árboles (dbh > 7.5) dentro de un radio de 10 metros
 - dbh, altura, distancia árbol focal, rumbo
 - Cómputo diversos índices de competencia ver 13

References

Environmental Research Letters 9, 044001 (2014).
Spinoni, J., Naumann, G., Vogt, J. V. & Barbosa, P. The biggest drought events in europe from 1950 to 2012. Journal of Hydrology:

1. Vicente-Serrano, S. M. et al. Evidence of increasing drought

severity caused by temperature rise in southern Europe.

- Regional Studies **3**, 509–524 (2015).

 3. Stagge, J. H., Kingston, D. G., Tallaksen, L. M. & Hannah, D. M. Observed drought indices show increasing divergence across
 - Europe. Scientific Reports **7**, 14045 (2017).

 4. García-Herrera, R. et al. The Outstanding 2004/05 Drought in the Iberian Peninsula: Associated Atmospheric Circulation. Journal
 - the Iberian Peninsula: Associated Atmospheric Circulation. *Journa of Hydrometeorology* 8, 483–498 (2007).
 Gouveia, C. M., Ramos, P., Russo, A. & Trigo, R. M. Drought tronds in the Iberian Peninsula over the last 112 years in *ECU*.
- trends in the Iberian Peninsula over the last 112 years. in *EGU* general assembly conference abstracts **17**, 12680 (2015).

 6. Trigo, R. M. et al. The record Winter drought of 2011-12 in the Iberian Peninsula [in "Explaining Extreme Events of 2012 from a Climate Perspective. [Peterson, T. C., M. P. Hoerling, P.A. Stott
- and S. Herring, Eds.]. **94,** S41–S45 (2013).

 7. Huete, A. *et al.* Overview of the radiometric and biophysical