

```
> emmeans(model, pairwise ~ Condition, adjust = "Bonferroni")
```

```
$emmeans
```

Condition	emmean	SE	df	lower.CL	upper.CL
Very.Easy	83.50000	0.8861571	122.33	81.74581	85.25419
Easy	81.62500	0.8861571	122.33	79.87081	83.37919
Hard	72.37500	0.8861571	122.33	70.62081	74.12919
Very.Hard	53.96875	0.8861571	122.33	52.21456	55.72294

```
Confidence level used: 0.95
```

```
$contrasts
```

contrast	estimate	SE	df	t.ratio	p.value
Very.Easy - Easy	1.87500	1.210249	93	1.549	0.7483
Very.Easy - Hard	11.12500	1.210249	93	9.192	<.0001
Very.Easy - Very.Hard	29.53125	1.210249	93	24.401	<.0001
Easy - Hard	9.25000	1.210249	93	7.643	<.0001
Easy - Very.Hard	27.65625	1.210249	93	22.852	<.0001
Hard - Very.Hard	18.40625	1.210249	93	15.209	<.0001

```
P value adjustment: bonferroni method for 6 tests
```

- We see each level differs from each other, apart from Very Easy vs. Easy (where $p = .75$).

These two are equivalent, while other pairwise differences are significant.

