

2024 年春季学期实变函数期中考试（朱政老师）

赤木量子整理

2024 年春

- 一. (20 分) 回顾以下外测度 m^* 的定义, 并证明一个外测度大于 0 的集合必然有一个外测度大于 0 的有界子集.

答: (1) 定义:

$$m^*(A) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \ell(I_k) : A \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \right\}$$

(2) 不妨设 $E \subset [a, b], m^*(E) > c > 0$, 记 $f(x) = m^*([a, x] \cap E), a \leq x \leq b$.

考虑 $a \leq x < x + \Delta x \leq b$, 则

$$[a, x + \Delta x] \cap E = ([a, x] \cup E) \cap ([x, x + \Delta x] \cap E)$$

可知 $f(x + \Delta x) \leq f(x) + \Delta x$. $f \in C[a, b]$ 是明显的. 根据中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = c$. 取 $[a, \xi] \cap E$ 即可.

或者直接令 $E_n = E \cap [n-1, n], n \geq 1, E_n$ 有界, $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 反证即出.

- 二. (20 分) 证明存在一个单位闭区间 $[0, 1]$ 上的连续且严格单增函数把一个测度为正的 measurable 集打到一个零测集; 若 f 为定义在某个 measurable 集 E 上的连续函数, 是否对于任意 measurable 集 A 有 $f^{-1}(A)$ 必为 E 的 measurable 子集?

答: (1) 记 Cantor-Lebesgue 函数 $\psi(x)$, Cantor 集 C , 令 $f(x) = \frac{\psi(x)}{2}$, 则 f 将 $[0, 1]$ 映射为 $[0, 1]$, 令 $A = [0, 1] - C$, 则 $f(A), f(C)$ 无交且 $m^*(f(A)) = \frac{1}{2}$. 由 $[0, 1] = f(A) \cup f(C)$, 则 $m^*(f(C)) = \frac{1}{2}$.

f^{-1} 是一个 $[0, 1]$ 上连续且严格单增函数, 且把一个测度为正的 measurable 集 $f(C)$ 映射为零测集 C .

(2) 不一定. 如 $\psi(x)$ 将 C 的一个子集映射到一个不可测集, 则 $\psi^{-1}(x)$ 将一个不可测集映射为一个 measurable 子集.

- 三. (20 分) 若 f 为一个定义在 measurable 集 E 上的非负 measurable 函数, 证明:

$$\int_E f := \sup \int_E \phi$$

上述 *supremum* 对所有定义在 E 上支集测度有限非负不大于 f 的简单函数取.

答: 由简单函数逼近定理, 存在 E 上一列递增简单函数列 $\{\phi_n\}$ 点态收敛于 f . 将上述 $\{\phi_n\}$ 用 $\max\{0, \phi_n\}$ 代替, 则简单函数在 E 上非负、支集有限且点态收敛于 f .

记 $A = \{\phi : 0 \leq \phi \leq f \text{ on } E\}$, 其中 ϕ 简单, 有限支集. 设 $\phi \in A$, 知 $\int_E f \geq \int_E \phi$. 从而 $\int_E f \geq \sup\{\int_E \phi : \phi \in A\}$. 而在前面已经构造了一列递增简单函数列, 再由单调收敛定理, 知 $\int_E f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \phi_n$. 从而 $\forall \epsilon > 0, \exists n \in \mathbf{N}, s.t.$

$$\int_E f \leq \int_E \phi_n + \epsilon \leq \sup\left\{\int_E \phi : \phi \in A\right\} + \epsilon$$

从而 $\int_E f \leq \sup\{\int_E \phi : \phi \in A\}$. 从而等式成立.

四. (20 分) f 为一个定义在可测集 E 上的可积函数, 对于任意 $n \in \mathbf{N}$, 定义 $E_n := E \setminus (-n, n)$. 证明对于任意 $\epsilon > 0$, 存在一个自然数 N , 使得对于任意 $n \geq N$, 都有

$$\left|\int_{E_n} f\right| < \epsilon$$

答: $\{E_n\}$ 是一个单调递减可数个 E 的可测子集族且 $m(\cap_{n=1}^{\infty} E_n) = m(\emptyset) = 0$,

$$0 = \int_{\cap_{n=1}^{\infty} E_n} f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} f$$

化为极限的定义形式即可.

五. (20 分) 若 f 为一个定义在可测集 E 上的可测函数, 若 f 在可测子集 $E' \subset E$ 上有界, 证明存在一列定义在 E 上的单调下降的简单函数 $\{\phi_n\}$ 在 E' 上从上一致收敛到 f (即 ϕ_n 在 E' 上一致收敛于 f 且对任意 $n \in \mathbf{N}$, 在 E 上有 $\phi_n \geq \phi_{n+1}$ 且对于任意 $n \in \mathbf{N}, \phi_n \geq f$ 在 E' 上成立).

答: f 在 E' 上有界可测, 从而由简单函数逼近引理, 存在一列简单函数 $\{\phi_n\}$ 在 E' 满足 $f \leq \phi_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n = f$.

将 ϕ_n 用 $\max\{\phi_1, \phi_2, \dots\}$ 代替后即证.