


# Termodynamika z elementami fizyki statystycznej

Ćwiczenia 1 (1 marca 2021)

## Dochodzenie do równowagi termicznej, rozszerzalność cieplna

### Zadanie 1

Metalowy blok o temperaturze początkowej  $T_1$  umieszczony został w otoczeniu, którego temperatura przełączana jest regularnie pomiędzy dwiema ustalonymi wartościami:  $T_1$  i  $T_2$  ( $T_1 > T_2$ ). Jak zmienia się temperatura bloku w funkcji czasu? Znajdź maksymalną i minimalną temperaturę bloku w stanie ustalonym (tzn. po bardzo dużej liczbie przełączeń) i przedyskutuj jako funkcję okresu  $b$ .



### Rozwiązanie:

Stosujemy równanie Newtona

$$\frac{dT}{dt} = -\alpha(T - T_{\text{ot}}). \quad (1)$$

W przypadku gdy  $T_{\text{ot}}$  jest stałe dostajemy

$$T(t) = Ae^{-\alpha t} + T_{\text{ot}}, \quad (2)$$

gdzie  $A$  jest stałą którą możemy określić na podstawie warunku początkowego:  $A = T(0) - T_{\text{ot}}$ . Ostatecznie

$$T(t) = (T(0) - T_{\text{ot}})e^{-\alpha t} + T_{\text{ot}}. \quad (3)$$

Zastosujemy teraz to rozwiązanie dla  $T_{\text{ot}}$  przełączanej pomiędzy wartościami  $T_1$  i  $T_2$  zgodnie z wykresem. Załóżmy, że w danej chwili  $t$  otoczenie jest w temperaturze  $T_2$ . To znaczy, że  $Nb \leq t \leq Nb + b/2$  dla liczby naturalnej  $N$ . Dodatkowo oznaczmy przez  $t' = t - Nb$  czas od ostatniego przełączenia. Zgodnie z wzorem (3) dostajemy

$$T(t') = (T_{Nb} - T_2)e^{-\alpha t'} + T_2, \quad (4)$$

gdzie  $T_{Nb}$  jest temperaturą w chwili  $Nb$ , czyli na początku podcyklu. Na koniec tego podcyklu  $t' = b/2$  i temperatura wynosi

$$T_{Nb+b/2} = (T_{Nb} - T_2)e^{-\alpha b/2} + T_2. \quad (5)$$

W tym momencie temperatura otoczenia przełącza się na  $T_1$ . Oznaczmy przez  $t'' = t - (Nb + b/2)$  czas od momentu przełączenia. Ponownie, zgodnie z (3), otrzymujemy

$$T(t'') = (T_{Nb+b/2} - T_1)e^{-\alpha t''} + T_1, \quad (6)$$

więc na koniec tego podcyklu temperatura wynosi

$$T_{Nb+b} = (T_{Nb+b/2} - T_1)e^{-\alpha b/2} + T_1. \quad (7)$$

Możemy wstawić do tego wzoru  $T_{Nb+b/2}$  by otrzymać temperaturę po pełnym cyklu zależną od temperatury na początku tego cyklu. Dostajemy

$$T_{Nb+b} = \left( (T_{Nb} - T_2)e^{-\alpha b/2} + T_2 - T_1 \right) e^{-\alpha b/2} + T_1. \quad (8)$$

Pytanie o termalizację: jak informacja o warunkach początkowych ginie w tej sytuacji?

Rozważmy teraz stan ustalony, czyli po dużej liczbie przełączeń. Spodziewamy się, że po dużej liczbie przełączeń, układ po odbyciu pełnego cyklu wraca do temperatury na początku cyklu, czyli

$$T_{(N+1)b} = T_{Nb}. \quad (9)$$

Dostajemy równanie

$$T_{Nb} = \left( (T_{Nb} - T_2)e^{-\alpha b/2} + T_2 - T_1 \right) e^{-\alpha b/2} + T_1. \quad (10)$$

Grupując wyrazy z  $T_{Nb}$ ,  $T_1$  i  $T_2$  dostajemy

$$T_{Nb}(1 - e^{-\alpha b}) = T_2 e^{-\alpha b/2}(1 - e^{-\alpha b/2}) + T_1(1 - e^{-\alpha b/2}) \quad (11)$$

i ostatecznie

$$T_{Nb} = \frac{T_1 + T_2 e^{-\alpha b/2}}{1 + e^{-\alpha b/2}}. \quad (12)$$

Możemy też łatwo wyznaczyć temperaturę w stanie ustalonym w połowie cyklu. Wstawiając właśnie wyznaczone  $T_{Nb}$  do wzoru na  $T_{Nb+b/2}$  dostajemy

$$T_{Nb+b/2} = \frac{T_2 + T_1 e^{-\alpha b/2}}{1 + e^{-\alpha b/2}}. \quad (13)$$

Dostajemy więc, że w stanie ustalonym temperatura zmienia się pomiędzy  $T_{\min} = T_{Nb+b/2}$  a  $T_{\max} = T_{Nb}$ . Zbadajmy na koniec jak te dwie temperatury zależą od  $\alpha$  i  $b$ . Mamy dwie sytuacje. Gdy  $\alpha b \ll 1$  wtedy  $T_{\min} = T_{\max} = (T_1 + T_2)/2$ . Natomiast gdy  $\alpha b \gg 1$  to  $T_{\min} = T_2$  a  $T_{\max} = T_1$ .

Zadanie to możemy też rozwiązać wyznaczając  $T_{Nb}$  jako funkcję warunku początkowego. W tym celu policzmy  $T_b$ ,  $T_{2b}$  i tak dalej z (??). Dostajemy

$$T_b = ((T_1 - T_2)e^{-\alpha b/2} + T_2 - T_1)e^{-\alpha b/2} + T_1 = (T_1 - T_2)(1 - e^{-\alpha b/2} + e^{-\alpha b}) + T_2, \quad (14)$$

$$T_{2b} = ((T_1 - T_2)(1 - e^{-\alpha b/2} + e^{-\alpha b})e^{-\alpha b/2} + T_2 - T_1)e^{-\alpha b/2} + T_2 \quad (15)$$

$$= (T_1 - T_2)(1 - e^{-\alpha b/2} + e^{-\alpha b} - e^{-3\alpha b/2} + e^{-2\alpha b}) + T_2. \quad (16)$$

Zgadujemy, że  $T_{Nb}$  przyjmuje postać

$$T_{Nb} = T_2 + (T_1 - T_2) \sum_{j=0}^N q^j, \quad (17)$$

gdzie  $q = -e^{-\alpha b/2}$ . Mamy więc szereg geometryczny który prowadzi do

$$T_{Nb} = T_2 + (T_1 - T_2) \frac{1 - q^N}{1 - q} = T_2 + (T_1 - T_2) \frac{1 + e^{-N\alpha b/2}}{1 + e^{-\alpha b/2}}. \quad (18)$$

W granicy dużej liczby przełączeń  $N$  jest duże więc możemy zaniedbać ostatni wyraz. Po uporządkowaniu, dostajemy

$$T_{Nb} = \frac{T_1 + T_2 e^{-\alpha b/2}}{1 + e^{-\alpha b/2}}. \quad (19)$$

czyli ten sam wynik co poprzednio.

## Zadanie 2

Blok metalowy umieszczony jest w otoczeniu, którego temperatura zmienia się według wzoru:

$$T_{ot}(t) = T_o + A \cos(\omega t).$$

Początkowa temperatura bloku wynosi  $T_o$ . Znajdź zależność temperatury bloku od czasu w stanie ustalonym.

**Rozwiązanie:** Ponownie korzystamy z równania Newtona

$$\frac{dT(t)}{dt} = -\alpha(T(t) - T_{ot}(t)). \quad (20)$$

Tym razem, temperatura otoczenia zmienia się w czasie. Postulujemy rozwiązanie w postaci

$$T(t) = Ce^{-\alpha t} + K \sin(\omega t) + L \cos(\omega t) + T_0. \quad (21)$$

Wstawiając do równania i porównując wyrazy przy  $\sin(\omega t)$  i  $\cos(\omega t)$  dostajemy dwa równania

$$\alpha(L - A) = -\omega K \quad (22)$$

$$\alpha K = \omega L. \quad (23)$$

Rozwiązując, znajdujemy

$$L = \frac{\alpha^2 A}{\omega^2 + \alpha^2}, \quad K = \frac{\alpha \omega}{\omega^2 + \alpha^2} A. \quad (24)$$

Ostatnią stałą  $C$  znajdujemy z warunku początkowego

$$T_0 = T(0) = C + T_0 + L, \quad (25)$$

z czego wynika, że  $C = -L$ .

Dla dużych czasów wyraz eksponencjalny możemy zaniedbać więc

$$T(t) = T_0 + \frac{\alpha A}{\omega^2 + \alpha^2} (\omega \sin(\omega t) + \alpha \cos(\omega t)). \quad (26)$$

Zbadajmy teraz co się dzieje w zależności od  $\omega$  i  $\alpha$ . Gdy  $\omega \ll \alpha$  wtedy  $T(t) = T_0 + A \cos(\omega t)$ . Natomiast gdy  $\omega \gg \alpha$  wtedy  $T(t) = T_0$ .

Rozwiązanie możemy też przedstawić w następującej postaci

$$T(t) = T_0 + \frac{\alpha A}{\sqrt{\omega^2 + \alpha^2}} (\cos \phi \sin(\omega t) + \sin \phi \cos(\omega t)) = T_0 + \frac{\alpha A}{\sqrt{\omega^2 + \alpha^2}} \sin(\omega t + \phi), \quad (27)$$

gdzie zdefiniowaliśmy

$$\tan \phi = \frac{\alpha}{\omega}. \quad (28)$$

### Zadanie 3


Energia potencjalna oddziaływania dwóch atomów danej substancji jest przedstawiona na rysunku obok. Znaleźć średnią odległość między atomami odpowiadającą energii  $E > E_0$ , zakładając, że:

1. w pobliżu punktu równowagi  $x = x_0$  energia potencjalna daje się przybliżyć wzorem

$$E_p(x) \approx a(x - x_0)^2 - b(x - x_0)^3 + E_0,$$

gdzie  $a$  i  $b$  są stałymi dodatnimi,

2. anharmoniczna poprawka trzeciego rzędu jest mała, tzn.  $b|x - x_0| \ll a$ ,
3. punkty zwrotne  $x_{\min}$  i  $x_{\max}$  drgań bardzo niewiele różnią się od punktów zwrotnych oscylatora harmonicznego  $x_{\min}^h$  i  $x_{\max}^h$  (dla  $b = 0$ ),
4. średnia odległość międzyatomowa w czasie drgań może być przybliżona przez średnią arytmetyczną  $\langle x \rangle \approx \frac{x_{\min} + x_{\max}}{2}$ .



### Rozwiązanie:

Energia całkowita dwóch atomów składa się z sumy energii potencjalnej i kinetycznej. W punkcie zwrotu energia kinetyczna wynosi zero, więc energia potencjalna jest równa całkowitej energii  $E$ . Oznaczmy przez  $\Delta E = E - E_0$  względną energię układu względem dna studni potencjału. Załóżmy na początek, że potencjał jest harmoniczny. Wtedy

$$E(x_{\min/\max}) = a(x_{\min/\max}^h - x_0)^2 + E_0, \quad (29)$$

lub

$$\Delta E = a(x_{\min/\max}^h - x_0)^2. \quad (30)$$

Rozwiązując dla  $x_{\min/\max}^h$  dostajemy

$$x_{\min/\max}^h = x_0 \mp \sqrt{\frac{\Delta E}{a}}, \quad (31)$$

i dla średniej odległości międzyatomowej dostajemy  $\langle x \rangle = x_0$ , czyli odległość nie zależy od energii układu! Zobaczmy co się stanie jak dodamy anharmoniczne poprawki.

Oznaczmy nowe punktu zwrotu przez  $x_{\min/\max}$  i załóżmy, że

$$x_{\min/\max} = x_{\min/\max}^h + \epsilon_{\min/\max}, \quad (32)$$

z  $\epsilon_{\min/\max}$  małym. Dostajemy

$$\Delta E = a(x_{\min/\max}^h - x_0 + \epsilon_{\min/\max})^2 - b(x_{\min/\max}^h - x_0 + \epsilon_{\min/\max})^3. \quad (33)$$

Skorzystamy, teraz z faktu, że  $\epsilon$  jest małą wielkością.

$$(x + \epsilon)^2 = x^2 + 2x\epsilon + \epsilon^2 = x^2 + 2x\epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2), \quad (34)$$

$$(x + \epsilon)^3 = x^3 + 3x^2\epsilon + 3x\epsilon^2 + \epsilon^3 = x^3 + 3x^2\epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2). \quad (35)$$

Z dokładnością  $\epsilon_{\min/\max}^2$  dostajemy

$$0 = \mp 2\sqrt{a\Delta E}\epsilon_{\min/\max} \pm b\left(\frac{\Delta E}{a}\right)^{3/2} - 3b\sqrt{\frac{\Delta E}{a}}\epsilon_{\min/\max}. \quad (36)$$

Co prowadzi do

$$\epsilon_{\min/\max} = \frac{b\frac{\Delta E}{a}}{2a \pm 3b\sqrt{\frac{\Delta E}{a}}}. \quad (37)$$

Wzór ten możemy wciąż trochę uprościć zauważając że,  $a \gg b|x - x_0| = b\sqrt{\Delta E/a}$ . Prowadzi to ostatecznie do

$$\epsilon_{\min/\max} = \frac{b\Delta E}{2a^2}, \quad (38)$$

natomiast średnia odległość międzyatomowa wynosi

$$\langle x \rangle = x_0 + \frac{b\Delta E}{2a^2}. \quad (39)$$

Widzimy, że dzięki anharmoniczności potencjału ( $b \neq 0$ ) średnia odległość między atomami rośnie wraz z ich energią. Ponieważ energia wewnętrzna substancji rośnie wraz z temperaturą, możemy wywnioskować że wraz ze wzrostem temperatury ciała będą się rozszerzać. Jest to zjawisko *rozszerzalności cieplnej*.

#### **Zadanie 4**

Wykazać, że dla materiału anizotropowego zachodzi związek:  $\gamma = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ , gdzie  $\gamma$  jest współczynnikiem rozszerzalności objętościowej danego materiału, zaś  $\alpha_i$  ( $i = 1, 2, 3$ ) są współczynnikami rozszerzalności liniowej wzdłuż 3 nierównoważnych (i wzajemnie prostopadłych) kierunków tego materiału.

**Rozwiązanie:** Współczynnik rozszerzalności objętościowej definiujemy zmianę objętości materiału pod wpływem zmiany temperatury podzieloną przez początkową objętość, to znaczy

$$\gamma = \frac{1}{V} \frac{dV}{dT}. \quad (40)$$

W analogiczny sposób możemy zdefiniować współczynniki rozszerzalności liniowej

$$\alpha_i = \frac{1}{L_i} \frac{dL_i}{dT}. \quad (41)$$

Korzystając ze związku  $V = L_1 L_2 L_3$  dostajemy

$$\gamma = \frac{1}{V} \frac{dV}{dT} = \frac{1}{V} \left( L_1 L_2 \frac{dL_3}{dT} + L_3 L_1 \frac{dL_2}{dT} + L_2 L_3 \frac{dL_1}{dT} \right) = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3. \quad (42)$$

Alternatywnie, współczynniki rozszerzalności mogą być zdefiniowane jako

$$\gamma = \frac{1}{V_0} \frac{dV}{dT}, \quad \alpha_i = \frac{1}{L_{i,0}} \frac{dL_i}{dT}, \quad (43)$$

gdzie  $V_0$  i  $L_{i,0}$  są wzorcowymi wymiarami. Wtedy

$$V \approx V_0 + \gamma V_0 \Delta T, \quad (44)$$

oraz

$$L_i \approx L_{i,0} + \alpha_i L_{i,0} \Delta T. \quad (45)$$

Nowa objętość wynosi więc

$$\begin{aligned} V = L_1 L_2 L_3 &= L_{1,0} L_{2,0} L_{3,0} + (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) L_{1,0} L_{2,0} L_{3,0} \Delta T + A \cdot (\Delta T)^2 + B \cdot (\Delta T)^3 \\ &\approx V_0 + (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) V_0 \Delta T. \end{aligned} \quad (46)$$

Porównując ze wzorem (??) dostajemy ponownie, że  $\gamma = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ .

### Zadanie 5

Odległość między słupami elektrycznymi wynosi 50 m. O ile zmienia swoją długość zawieszony między nimi cienki drut miedziany, jeżeli temperatura zmienia się od  $-25^\circ\text{C}$  do  $+35^\circ\text{C}$ ? Współczynniki rozszerzalności liniowej miedzi wynosi  $\alpha = 8.9 \cdot 10^{-6} \text{K}^{-1}$ . Oszacuj zmianę zwisania drutu.

W przybliżeniu liniowym, długość drutu w temperaturze  $T$  zmieni się o

$$\Delta L = L_0 \gamma \Delta T, \quad (47)$$

gdzie  $L_0$  jest długością kabla w początkowej temperaturze a  $\Delta T$  jest różnicą temperatur. Podstawiając dane z treści zadania, dostajemy

$$\Delta L = 50 \times 60 \times 8.9 \times 10^{-6} \text{ m} = 0.026 \text{ cm}. \quad (48)$$

O tyle wydłuży się drut. O ile głębiej będzie zwiślał? Możemy to oszacować, zakładając, że początkowo drut jest napięty, a po zmianie temperatury tworzy trójkąt. Z twierdzenie Pitagorasa mamy

$$\frac{L_0^2}{4} + x^2 = \frac{(L_0 + \Delta L)^2}{4} \approx \frac{L_0^2}{4} + \frac{L_0 \Delta L}{2}, \quad (49)$$

z czego wynika, że

$$x = \sqrt{\frac{L_0 \Delta L}{2}} \approx 0.82 \text{ m} \quad (50)$$

### Zadanie 6

Termometr rtęciowy składa się ze szklanego, kulistego zbiorniczka z rtęcią połączonego ze szklaną kapilarą. W temperaturze  $T_0 = 0^\circ\text{C}$  pole przekroju poprzecznego kapilary wynosi  $A_0$ , a zbiorniczek ma objętość  $V_0$  i jest całkowicie wypełniony rtęcią. Współczynnik rozszerzalności objętościowej rtęci wynosi  $\beta$ , a współczynnik rozszerzalności liniowej szkła wynosi  $\alpha$ . Jaka będzie długość słupa rtęci w kapilarze w temperaturze  $T$ ? Przedyskutuj wynik.

**Rozwiązanie:** Oznaczmy przez  $\Delta T = T - T_0$  różnicę temperatur. Przyjmijmy, że szklana bańka rozszerza się tak jak szklana kula. Wtedy objętość rtęci i szklanej bańki w nowej temperaturze wynoszą

$$V_r = V_0(1 + \beta\Delta T), \quad V_s = V_0(1 + 3\alpha\Delta T). \quad (51)$$

Oczekujemy, że rtęć rozszerzy się bardziej niż szklana bańka, to znaczy  $\beta > 3\alpha$  i rtęć nie mieści się już wewnątrz bańki. Dodatkowo objętość  $\Delta V = V_r - V_s$  musi wypełnić kapilarę. Dodatkowa objętość wynosi

$$\Delta V = V_0(\beta - 3\alpha)\Delta T. \quad (52)$$

W kapilarze o przekroju  $A_0$ , objętość  $\Delta V$  zajmując wysokość  $h$  daną przez

$$h = \frac{\Delta V}{A_0} = \frac{V_0}{A_0}(\beta - 3\alpha)\Delta T. \quad (53)$$

Zaniedbaliśmy tu zmianę przekroju kapilary przy zmianie temperatury. Dodatkowo, założyliśmy, że szklana bańka rozszerza się tak jak szklana kula. Jak to możemy uzasadnić? Rozważymy dwa model tego co dzieje się z bańką pod wpływem wzrostu temperatury.

- Przyjmijmy najpierw, że w wyniku wzrostu temperatury zwiększa się powierzchnia bańki z  $S_0$  do  $S_1$

$$S_1 = S_0(1 + 2\alpha\Delta T). \quad (54)$$

Jaki wpływ będzie miał ten wzrost powierzchni na objętość? Zakładając, że bańka wciąż pozostaje sferą to możemy początkową i końcową powierzchnie wyrazić za pomocą promienia

$$S_0 = 4\pi r_0^2, \quad S_1 = 4\pi r_1^2. \quad (55)$$

W związku z tym, stosunek objętości wynosi

$$\frac{V_1}{V_0} = \left(\frac{r_1}{r_0}\right)^3 = \left(\frac{S_1}{S_0}\right)^{3/2} = (1 + 2\alpha\Delta T)^{3/2} \approx (1 + 3\alpha\Delta T). \quad (56)$$

- W drugim modelu, przyjmijmy że dodatkowo zmienia się grubość szklanej bańki. Oznaczmy początkową grubość przez  $d_0$  a końcową przez  $d_1$ . Wtedy

$$d_1 = d_0(1 + \alpha\Delta T). \quad (57)$$

Początkowo naskórek zajmuje objętość  $S_0 d_0$ . Po podgrzaniu jego objętość wynosi

$$V_1^{\text{naskórek}} = S_0 d_0(1 + \alpha\Delta T)(1 + 2\alpha\Delta T) \approx 4\pi r_0^2 d_0(1 + 3\alpha\Delta T + \dots). \quad (58)$$

Nowa objętość bańki wynosi więc

$$V_1 = \frac{4}{3}\pi(r_0 + d_0)^3(1 + 3\alpha\Delta T). \quad (59)$$

Natomiast objętość wnętrza to

$$V_1^{\text{wnętrze}} = V_1 - V_1^{\text{naskórek}} = \frac{4}{3}\pi(r_0^3 + 3r_0^2 d_0 + \dots)(1 + 3\alpha\Delta T) - 4\pi r_0^2 d_0(1 + 3\alpha\Delta T) \quad (60)$$

$$= \frac{4}{3}\pi r_0^3(1 + 3\alpha\Delta T) + \mathcal{O}(d_0^2). \quad (61)$$

## Zadania domowe

### Zadanie domowe 1

Blok metalowy znajduje się w otoczeniu którego temperatura zmienia się w czasie zgodnie z wzorem:

$$T_1 = T_0 + A \exp(-\beta t),$$

gdzie stałe  $A, \beta > 0$ . Temperatura początkowa bloku wynosi  $T_0$ . Znaleźć zależność temperatury bloku od czasu i przedyskutować ją jako funkcję  $\beta$ . Po jakim czasie blok osiągnie maksymalną temperaturę?

### ***Zadanie domowe 2***

Blok metalowy o temperaturze początkowej  $T_0$  umieszczono na czas  $t_1$  w otoczeniu, którego temperatura wynosi  $T_0 - \Delta T$ . Na jaki czas  $t_2$  należy umieścić następnie blok w otoczeniu o temperaturze  $T_0 + \Delta T$ , aby znów osiągnął temperaturę  $T_0$ ? Czy wynik zależy od  $\Delta T$ ? Zbadaj wynik w granicach  $t_1 \rightarrow 0$  i  $t_1 \rightarrow \infty$ . Który z czasów jest krótszy:  $t_1$  czy  $t_2$ ?

### ***Zadanie domowe 3***

W lodówce, w temperaturze  $0^\circ\text{C}$  przechowywana jest butelka coli. Zmierzono, że w godzinę po wyjęciu jej z lodówki i pozostawieniu w otoczeniu o temperaturze  $20^\circ\text{C}$  temperatura płynu osiąga  $14^\circ\text{C}$ .

- Ile wynosi czas relaksacji temperatury w tej sytuacji?
- Na ile minut przed otwarciem butelki należy wyjąć colę z lodówki, jeżeli chcemy aby miała ona optymalną do picia temperaturę  $4^\circ\text{C}$ ?

### ***Zadanie domowe 4***

Punktowa masa  $m$  drga w jednym wymiarze w polu sił zachowawczych z energią potencjalną  $E_p(x) = D \left( e^{-a(x-x_0)} - 1 \right)^2$ . Jest to tzw. potencjał Morse'a, oddający podstawowe własności potencjałów cząsteczkowych. Zbadaj jak punkty zwrotne takiego oscylatora zależą od energii całkowitej, która nieznacznie przekracza minimalną energię potencjalną. W tym celu rozwiń funkcję  $E_p(x)$  w szereg Taylora wokół minimum, a następnie zachowaj tylko pierwszy nieznikający człon anharmoniczny. Ponadto załóż, że punkty zwrotne niewiele różnią się od rozwiązania dla oscylatora harmonicznego.

### ***Zadanie domowe 5***

Jakie długości w temperaturze  $T_1 = 0^\circ\text{C}$  powinny mieć dwa pręty: stalowy i miedziany, aby w dowolnej temperaturze pręt stalowy był dłuższy od pręta miedzianego o  $d = 5\text{ cm}$ ? Współczynnik rozszerzalności liniowej dla stali wynosi  $\alpha_{\text{stali}} = 1.2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ , a dla miedzi  $\alpha_{\text{miedzi}} = 1.6 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ . Założyć, że współczynniki te nie zależą od temperatury.