Szintaxis:

$$\begin{array}{ll} A,A',A_1,... \in \mathsf{Ty} & ::= \mathsf{Nat} \, | \, \mathsf{Empty} \, | \, A_1 + A_2 \\ t,t',t_1,... & \in \mathsf{Tm} & ::= x \, | \, \mathsf{zero} \, | \, \mathsf{suc} \, t \, | \, \mathsf{rec} \, t_0 \, x.t_1 \, t \, | \, \mathsf{abort}^A \, t \, | \, \mathsf{inj_1}^{A_1,A_2} \, t \, | \, \mathsf{inj_2}^{A_1,A_2} \, t \, | \, \mathsf{case} \, t \, x_1.t_1 \, x_2.t_2 \\ \Gamma,\Gamma',... & \in \mathsf{Con} \, ::= \cdot \, | \, \Gamma,x : A \end{array}$$

Környezetek kezelésére vonatkozó szabályok:

$$\begin{aligned} &dom(\cdot) := \{\} \\ &dom(\Gamma, x : A) := \{x\} \cup dom(\Gamma) \end{aligned}$$

$$\overline{\cdot \mathsf{wf}}$$
 (1)

$$\frac{\Gamma \operatorname{wf} \qquad x \not\in dom(\Gamma)}{\Gamma, x: A \operatorname{wf}} \tag{2}$$

$$\frac{\Gamma \operatorname{wf} \qquad x \not\in dom(\Gamma)}{(x:A) \in \Gamma, x:A} \tag{3}$$

$$\frac{(x:A) \in \Gamma \qquad y \notin dom(\Gamma)}{(x:A) \in \Gamma, y:A'} \tag{4}$$

Termek típusozási szabályai:

$$\frac{(x:A) \in \Gamma}{\Gamma \vdash x:A} \tag{5}$$

$$\frac{\Gamma \, \mathrm{wf}}{\Gamma \vdash \mathsf{zero} : \mathsf{Nat}} \tag{6}$$

$$\frac{\Gamma \vdash t : \mathsf{Nat}}{\Gamma \vdash \mathsf{suc}\, t : \mathsf{Nat}} \tag{7}$$

$$\frac{\Gamma \vdash t_0 : A \qquad \Gamma, x : A \vdash t_1 : A \qquad \Gamma \vdash t : \mathsf{Nat}}{\Gamma \vdash \mathsf{rec}\, t_0 \, x. t_1 \, t : A} \tag{8}$$

$$\frac{\Gamma \vdash t : \mathsf{Empty}}{\Gamma \vdash \mathsf{abort}^A \, t : A} \tag{9}$$

$$\frac{\Gamma \vdash t_1 : A_1}{\Gamma \vdash \mathsf{inj}_1^{A_1, A_2} t_1 : A_1 + A_2} \tag{10}$$

$$\frac{\Gamma \vdash t_2 : A_2}{\Gamma \vdash \mathsf{inj}_2^{\ A_1, A_2} \ t_2 : A_1 + A_2} \tag{11}$$

$$\frac{\Gamma \vdash t : A_1 + A_2 \qquad \Gamma, x_1 : A_1 \vdash t_1 : A \qquad \Gamma, x_2 : A_2 \vdash t_2 : A}{\Gamma \vdash \mathsf{case}\, t\, x_1.t_1\, x_2.t_2 : A} \tag{12}$$

Operációs szemantika:

$$\frac{t \, \mathsf{val}}{\mathsf{suc} \, t \, \mathsf{val}} \tag{14}$$

$$\frac{t \longmapsto t'}{\operatorname{suc} t \longmapsto \operatorname{suc} t'} \tag{15}$$

$$\frac{t \longmapsto t'}{\operatorname{rec} t_0 \, x. t_1 \, t \longmapsto \operatorname{rec} t_0 \, x. t_1 \, t'} \tag{16}$$

$$\overline{\operatorname{rec} t_0 x. t_1 \operatorname{zero} \longmapsto t_0} \tag{17}$$

$$\frac{t \operatorname{val}}{\operatorname{rec} t_0 x. t_1 \left(\operatorname{suc} t\right) \longmapsto t_1 [x \mapsto \operatorname{rec} t_0 x. t_1 t]} \tag{18}$$

$$\frac{t\,\mathrm{val}}{\mathsf{inj}_1^{\,A_1,A_2}\,t\,\mathsf{val}} \tag{19}$$

$$\frac{t\,\mathrm{val}}{\mathsf{inj}_2{}^{A_1,A_2}\,t\,\mathsf{val}}\tag{20}$$

$$\frac{t \longmapsto t'}{\mathsf{abort}^A t \longmapsto \mathsf{abort}^A t'} \tag{21}$$

$$\frac{t \longmapsto t'}{\operatorname{inj}_1 t \longmapsto \operatorname{inj}_1 t'} \tag{22}$$

$$\frac{t \longmapsto t'}{\operatorname{inj}_2 t \longmapsto \operatorname{inj}_2 t'} \tag{23}$$

$$\frac{t \longmapsto t'}{\operatorname{case} t \, x_1 \cdot t_1 \, x_2 \cdot t_2 \longmapsto \operatorname{case} t' \, x_1 \cdot t_1 \, x_2 \cdot t_2} \tag{24}$$

$$\frac{t \operatorname{val}}{\operatorname{case}\left(\operatorname{inj}_{1}^{A_{1},A_{2}}t\right) x_{1}.t_{1} x_{2}.t_{2} \longmapsto t_{1}[x_{1} \mapsto t]} \tag{25}$$

$$\frac{t \operatorname{val}}{\operatorname{case}\left(\operatorname{inj}_{2}^{A_{1},A_{2}}t\right) x_{1}.t_{1} x_{2}.t_{2} \longmapsto t_{2}[x_{2} \mapsto t]} \tag{26}$$

Kiértékelés nulla vagy több lépésben:

$$\overline{t \longmapsto^* t}$$
 (27)

$$\frac{t \longmapsto t' \qquad t' \longmapsto^* t''}{t \longmapsto^* t''} \tag{28}$$

Tételek:

- 1. Unicitás: ha $\Gamma \vdash t : A$ és $\Gamma \vdash t : A'$, akkor A = A'.
- 2. Környezet permutálhatósága: ha $\Gamma \vdash t : A$ és Γ' a Γ egy permutációja, akkor $\Gamma' \vdash t : A$.
- 3. Gyengítés: ha $\Gamma \vdash t : A$ és $x \not\in dom(\Gamma)$, akkor $\Gamma, x : A' \vdash t : A$.
- 4. Helyettesítési lemma: ha $\Gamma \vdash t : A$ és $\Gamma, x : A \vdash t' : A'$, akkor $\Gamma \vdash t'[x \mapsto t] : A'$.
- 5. Dekompozíció: ha $\Gamma \vdash t'[x \mapsto t] : A'$, akkor minden olyan A-ra, melyre $\Gamma \vdash t : A, \Gamma, x : A \vdash t' : A'$.
- 6. Nincs olyan t, hogy t val és $t \mapsto t'$
- 7. Determinisztikusság: Ha $t \mapsto t'$ és $t \mapsto t''$, akkor t' = t''.
- 8. Haladás: ha $\cdot \vdash t : A$, akkor vagy t val, vagy létezik olyan t', hogy $t \longmapsto t'$.
- 9. Típusmegőrzés: ha $\cdot \vdash t : A$ és $t \longmapsto t'$, akkor $\cdot \vdash t' : A$.