ELEVIFY

BONO

SPLIT Y APERTURAS: PROGRAMA DE 8 SEMANAS

Semana a semana: isquiotibiales, psoas y aductores para el split frontal y lateral sin lesionarte




30 PÁGINAS · 8 SEMANAS · SPLIT FRONTAL · SPLIT LATERAL · TEST Y REGISTRO

ISQUIOTIBIALES · PSOAS · ADUCTORES · PELVIS

SPLIT Y APERTURAS

Programa de 8 semanas para ganar flexibilidad
de forma segura y medible.




QUÉ VAS A ENCONTRAR

Un **programa progresivo semana a semana** diseñado para avanzar de forma segura hacia tus objetivos de flexibilidad.

La **anatomía** detrás de cada movimiento para que entiendas exactamente qué músculos, tendones y articulaciones estás estirando y cómo funcionan.

Herramientas prácticas y métodos para medir tu progreso de forma objetiva y respetar los límites naturales de tu cuerpo, evitando lesiones.

SPLIT FRONTAL: LOS TRES FRENOS



EQUILIBRIO DE FUERZAS

El split frontal no es un estiramiento de un solo músculo, sino un equilibrio entre dos cadenas opuestas.

La pierna de adelante necesita isquiotibiales largos para poder extender la rodilla con la cadera flexionada.

FLEXIBILIDAD ESPECÍFICA

La pierna de atrás exige flexores de cadera elásticos (psoas y recto femoral) para permitir la extensión de la cadera.


Sin este rango, la pelvis se ve obligada a compensar.


EL ANCLA PÉLVICA

La pelvis es el ancla: si se rota o se inclina hacia adelante (anteversión), está "haciendo trampa" y cargando la lumbar.

Por eso, mantener las caderas cuadradas es el secreto para un progreso real y seguro.


EN LA SALA





CADERAS CUADRADAS vs. PELVIS ROTADA/ANTEVERSA

SPLIT LATERAL



TEORÍA: LÍMITES DE LA APERTURA

La apertura lateral depende de la longitud de tus **aductores**, pero a diferencia del split frontal, aquí entran en juego dos factores no musculares: **la cápsula articular y la forma de tus huesos.**

La cápsula puede restringir el rango final, y **el cuello de tu fémur puede chocar** contra el borde de la cavidad de la cadera (acetábulo), **creando un "tope óseo" que no se puede forzar.** Este límite es único para cada persona. Entenderlo es la clave para no lesionar la articulación.

EN LA SALA

Un alumno que siente un pinzamiento duro y doloroso en la ingle, en vez de un estiramiento, probablemente llegó a su tope óseo.

OBJETIVO REAL: FUNCIÓN, NO FOTO




FOTO: Profundidad máxima

FUNCIÓN: Alineación y control > Profundidad

EL OBJETIVO REAL

Llegar al piso es un resultado posible, pero no es el único ni el más importante. Tu estructura ósea, tu historial de lesiones y tu tipo de tejido conectivo determinan tu rango máximo personal. Forzar más allá de ese límite estructural no trae beneficios y sí aumenta el riesgo de lesión articular.


Lo que todos van a ganar con este programa es **mayor movilidad activa, menos rigidez, mejor control motor** y una **pelvis más funcional** para otros deportes y para la vida. El progreso se mide en calidad de movimiento, no solo en centímetros al piso.

EN LA SALA

Cuando una alumna se frustra por no llegar, le recuerdo que la flexibilidad es para sentirse mejor en su cuerpo, no para cumplir con una imagen.

BONO 1 · SPLIT Y APERTURAS

MEDIR TU PROGRESO SEMANAL



MEDIR PROGRESO: LA CLAVE DEL ÉXITO

Para saber si el programa funciona, necesitás una medición objetiva y consistente.

Una vez por semana, después de calentar, entrá en tu split (frontal o lateral) hasta tu máximo cómodo y sostenido. Usá bloques para apoyarte y mantener la alineación.

Medí la distancia vertical desde tu pelvis al suelo. Anotá esa medida junto a la fecha y una nota sobre tus sensaciones (tirantez, facilidad, dónde sentiste el freno).

Este registro te da una visión clara de tu avance y te ayuda a detectar estancamientos.

CÓMO MEDIR





EN LA SALA

Anotar el progreso, aunque sea de un centímetro por semana, mantiene la motivación del practicante a largo plazo.

EL MÉTODO: TU MAPA DE RUTA

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
SESIÓN ESTIRAMIENTO DIRIGIDO	RECUPERACIÓN DESCANSO Y ADAPTACIÓN	SESIÓN ESTIRAMIENTO DIRIGIDO	RECUPERACIÓN DESCANSO Y ADAPTACIÓN	SESIÓN ESTIRAMIENTO DIRIGIDO	RECUPERACIÓN DESCANSO Y ADAPTACIÓN	RECUPERACIÓN DESCANSO Y ADAPTACIÓN

30-60 s
TIEMPO POR POSTURA

INTENSIDAD 7/10
TIRANTEZ CLARA

RESPIRAR
FLUJO CONSTANTE

La consistencia es más efectiva que la intensidad desmedida. Te recomendamos seguir este programa de **3 a 4 veces por semana**, en días no consecutivos. Esto permite que el tejido se recupere y se adapte. Cada sesión dura entre 20 y 30 minutos. Mantené cada estiramiento estático entre 30 y 60 segundos, a una intensidad de 6-8 sobre 10 (tirantez clara y sostenible, sin dolor agudo). El descanso es parte fundamental del proceso: es cuando tus músculos realmente se adaptan y ganan longitud.

REVISIÓN DEL KINESIÓLOGO — ERRORES DE LA VERSIÓN ANTERIOR QUE HAY QUE CORREGIR SÍ O SÍ (no repetirlos):


La etiqueta **'ISQUIOTIBIALES'** apunta al grupo muscular correcto en la pierna adelantada, pero en esta posición de zancada dichos músculos no se estiran. De hecho, están en contracción para estabilizar la articulación. Esto es un error conceptual grave, ya que el estiramiento se enfoca en el psoas ilíaco de la pierna de atrás. **Regla:** cada etiqueta de músculo tiene que corresponder al músculo que realmente se estira en esa posición; en zancada el isquiotibial de la pierna de adelante NO se estira; el psoas se estira en extensión de cadera, no en flexión; la línea de tensión va sobre el músculo que se alarga.



CUE DE LA FORMADORA



Al alumno que quiere venir todos los días a "matarse" estirando le explico sobre el síndrome de sobrecarga y la necesidad de la recuperación para progresar.




EN LA SALA



BONO 1 • SPLIT Y APERTURAS

CUÁNDO NO SEGUIR: SEÑALES DE ALERTA




SEÑALES DE ALERTA: QUÉ NO ES NORMAL

Estirar debe generar una sensación de tensión muscular, no de dolor articular, nervioso o de pinzamiento. Detenete y consultá a un profesional si sentís:

1) Un **dolor agudo o pellizco** en la articulación de la cadera (ingle), especialmente en la apertura lateral.
2) **Dolor** en la parte interna o trasera de la rodilla de la pierna de adelante.
3) **Dolor en la zona lumbar**, que suele indicar una compensación por falta de rango en la cadera de atrás.

Estas no son sensaciones de “buen estiramiento”, son señales de que la técnica es incorrecta o que estás forzando una estructura.

QUÉ SÍ / QUÉ NO



TENSIÓN MUSCULAR (CORRECTO)

QUÉ SÍ	QUÉ NO
Tensión en el medio del músculo.	Dolor punzante, hormigueo, quemazón o dolor en la articulación.



COMPRESIÓN NERVIOSA (INCORRECTO)

PAUTA DE SEGURIDAD

Ante cualquier dolor agudo, chasquido o sensación eléctrica, se suspende el ejercicio y se consulta a un profesional de la salud antes de continuar. El estiramiento **nunca debe aumentar un dolor existente.**

BLOQUE DE CALENTAMIENTO (10 MIN)

PREPARACIÓN ESENCIAL PARA SESIONES DE SPLIT Y APERTURAS

PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN:

NIVEL: Todos. Para todos, antes de cada sesión del programa. Su objetivo es aumentar la temperatura y lubricar las articulaciones, no ganar rango.

POSICIÓN DE PARTIDA: De pie.

ZONA Y MÚSCULOS: Movilidad general de cadera, rodillas y columna.



EL CALENTAMIENTO:

Movilidad articular y estiramientos dinámicos suaves.
INTENSIDAD 3-4/10. Respiración fluida.



PASO A PASO:


1. **Círculos de tobillos** (30s c/u)



2. **Círculos de rodillas** (30s c/lado)



3. **Círculos de cadera amplios** (45s c/lado)



4. **Balanceos de pierna adelante y atrás** (12 reps c/pierna)



5. **Balanceos de pierna a los lados** (12 reps c/pierna)



6. **Gato-Vaca en cuadrupedia** (10 reps)



3 ERRORES COMUNES:

1. **Hacer balanceos con envión arqueando la lumbar.**
   → Activar abdomen, torso fijo.

2. **Apurarse.**
   → Priorizar control sobre velocidad.

3. **Contener la respiración.**
   → Exhalar en el esfuerzo.

QUÉ SÍ / QUÉ NO:

- ✓ Para embarazo, movimientos más acotados.
- ✗ Para lesión reciente de rodilla/cadera, rango muy pequeño y sin dolor.

PROGRESIÓN Y PARA SU CASA:


REGRESIÓN: Apoyarse en una pared.

PROGRESIÓN: Aumentar la amplitud controladamente.

Explicarle a la alumna que este bloque no se saltea nunca, es el seguro para que el estiramiento posterior sea efectivo y sin riesgos.

SEMANA 1-2 · CADENA POSTERIOR BASE

ISQUIOTIBIALES Y GEMELOS
· INTENSIDAD 6-7 · 45 SEG
· 2 SERIES



PARA QUIÉN: Para quien inicia el programa o tiene mucha rigidez posterior.

EL ESTIRAMIENTO: Estático pasivo. Intensidad 6-7/10. 2 series de 45 segundos por pierna. Respiración lenta y profunda. Se mantiene la pelvis neutra y apoyada en el piso.

PASO A PASO

1. Acostate boca arriba.
2. Llevá una rodilla al pecho y pasá una banda por la planta del pie.
3. Extendé esa pierna al techo, hasta donde la rodilla quede estirada.
4. Usá la banda para acercar la pierna suavemente hacia vos. Sostené 45s.
5. Hacé dorsiflexión del tobillo para sumar gemelos.
6. Bajá lento y cambiá.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

- ✕ **1.** Levantar el sacro del piso.
  Corrección: Bajar la pierna, anclar la pelvis.
- ✕ **2.** Flexionar la rodilla que se estira.
  Corrección: Alejar la pierna para poder extenderla.
- ✕ **3.** Tensionar hombros.
  Corrección: Relajarlos.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ☑ Para hipermovilidad, activar cuádriceps para proteger la rodilla.
- ☑ En hernia discal (fase no aguda), cuidar que la lumbar no se arquee.

REGRESIÓN: Rodilla de base flexionada.

PROGRESIÓN: Pierna de base extendida en el piso.

PARA SU CASA: Recordale al alumno que la tensión debe estar en el medio del muslo, no detrás de la rodilla.

SEMANA 1-2 · PSOAS Y CUÁDRICEPS BASE



FICHA DE ESTIRAMIENTO: ZANCADA BAJA DE CORREDOR

NIVEL: INICIAL

PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para trabajar la extensión de cadera, clave para la pierna de atrás del split.

EL ESTIRAMIENTO

Estático activo. Intensidad 6-7/10. 2 series de 30-40 segundos por lado.

Al exhalar, se activa el glúteo de atrás para una retroversión pélvica. Se mantiene el torso erguido.

PASO A PASO

1. Desde cuadrupedia, adelantá un pie entre las manos.
2. Colocá una manta bajo la rodilla de atrás.
3. Apoyá las manos en la rodilla de adelante
4. Activá el glúteo de la pierna de atrás para llevar la pelvis a retroversión.
5. Sostené 30-40s.
6. Volvé lento.

3 ERRORES COMUNES

1. Quebrar la cintura. (**Corrección:** Enfocarse en la retroversión pélvica activando el glúteo.)
2. Rodilla de adelante sobrepasa el tobillo. (**Corrección:** Caminar el pie hacia adelante.)
3. Dejar caer el peso. (**Corrección:** Sostener la posición activamente.)

QUÉ SÍ / QUÉ NO

✓ ✕ Con dolor de rodilla, usar más acolchado. En embarazo, versión más suave.

REGRESIÓN: Menos profundidad, manos en bloques.

PROGRESIÓN: Elevar el brazo del mismo lado de la pierna de atrás.

PARA SU CASA: "La clave no es bajar mucho, sino cómo colocás la pelvis. El estiramiento es adelante, en la cadera, no en tu espalda."

MARIPOSA (BADDHA KONASANA)

FICHA DE ESTIRAMIENTO / TEST / PROGRESIÓN: NIVEL INICIAL



PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN:
Para el primer acercamiento a la apertura de caderas para el split lateral.

POSICIÓN DE PARTIDA:
Sentada, en postura de mariposa (Baddha Konasana).

ZONA Y MÚSCULOS:
Aductores (parte interna de los muslos).

FRENO QUE SE TRABAJA:
Muscular.

EL ESTIRAMIENTO:
Estático pasivo. Intensidad 6-7/10.
2 series de 45-60 segundos.
Se mantiene la columna larga y erguida.

PASO A PASO

1. **Sentate en el piso, podés usar un almohadón bajo los isquiones.**
2. **Juntá las plantas de los pies y dejá que las rodillas caigan hacia los lados.**
3. **Acercá los talones a la pelvis a una distancia cómoda.**
4. **Tomate de los pies o tobillos y alargá la columna como si un hilo tirara de tu coronilla.**
5. **Mantené 45-60s, respirando y permitiendo que la gravedad actúe.**
6. **Para salir, ayudate con las manos a cerrar las rodillas.**

3 ERRORES COMUNES

1. **Redondear la espalda para bajar. Corrección:** Priorizar la columna larga; la flexión nace de la cadera.
2. **Empujar las rodillas con las manos. Corrección:** Dejar que bajen por su propio peso.
3. **Forzar y sentir dolor. Corrección:** Alejar un poco los pies de la pelvis.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- Para dolor lumbar, sentarse sobre más altura.
- Para dolor en la ingle, es señal de parar.


REGRESIÓN: Alejar más los pies, mayor altura bajo la pelvis.

PROGRESIÓN: Inclinarse ligeramente hacia adelante desde la cadera, manteniendo la espalda recta.

PARA EL ALUMNO: Decile que busque una sensación de apertura en la cara interna de los muslos, no de pinzamiento en la ingle.

SEMANA 3-4 · SPLIT FRONTAL CON BLOQUES

ISQUIOTIBIALES, PSOAS, RECTO FEMORAL
· INTENSIDAD 7-8 ·
· 30-40 SEG ·
· 2 SERIES POR LADO



FICHA DE ESTIRAMIENTO

NIVEL:
Intermedio.

PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN:
Cuando los estiramientos base son cómodos y se busca progresar hacia el split completo.

POSICIÓN DE PARTIDA:
Zancada alta.

EL ESTIRAMIENTO:
Estático activo. Mantiene la pelvis cuadrada. Respiración fluida.

PASO A PASO

1. Colocá dos bloques a los lados de tu mat.
2. Desde una zancada, apoyá las manos en los bloques.
3. Deslizá lentamente el pie de adelante hacia el frente y la rodilla de atrás hacia atrás.
4. Bajá hasta sentir un estiramiento intenso pero controlable, manteniendo la cadera de atrás apuntando al piso.
5. Apoyá el peso en las manos sobre los bloques para regular la intensidad. Sostené 30-40s.
6. Para salir, empujá los bloques y volvé a la zancada.

3 ERRORES COMUNES

1. **Dejar que la cadera de atrás se abra.**
⊗ Corrección: Girar activamente la cadera de atrás hacia el piso. ✓)

2. **Flexionar la rodilla de adelante.**
⊗ Corrección: Activar el cuádriceps; si es necesario, subir la altura de los bloques. ✓)

3. **Colapsar y perder la alineación.**
⊗ Corrección: Mantener el torso erguido y el abdomen activo. ✓)

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- Para hipermovilidad, no hiperextender la rodilla de adelante (microflexión). (✓)

REGRESIÓN: Usar bloques más altos o una silla.

PROGRESIÓN: Bajar la altura de los bloques.


PARA SU CASA: El objetivo de los bloques es mantener la alineación correcta mientras ganás profundidad. No es una trampa, es entrenar de forma inteligente.

RANA Y MARIPOSA CON CARGA

NIVEL: Intermedio







ADUCTORES · INTENSIDAD 7 · 60-90 SEG

PARA QUIÉN

Para practicantes que ya tienen buena flexibilidad en aductores y necesitan un estimulo mayor para seguir progresando. Se busca una relajación profunda dei sistema nervioso.

EL ESTIRAMIENTO

Método: Estático pasivo con carga suave.

Intensidad: 7/10. **Tiempo:** 1 serie de 60-90 segundos. Respiración profunda y constante.

LA SEINIDAD

Para practicantes que ya tierena flexibillidad en aductores y necesitan un estimulo mayor para seguruna profunda del sistema nervioso.

PASO A PASO

1. **RANA:** En cuadrupedia, separá las rodillas todo lo posible, con tobillos en linea con las rodillas y pies flexionados. Apoyate en antebrazos.
2. **MARIPOSA:** Acostate boca arriba, juntá las plantas de los pies y dejá caer las rodillas.
3. **CARGA:** Colocá una carga suave y distribuida sobre la cara interna de los muslos (ej. una bolsa de arena, un disco con una toalla).
4. **RELAJACIÓN:** Relajate en la postura, respirando profundo por 60-90s.
5. **SALIDA:** Retirá la carga y salí de la postura muy lentamente.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

✕ Usar demasiado peso.
✓ **Corrección:** Empezar con una carga minima; debe ser una ayuda, no una fuerza.

✕ Aguantar con dolor.
✓ **Corrección:** Si hay pinzamiento en la ingle, salir de la postura.

✕ Salir rápido.
✓ **Corrección:** El tejido está vulnerable; salir con control y lentitud.

QUÉ SÍ / QUÉ NO


✓ Practicar con control y consciencia.
✓ Aumentar el tiempo antes que la carga.

✕ Contraindicado si hay dolor en la rodilla o en la articulación de la cadera.
✕ No forzar la apertura con la carga.

REGRESIÓN: Hacer la postura sin carga.
PROGRESIÓN: Aumentar el tiempo en la postura antes que la carga.
PARA SU CASA: Explicarle al alumno que la carga es para invitar al músculo a ceder, no para forzarlo. Es una técnica para usar con mucho cuidado y conciencia.

PNF PARA ISQUIOTIBIALES

NIVEL: INTERMEDIO / AVANZADO



PARA QUIÉN

PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN: Para romper una meseta de estancamiento en la flexibilidad de isquiotibiales. Busca aumentar el rango y reducir la tirantez.

EL ESTIRAMIENTO

EL ESTIRAMIENTO: FNP (Facilitación Neuromuscular Propioceptiva), técnica contraer-relajar. Intensidad 8/10 en la relajación, 5/10 en la contracción. 3-4 ciclos por pierna.
MANTENER FIJO: Sacro y pelvis en el suelo.

PASO A PASO: TÉCNICA CONTRAER-RELAJAR

1. Acostate y llevá una pierna extendida hacia el techo con una banda, hasta el punto de primera tirantez (6/10).
2. Mantené 20 segundos el estiramiento pasivo.
3. Inhalá y empujá con tu pie contra la banda, como si quisieras bajar la pierna. Hacé una fuerza del 50% (isométrica, la pierna no se mueve). Sostené la contracción 6 segundos.
4. Exhalá y relajá por completo la pierna. Inmediatamente, usá la banda para llevarla un poco más lejos en el estiramiento.
5. Sostené el nuevo rango por 20-30 segundos.
6. Repetí el ciclo 2-3 veces más.

ERRORES QUE VES EN LA SALA (CRUZ ROJA)

1. Hacer demasiada fuerza en la contracción.
Corrección: Es una activación, no una pulseada.
2. No relajar completamente después de contraer.
Corrección: La clave es la relajación súbita para inhibir el reflejo.
3. Mover la pelvis.
Corrección: Anclar el sacro al piso.

REGRESIÓN

ESTIRESIÓN: una banda para mernos za contracción.
liva una anda roe emmat scuan.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

QUÉ SÍ (CHECK VERDE):
Adulto saludable sin lesiones.

QUÉ NO (CRUZ ROJA):
· Evitar en lesiones agudas del isquiotibial.
· Hipermovilidad.
· Hernia discal aguda. Rodilla operada recientemente.
· Embarazo avanzado.
· Adulto mayor frágil.

REGRESIÓN: Menos fuerza en la contracción (20-30%).

PROGRESIÓN: Usar un compañero que ofrezca resistencia manual controlada.

PARA SU CASA: Este es un 'hackeo' al sistema nervioso. Enseñale a la alumna a ser precisa con los tiempos y las intensidades para que funcione.

FICHA DE ESTIRAMIENTO / TEST / PROGRESIÓN: GEMELOS Y SÓLEO

NIVEL: Todos. **PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN:** Un tobillo con poca dorsiflexión puede limitar la extensión de la rodilla en el split frontal.



EL ESTIRAMIENTO:
Estático.
Intensidad 6-7/10.
2 series de 30s para gemelos y 30s para sóleo, por pierna.

PASO A PASO

1. Parate frente a una pared y apoyá las manos.
2. Llevá una pierna hacia atrás, manteniendo el talón en el piso y la rodilla extendida. Sentirás el estiramiento en el gemelo. Sostené 30s.
3. Para el sóleo: acercá un poco la pierna de atrás y flexioná la rodilla, manteniendo el talón pegado al piso. El estiramiento se siente más abajo, cerca del tendón de Aquiles. Sostené 30s.
4. Cambiá de pierna y repetí ambos estiramientos.

3 ERRORES COMUNES

1. Levantar el talón del piso.
Corrección: Acortar la distancia con la pared.
2. Girar el pie hacia afuera.
Corrección: Mantener los dedos del pie apuntando rectos hacia la pared.
3. Rebotar.
Corrección: Sostener el estiramiento de forma estática y constante.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

Realizar con cuidado si hay historial de tendinitis de Aquiles.


REGRESIÓN: Menor distancia a la pared.

PROGRESIÓN: Colocar la punta del pie sobre un escalón o bloque y dejar caer el talón.

PARA SU CASA: Explicarle al alumno cómo un tobillo "trabado" puede afectar a toda la cadena posterior y ser el freno oculto de su split.

PSOAS CON CARGA

NIVEL AVANZADO



PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para quienes tienen buen rango en la zancada baja y necesitan profundizar el trabajo sobre los flexores de cadera para mejorar la extensión en splits y gestos técnicos.

EL ESTIRAMIENTO

Estático activo con carga (el propio peso corporal aumentado por la posición sobre el banco). Intensidad 7-8/10. 2 series de 30 segundos por lado. Respiración profunda y constante, manteniendo la pelvis fija.

PASO A PASO

1. Colocá un banco o silla detrás tuyo.
2. Desde una posición de zancada, **apoyá el empeine del pie de atrás** sobre el banco.
3. La **rodilla** de adelante debe quedar sobre **el tobillo**. Usá bloques para las manos si es necesario.
4. Erguí el torso y realizá una **retroversión pélvica,** activando el glúteo de la pierna de atrás.
5. La carga del cuerpo en esta posición intensifica el estiramiento. Sostené 30s.
6. Salí con mucho control.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

❌ **Arquear la lumbar.** Corrección: Foco total en la retroversión pélvica y el abdomen activo.

❌ **El banco está muy alto.** Corrección: Empezar con una altura menor.

❌ **Dejar que la rodilla de adelante se vaya hacia adentro**. Corrección: Mantenerla alineada con el segundo dedo del pie.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

✅ Apto para **nivel avanzado** con buen control pélvico.

❌ **No apto** para principiantes o con problemas de rodilla. En embarazo, evitar.

REGRESIÓN

Hacer la zancada baja en el piso sin el banco, enfocándose en la retroversión.

PROGRESIÓN

Sostener una pesa liviana en la mano del lado de la pierna de atrás para aumentar la carga.

PARA SU CASA: Esta es una postura intensa. Recordale a la alumna que el control pélvico es más importante que la profundidad del estiramiento.

BONO 1 · SPLIT Y APERTURAS

SEMANA 5-6 • SPLIT FRONTAL CON PELVIS CUADRADA

FICHA DE ESTIRAMIENTO / TEST / PROGRESIÓN

NIVEL: INTERMEDIO / AVANZADO



PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para refinar la técnica del split, enfocándose en la alineación pélvica en lugar de solo en la profundidad.

POSICIÓN DE PARTIDA: Split frontal con bloques.

EL ESTIRAMIENTO

MÉTODO: Estático isométrico.
INTENSIDAD: 7/10.
TIEMPO: 2 series de 30-40 segundos por lado.
RESPIRACIÓN: Fluida, sin apnea.

PASO A PASO

1. Entrá en tu split frontal con apoyo en bloques. No vayas a tu máxima profundidad.
2. Colocá tus manos en las crestas ilíacas. Verificá que ambas apunten hacia adelante como los faros de un auto.
3. Activá el aductor de la pierna de adelante y el glúteo de la de atrás, como si quisieras juntar las piernas. Es una acción isométrica.
4. Sentí cómo esta acción ayuda a cuadrar la pelvis y estabilizar la postura. Sostené 30-40s.
5. Relajá y salí con control.

3 ERRORES COMUNES EN LA SALA

✗ 1. Obsesionarse con bajar y sacrificar la alineación.
Corrección: Subir la altura de los bloques para poder cuadrar la pelvis.

✗ 2. No saber dónde está la pelvis.
Corrección: Usar un espejo o filmarse de frente.

✗ 3. Sostener en apnea.
Corrección: Respirar de forma fluida.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

✓ Para hipermovilidad, esta activación es fundamental para dar estabilidad a la articulación.


REGRESIÓN: Practicar la acción isométrica en una zancada menos profunda.

PROGRESIÓN: Intentar levantar las manos de los bloques por un segundo, manteniendo la estabilidad.

PARA SU CASA: "Un split menos profundo pero cuadrado es mucho más avanzado y beneficioso que uno abierto y en el piso. Estás entrenando control, no solo flexibilidad."

FICHA DE ESTIRAMIENTO / TEST / PROGRESIÓN

NIVEL: TODOS | **ADUCTORES** | ESTIRAMIENTO ESTÁTICO PASIVO | **INTENSIDAD 6-7/10**



PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para trabajar el split lateral de forma pasiva y segura, usando la gravedad como aliada y la pared como soporte. Busca relajación.

EL ESTIRAMIENTO

MÉTODO: Estático pasivo. **INTENSIDAD:** 6-7/10. **TIEMPO:** 2 a 3 minutos.
RESPIRACIÓN: Profunda y relajada. **FIJO:** Pelvis contra la pared.

PASO A PASO

1. **Sentate** de costado, lo más cerca posible de una pared.
2. **Tumbate** boca arriba y girá para subir las piernas por la pared. Acercá los glúteos hasta que la toquen.
3. **Dejá** que las piernas se abran hacia los lados por su propio peso, en forma de "V".
4. **Mantené** las rodillas extendidas pero no bloqueadas.
5. **Colocá** las manos sobre el abdomen o a los lados y concentrate en la respiración.
6. **Permanecé** en la postura de 2 a 3 minutos.
7. Para salir, flexioná las rodillas y ayudate con las manos a juntarlas.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. **Separar los glúteos de la pared.**
   Corrección: Volver a acercarse; esto mantiene la pelvis en la posición correcta.
2. **Soportar un estiramiento doloroso.**
   Corrección: Juntar un poco las piernas; no debe haber dolor.
3. **Aguantar si los pies se duermen.**
   Corrección: Salir de la postura, mover los pies y volver a entrar.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

QUÉ SÍ: En embarazo, puede ser muy cómodo, pero con supervisión.

QUÉ NO: Si hay pinzamiento de cadera, no hacer.

REGRESIÓN: No abrir tanto las piernas.

PROGRESIÓN: El propio tiempo y la gravedad harán el trabajo.

PARA SU CASA: Decile al alumno que esta es una excelente forma de terminar el día, ya que relaja el sistema nervioso y ayuda al retorno venoso.

ISQUIOTIBIALES Y ADUCTORES: ACTIVACIÓN EN RANGO FINAL (CONTROL NEUROMUSCULAR)



PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para desarrollar control y fuerza en los rangos de flexibilidad que se han ganado, lo que previene lesiones.
POSICIÓN DE PARTIDA: Sentado en el piso. **ZONA Y MÚSCULOS:** Isquiotibiales y aductores (contracción concéntrica y excéntrica).

EL ESTIRAMIENTO

MÉTODO: Activsción en rango final (Control neuromuscular).
INTENSIDAD: 6/10 (tirantez fuerte sin dolor).
SERIES/RERS: 2 series de 8-10 repeticiones lentas por ejercicio/lado.
RESPIRACIÓN: Constante y fluida.
MANTENER FIJO: Pelvis y columna lumbar.

PASO A PASO



1. ISQUIOS: ACTIVACIÓN

1. Sentate con la espalda recta, una pierna extendida y la otra flexionada.
2. Incliná el torso sobre la pierna extendida.
3. Sin usar las manos, intentá levantar el talón del piso 1 cm, usando solo la fuerza de los flexores de cadera.
4. Sostené 2s y bajá lento. 8-10 reps.

PASO A PASO



2. ADUCTORES: ACTIVACIÓN

1. Sentate en el piso en una "V" amplia pero cómoda.
2. Colocá las manos detrás para apoyar la espalda rects.
3. Lovantá una pierna extendida del piso, llevala hacia sl centro y voivé a bajarla controladamente.
4. 8-10 reps.

ERRORES QUE VES EN LA SALA



1. Usar envión
Corrección: Ei movimiento debe ser lento y controlado.

2. Perder la postura de la espalda
Corrección: Reducir el rango del movimiento para mantener la espalda erguida.

3. Compensar con otras partes
Corrección: Aislar el movimiento en la cadera.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

HIPERMOVILIDAD:	✓ SÍ. Para hipermovilidad, este tipo de trabajo es más importante que el estiramiento pasivo.
LESIÓN RECIENTE:	✗ NO. Consultar antes.
HERNIA DISCAL:	✓ SÍ (con espalda recta).
RODILLA OPERADA:	✗ NO. Consultar con profesional.

REGRESIÓN: Reducir el rango de apertura o de flexión.

PROGRESIÓN: Añadir una tobillera con un peso muy ligero.

PARA SU CASA: "Ganar rango está bien, pero ser dusño de ese rango es mejor. La fuerza en los extremos del movimiento te protege."

FICHA DE ESTIRAMIENTO:
SPLIT FRONTAL CON SOBRE-SPLIT

NIVEL: Avanzado / Profesional



PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para quienes ya llegan al split frontal en el piso con comodidad y buscan un rango mayor (gimnastas, bailarines). Busca aumentar la flexibilidad extrema y el rendimiento técnico.

EL ESTIRAMIENTO

Método: Estático pasivo o activo.
Intensidad: 8-9/10.
Duración: 1-2 series de 20-30 segundos por lado.
Requiere un calentamiento muy completo previo.

PASO A PASO

1. Entrá en tu split frontal en el piso. Asegurate de estar bien caliente. (30s prep).
2. Colocá un bloque bajo o un libro bajo el talón del pie de adelante. Esto crea el "sobre-split". (15s ajuste).
3. Mantené la pelvis cuadrada y las manos en el piso o en bloques para controlar la profundidad. (5s ajuste).
4. Respirá profundo y sostené 20-30s. No rebotes, mantené la tensión constante. (20-30s sostener).
5. Salí con máximo control, empujando el piso para quitar el peso de las piernas. (10s salida).
6. También se puede colocar el bloque bajo la rodilla de la pierna de atrás para enfocar en el psoas. (Variante).

❌ ERRORES QUE VES EN LA SALA ✅

- ❌ **Hacerlo sin un calentamiento adecuado.**
  CORRECCIÓN: Dedicar al menos 15 minutos a calentar bien todo el cuerpo.
- ❌ **Perder la alineación de la pelvis (abrir la cadera de atrás).**
  CORRECCIÓN: Es preferible usar menos altura en el bloque pero mantener la pelvis cuadrada y alineada.
- ❌ **Quedarse demasiado tiempo en la posición extrema.**
  CORRECCIÓN: Son estiramientos de corta duración y alta intensidad, no de resistencia.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

QUÉ SÍ ✅

- ✅ Practicantes con split plano en el piso consolidado.
- ✅ Atletas que necesitan rango extremo.

QUÉ NO ❌

- ❌ Dolor articular agudo en cadera o rodilla.
- ❌ No tener el split plano en el piso.
- ❌ Lesión reciente en isquiotibiales o psoas.

REGRESIÓN: Split en el piso sin altura adicional.

PROGRESIÓN: Aumentar muy gradualmente la altura del bloque bajo el talón o la rodilla.

PARA SU CASA: Explicarle a la alumna que el sobre-split es una herramienta para necesidades especificas de rendimiento y debe usarse con extremo cuidado y respeto por el cuerpo, solo después de un calentamiento profundo.

BONO 1 · SPLIT Y APERTURAS

SEMANA 7-8 · SPLIT LATERAL COMPLETO O CON ALTURA

PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para quienes ya tienen el split lateral en el piso y necesitan un rango mayor para su disciplina.
Posición de partida: Split lateral (straddle).



FICHA DE ESTIRAMIENTO / TEST / PROGRESIÓN: NIVEL AVANZADO / PROFESIONAL

PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN

Para quienes ya tienen el split lateral en el piso y necesitan un rango mayor para su disciplina.

Posición de partida: Split lateral (straddle).

EL ESTIRAMIENTO

Método: Estático pasivo.
Intensidad: 8-9/10.
Tiempo: 30-45 segundos por serie.
Respiración: Profunda y controlada.
Mantené fijo: Pelvis y rodillas hacia el techo.

PASO A PASO

1. **Sentate en tu split lateral** en el piso.
2. **Colocá un bloque bajo cada talón** (o empezá con uno solo) para elevar las piernas.
3. **Inclinate hacia adelante** apoyando manos o antebrazos para estabilizar.
4. **Mantené rodillas y dedos de los pies apuntando** al techo, evitando rotación interna.
5. **Respirá y mantené 30-45s.** Si sentís pinzamiento en la ingle, salí inmediatamente.
6. **Para salir, empujá el piso y flexioná rodillas** con mucho control.

3 ERRORES COMUNES

1. **Dejar que las piernas roten hacia adentro.**
   Corrección: Mantener la rotación externa desde la cadera (rodillas al techo).
2. **Forzar a pesar de un pinzamiento.**
   Corrección: Esto puede ser el tope óseo. Hay que detenerse.
3. **Hacerlo en frío.**
   Corrección: Requiere un calentamiento completo con activación de glúteos.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- Alto riesgo si no se respeta la anatomía individual.
- Si hay dolor articular, no es el camino.

REGRESIÓN: Split lateral en el piso sin bloques.

PROGRESIÓN: Aumentar gradualmente la altura de los bloques.

PARA SU CASA: Recordar que la estructura ósea puede ser el límite final. La salud de la cadera es más importante que cualquier postura.

BONO 1 • SPLIT Y APERTURAS

SOSTENER Y SALIR DEL SPLIT SIN LESIONARSE

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

NIVEL: Todos.

POSICIÓN DE PARTIDA: En la postura de


ZONA Y MÚSCULOS: Todo el complejo de la cadera y el core.

PARA QUIÉN Y EN QUÉ SITUACIÓN: Para cualquiera que practique splits. La mayoría de las lesiones ocurren al salir de la postura.

FRENO QUE SE TRABAJA: Control motor y fuerza excéntrica.

INTENSIDAD DE ACTIVACIÓN: 5-6/10 (NO DOLOR)


PASO A PASO (SALIDA DEL SPLIT FRONTAL)



1. Desde tu split, asegurate de tener las manos firmemente apoyadas en el piso o en bloques.
2. Activá el abdomen.
3. Empujá el piso con las manos para transferir el peso de las piernas a los brazos.
4. Arrastrá el pie de adelante hacia atrás, flexionando la rodilla, para volver a una posición de zancada. No intentes "levantarte" usando la fuerza de los isquiotibiales estirados.
5. Desde la zancada, volvé a cuadrupedia.

PASO A PASO (SALIDA DEL SPLIT LATERAL)

1. Desde el split lateral, apoyá las manos firmemente en el piso delante de ti.
2. Incliná el torso hacia adelante para quitar peso de las piernas.
3. Flexioná una rodilla y luego la otra, usando las manos para ayudarte a juntar las piernas lentamente.
4. Podés también girar sobre una cadera para salir de lado.



3 ERRORES

- Intentar salir usando la fuerza del músculo que acabás de estirar.
  Corrección: Usar siempre la fuerza de los brazos y el core.
- Salir rápido o con un tirón.
  Corrección: El movimiento debe ser lento, deliberado y controlado.
- No usar las manos.
  Corrección: Las manos son tu seguro de vida.

PARA SU CASA

"Entrar en la postura es la mitad del trabajo. Salir con control es la otra mitad, y es la que te mantiene lejos del kinesiólogo."

BONO 1 · SPLIT Y APERTURAS

TEST DE LAS 8 SEMANAS: CÓMO MEDIR EL RESULTADO

NIVEL: TODOS



CÓMO SE HACE

1. Después de un calentamiento completo (el mismo del inicio del programa), realizá la misma medición que en la semana 0.

2. Para el split frontal (ambos lados) y el lateral, entrá en la postura con apoyo de bloques si es necesario, manteniendo la alineación correcta.

3. Sostené 10 segundos para estabilizar y luego medí la distancia desde el isquion al piso.

4. Sacá una foto de frente y de perfil para comparar la postura.



QUÉ SE MIDE

1. **Distancia al piso** (en cm): Es el dato cuantitativo principal. Medí con cinta métrica desde el hueso del glúteo (isquion) hasta el suelo.
2. **Calidad de la alineación**: Compará las fotos de la semana 0 y la semana 8. ¿La pelvis está más cuadrada y alineada? ¿La espalda más erguida? ¿Las rodillas apuntan en la dirección correcta sin rotaciones compensatorias?
3. **Sensación subjetiva**: En una escala de 1 a 10, ¿cuánto esfuerzo te cuesta mantener la postura? ¿Dónde sentís el estiramiento ahora, comparado con el inicio?

VALORES DE REFERENCIA ORIENTATIVOS

No hay un “valor correcto”. El éxito es cualquier mejora medible en distancia, alineación o facilidad. Una reducción de 5-10 cm es un gran avance. Una mejora significativa en la cuadratura de la pelvis, aunque no bajes más, es un éxito técnico enorme.

QUÉ FRENO SUGIERE CADA RESULTADO

Si mejoraste mucho pero te estancaste, puede que necesites un estímulo diferente (ej. más PNF o fuerza en rango final). Si la sensación cambió de muscular a un pinzamiento articular o dolor agudo, podrías estar cerca de tu límite estructural. Si no hubo cambios, revisá la constancia, la técnica y el calentamiento.

SPLIT EN HIPERLAXOS: CONTROL ANTES QUE RANGO

SPLIT EN HIPERLAXOS

QUÉ NO ✗



QUÉ SÍ ✓



CONTROL ANTES QUE RANGO: EL OBJETIVO SE INVIERTE


Para una persona con hiperlaxitud, el objetivo se invierte: no se trata de ganar más rango pasivo, sino de aprender a controlar el que ya tiene. Sus ligamentos son **más laxos, por lo que los músculos deben trabajar el doble para estabilizar las articulaciones.**

Forzar un split puede llevar a una luxación o a un daño articular a largo plazo. Por **eso, el foco debe estar en la activación muscular durante todo el estiramiento,** en la **fuerza en el rango final** y en **nunca hiperextender las rodillas. Menos profundidad con más control es siempre la opción más segura.**




EN LA SALA: CUE DE LA FORMADORA

Cuando veo a una alumna hiperlaxa "colgarse" de sus articulaciones, le pido que active los músculos antagonistas para protegerse. Por ejemplo, activar el cuádriceps en un estiramiento de isquios.



SPLIT Y RENDIMIENTO



BAILARINA: GRAND JETÉ



ARTISTA MARCIAL: PATADA ALTA

CARD: FUNDAMENTOS DE LA FLEXIBILIDAD ACTIVA

En disciplinas como la danza o las artes marciales, el split es una herramienta para lograr movimientos explosivos y de gran amplitud. Sin embargo, hay un error común: confundir la flexibilidad pasiva (poder hacer el split en el piso) con la movilidad activa (poder levantar la pierna con control y fuerza).

Forzar un split pasivo, especialmente en niños y adolescentes, sin desarrollar la fuerza para controlar ese rango, es una receta para lesiones como desgarros o problemas de cadera.

El entrenamiento ideal combina estiramientos con ejercicios de fuerza en rangos amplios. La clave no es solo cuánto se abre la pierna, sino cuánto se controla en ese rango.

EN LA SALA: ESTUDIO DE CASO

Un joven bailarín con un split perfecto se lesionó el isquiotibial al hacer un developpé. Le faltaba fuerza para controlar la subida de la pierna. Su flexibilidad pasiva era excelente, pero la activa era insuficiente para soportar la demanda de la danza.



MANTENER LO GANADO.

La estrategia clave para no perder la flexibilidad lograda: consistencia sobre intensidad.

PLAN DE MANTENIMIENTO MENSUAL

lunes	martes	marces	junzo	jueo	sábado	domingo
1	2 Sasióu do Plexibilidad	3	4	5	6 Sesión de Membilidad	7
8	9 Soriкn do Flenibilidad	10	11	12	13 Seslón de Flenibilidad	14
15	16 Sesión do Plexibilidad	17	18	19	20 Seslón de Flexibilidad	21
22	23 Sesión do Flexibilidad	24	25	26	27	30

Tu nuevo estándar: solo dos días de práctica dedicada para conservar tus resultados a largo plazo.

EL PRINCIPIO DE EFICIENCIA

Una vez que alcanzaste tu objetivo de flexibilidad, no necesitás seguir con la misma intensidad y frecuencia del programa. **El cuerpo es eficiente: si no usás un rango de movimiento, lo perdés gradualmente.**

Para mantener lo ganado, generalmente **son suficientes dos sesiones de mantenimiento por semana.** Estas sesiones pueden ser más cortas (15-20 minutos) y enfocarse en los ejercicios clave que sentiste más efectivos para vos durante el programa. **La clave es la consistencia a largo plazo, no la intensidad.**



EN LA SALA: LA VOZ DE LA FORMADORA

Muchos alumnos dejan de estirar cuando logran su objetivo y en unos meses vuelven al punto de partida. Les explico que la flexibilidad es como cualquier otra capacidad física: o la usás, o la perdés. Es preferible hacer poco de forma constante, que matarse entrenando un mes y abandonar seis.

QUÉ SÍ

Consistencia semanal: 2 sesiones clave. Enfoque: calidad sobre cantidad. Escuchar al cuerpo: no forzar dolor.

QUÉ NO

Abandonar por completo. Volver a la intensidad máxima sin base. Ignorar señales de sobrecarga.

RECORDATORIO

El mantenimiento es un hábito de vida. Integra el estiramiento en tu rutina.

MI REGISTRO SEMANAL DE PROGRESO

Usá esta plantilla una vez por semana para llevar un registro objetivo y subjetivo de tu avance. Imprimí una para cada semana del programa.

Fecha: _____ **Semana Nº:** ____

TABLA DE MEDICIÓN


Postura	Distancia al piso (cm)	Sensación (1-10, dónde sentiste el freno)
Split Frontal Der		
Split Frontal Izq		
Split Lateral		

ANOTACIONES / OBSERVACIONES

Un espacio con líneas para escribir notas libres sobre la energia, dificultades o descubrimientos de la semana.

MAPA CORPORAL

INSTRUCCIONES:
Marcá en las siluetas las zonas donde sentiste más tensión o molestias esta semana.



elevify

PLANTILLA: CALENDARIO DE 8 SEMANAS

CALENDARIO DE ENTRENAMIENTO · 8 SEMANAS

Planificá tus sesiones para asegurar la consistencia. Marcá los días que vas a dedicar a tu práctica de flexibilidad y tildá cada sesión completada.



	L	M	M	J	V	S	D	
Semana 1								☐ Semana completada ✓
Semana 2								☐ Semana completada ✓
Semana 3								☐ Semana completada ✓
Semana 4								☐ Semana completada ✓
Semana 5								☐ Semana completada ✓
Semana 6								☐ Semana completada ✓
Semana 7								☐ Semana completada ✓
Semana 8								☐ Semana completada ✓

TABLA RESUMEN DEL PROGRAMA DE 8 SEMANAS

SEMANA	OBJETIVO PRINCIPAL	EJERCICIOS CLAVE	TIEMPO POR SERIE	INTENSIDAD (1-10)
1-2	Adaptación inicial	Cadena posterior base Psoas base Aductores base	30-60s	6-7/10
3-4	Aumentar el rango	Split frontal con bloques Rana/mariposa con carga PNF para isquios Gemelos/sóleo	30-60s / ciclos PNF	7-8/10
5-6	Control y profundidad	Psoas con carga Split con pelvis cuadrada Split lateral con pared Fuerza en rango final	30-60s / 8-10 reps	7-8/10
7-8	Rango máximo	Split completo o con altura Sostener y salir del split	20-45s	8-9/10

elevify

AVISO: MATERIAL EDUCATIVO

Este libro es una herramienta educativa diseñada para profesionales del movimiento y practicantes con experiencia. La información y los ejercicios aquí presentados no reemplazan el diagnóstico ni el tratamiento médico o kinesiológico.

Ante un dolor agudo, una lesión reciente, hormigueo, embarazo de riesgo o cualquier duda sobre tu condición física, consultá con un profesional de la salud antes de comenzar. Si un ejercicio está contraindicado para vos, no lo hagas. Escuchá a tu cuerpo, respetá sus límites y entrená con inteligencia. La responsabilidad de la práctica es tuya.

